FONDO PIZZOFALCONE

2320-1

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio XXX 1



Palchetto

Num.° d' ordine 130

3968

C 36

NAZIONALE

B. Prov.

II

26

NAPOLI

BIBLIOTECA

VITT. EM. III

Prov. II 33

B. Prov. II-26-27

Digitized by Google

PHARMACOLOGIA

SEU

MATERIA MEDICA.

609375(1)

PHARMACOLOGIA

SEU

MATERIA MEDICA,

EXHIBENS

COGNITIONEM MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ANALYTICAM,

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

PARS PRIMA.

Editio altera correcta et aucta.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

PARISIIS,

Apud LEVRAULT; apud J. J. FUCHS; et apud GABON;
LONDINI, apud Joann. CALLOW;
LIPSIÆ, apud Gerard. FLEISCHER;

M DCCC III.

EX TYPIS GUILLEMINET, NATU MAJORIS.

Nullum exemplar hujus libri genuinum agnosco nisi manu mea signatum.



CONSPECTUS.

Sæculum fere dimidium elapsum est, quo prima Materiæ Medicæ Linnæanæ editio prodiit, in qua auctor lingua elegantia et concisa qualitates et virtutes Vegetabilium medicas exposuit. Multæ plantæ, tunc temporis obscuræ, hodie bene cognitæ et exacte descriptæ sunt : Multa simplicia æque ac præparata, tunc penitus ignota, hodie analysi chemica exactiori stabilita, et non pauca demum quoad usum et præparationem medicamentorum a Botanicis, Chemicis, et Medicis practicis aut nova inventa aut antiqua correcta fuerunt. Hæc pluribus abhinc annis sedulo et attente in diversis Europæ regionibus notare cœpi, sicque gradatim opusculum natum fuit, in quo fixa a vagis, vera a falsis, dubia a certis acutius distinguerentur, verbo, quod Epicrisin analyticam cognitionis omnium quæ ab antiquis ad hodierna usque tempora circa qualitates, vires, et usum Medicamentorum simpliciorum, vegetabilium non solum et animalium, sed et mineralium vere cognita essent, fideliter lingua concisa et magis

severe exacta quam quidem hactenus factum fuit, sub uno intuitu exhiberet. Parvulum hunc librum, ultima quantum licuit lima politum, hic publico juri trado.

Quod nomenclaturam spectat, Medicorum Europæ hodie vix ullum Botanices aut Chemiæ adeo ignarum credo, ut non mecum ardenter desideret, nomina plantarum æque ac præparatorum chemicorum pharmaceutica, vaga et sæpe absurda, ex Medicina et scriptis medicis expungere, eorumque loco magis propria et fixa substituere. Idcirco pro vegetabilibus et animalibus nomina Linnæi systematica, pro mineralibus præparatisque chemico-pharmaceuticis nomenclaturam elegantem et omnino philosophicam, ab eximiis Galliæ chemicis nuper confectam, lubens adoptavi; nullusque pronunciare hæsito, essentialem versus perfectionem scientiæ medicæ gradum poni ab epocha, qua practici ac scriptores medici terminos in arte usitatos vagos relinquere, et linguam magis fixam et rationalem in medicinam introducere cœperint.

Medici qui hodierna, in Historia naturali

Physica et Chemia inventa spernunt et progressus in scientiis hisce, medicinæ vere auxiliatricibus, recenter factos ad Medicinam adplicare recusant, limites artiponere, ejusque perfectionem minime curare videntur.

Ordinem in vegetabilibus et animalibus alphabeticum, utpote practico commodissimum; in mineralibus, systematicum cum alphabetico junctum, secutus sum.

Methodo usus sum conformi eaque compendiosissima, plantam unamquamque sub sequentibus titulis complectens, ordine eodem semper positis, scilicet:

1. Nomen Linnæi systematicum. 2. Pars plantæ usitata. 3. Classis et Ordo sub quibus in systemate Linnæano occurrit. 4. Duratio plantæ et locus ubi naturaliter crescit. 5. Nomen pharmaceuticum s. officinale vulgo usitatum, subjuncto ubique nomine Gallico, Germanico, Anglico, et, ubi illud a latino Linnæano differt, Hispanico. 6. Qualitates physicæ, nec non principium ACTIVUM in quo præcipua plantæ virtus residet, ubicumque illud analysi chemica exacta determinatum novi. 7. Virtus medica. 8. Usus internus et ex-

ternus; nec non Forma sub qua communiter propinatur. 9. Dosis. 10. Præparata.

Qualitates physicæ sunt attributa sensibus obvia, ut odor, sapor etc.; Chemia vero analysi principia constitutiva corporum revelat. Ubi qualitates hæ incertæ aut mihi saltem incognitæ erant, nihil potuis quam vaga asserere malui.

Quod virtutes seu vires simplicium spectat, in iis admittendis circumspectiorem multo et difficiliorem me esse decuit, quam quidem hactenus generaliter a plurimis materiæ medicæ scriptoribus factum fuit: in hisce designandis quoque vocabula vaga, impropria, aut absurda omnia rejeci; fixis solum et propriis memet adstringens.

Erunt tamen fortassis quidam qui me in admittendo et numero et viribus plantarum non satis severum fuisse objicient; sed hos meminisse quæso, me non pro solis Medicis magnarum Europæ urbium, ubi optima quæque et efficacissima facile comparantur, sed pro practicis variorum climatum et regionum et qui sæpe in locis a Metropoli longe dissitis, praxin exercent, librum conscripsisse. Hos non raro,

præcipue dum optima ad manus non sunt, aut cum pauperibus consulendum est, plantas adhibere juvat quæ aut facilius aut meliori pretio comparantur, etsi virtute paulo inferiori gaudentes: Præterea pro varietate climatum et regionum latitudinem quandam suppellectilis medicæ commodam non solum sed et necessariam esse nemo qui peregrinatus est, inficias ibit.

Cæterum, quod virtutes plantarum in genere spectat, hic pauca quædam observare placet.

Plures in Europa, præprimis in Anglia, medicos novi, qui usum vegetabilium negligunt, plantasque omnes fere, tribus quatuorve solum exceptis, ex praxi medica sine ulla artis jactura exulare posse persuasum habent. Id quidem, re propius investigata, non miror. Multæ plantæ medicinales hodie, in pluribus regionibus prope Metropolim, præcipue lucri causa, in campis aut hortis coluntur, fumigato optime et irrigato indies solo: Giganteæ sic nascuntur soboles, splendidissima florum varietate superbientes, sed virtute debiles aut effœtæ omnino et oleraceæ. Quid mirum si Medicus tales plantas in

praxi adhibitas inefficaces inveniat, illasque ut inertes ex thesauro pharmaceutico sine damno proscribendas esse existimet; præprimis si Botanices ignarus easdem in locis natalibus ipse nunquam vidit. Judicium sane longe diversum ferret si easdem plantas in regionibus calidis, in Alpibus aut in locis demum quibuscumque, ubi natura illas sponte producit, proprio anni tempore decerptas examinasset. Hoc quidem adeo verum est ut feles noverim, quæ Valerianam officinalem sibi adeo amicam ut illam continua frictione brevi destruant, æstivo tempore dum effœta radix est, negligenter prætereant et ne quidem intueri dignentur.

Quæ circa vires plurium vegetabilium ratione anni temporis, regionis et soli natalis mox observavi, id quoque valet ratione curæ in iisdem exsiccandis et conservandis adhibitæ. Si plantæ cæterum efficacissimæ ex solo nativo, prorio anni tempore collectæ, in sole male siccantur; vel etiam in umbra sub atmosphæra sicca et sæpius mutata probe siccatæ, dein nudæ insectorum corrosioni aut in vasis vitreis radiis solaribus expositæ adservantur, fre-

quenter omnem omnino virtutem perdunt et pulverem terreum potius quam medicamentum æquant.

In locis præterea, ubi pharmacopolæ legibus nullis adstricti, botanices ignari aut ex aliis demum causis, plantas medicinales ipsi nunquam colligunt sed a mulierculis sub nominibus, quibus offeruntur, promiscue coëmunt, sæpe fit, ut planta una pro altera vendatur; aut plantæ recentes in officinis in cumulo diutius asservatæ, fermentantes, corruptæ vel effœtæ pro parandis extractis, tincturis, etc., adhibeantur. Taceo fraudem voluntariam qua medicamenta vel inertia vel corrupta aut noxia bonis et efficacibus toties in officinis pharmaceuticis, in opprobrium Medici et perniciem ægri, sponte et impune substituuntur. Hoc cum Valeriana officinali, cum Conio maculato, cum Polypodio filice, cum Arnica montana aliisque multis non semel ipse deprehendi. Inde fit ut Medici cæterum sagacissimi sæpissime decipiantur; et inde non raro circa virtutes medicamentorum saluberrimorum male sceptici, aut omnino increduli evadant.

Quæ de viribus simplicium mox memini,

non quidem ita intelligi velim, quasi causas allatas solas agnoscerem, nullasque præterea alias, cur remedia cæterum præstantissima toties fallant. Probe enim novi, Empiricos et Medicastros frequenter ineffaciæ medicamentorum adscribere, quod propriæ ignorantiæ aut judicii defectui potius attribuere deberent. Falluntur sæpe practici, quod simplicia aut inertia aut ambiguæ virtutis, vel demum farraginem medicamentorum indigestam promiscue præscribant: Decipiuntur sæpissime, quod medicamenta, licet efficacissima et vere heroica, causa vel natura morbi male cognita, administrent, minime ut videtur conscii, quod ad recte medendum non sufficit ut remedia generi morbi et speciei cuique aut etiam varietatibus quibusdam apprime accommodata sint; sed quod practico præterea in adplicatione remediorum ratio primaria habenda sit Habitus ægri, id est, virium naturæ reagentium, utpote a quibus effectus medicamentorum in corpore ægroto præprimis dependent. Hi effectus diversissimi sunt in subjecto forti aut debili, torpido aut morbose irritabili, cachectico aut antea sano; et inde

fit quod remedia cæterum eximia, male aut præpostere adplicata, modo nullos modo tremendos, aut plane exitiales producant effectus. Tyrones hinc facile mecum sentient, quod ad artem salutarem probe exercendam, plura omnino requirantur quam quidem vulgus et ægrorum et practicorum sibi communiter persuadet. Non vestitus affectatus, non frons rugosa aut faciei gravitas, nec superficiale demum pulsus, linguæ, urinæ etc., examen, aut servilis formularum imitatio et præscriptio Medicum constituunt. Ut morbi graviores debellentur, habitus ægri et natura ægritudinis probe investiganda, causæ morborum rite determinandæ, et remedia iisdem ad amussim adplicanda sunt : hæc sedulam post studium multorum annorum, ad lectum ægri attentionem et meditationem, examen profundum, judicium sanum et ingenium acutissimum sæpe requirunt.

Hæ sunt qualitates quæ Medicum philosophum a practicis vulgaribus, et empricis (spuriis eheu artis filiis), linea acuta distingunt. Hic solus novit, vires multorum medicamentorum magis certas esse, quam quidem Medicastri sibi vulgo persuadent :

Hic solus, quidquid contra ignari declament, convictus est, multos hodie curari morbos, quos Hippocrates suo tempore curare non potuisset, et gravissima intra paucos sæpe dies debellari mala, quæ ab ignaris non infrequenter vel frustra tentantur, vel per menses et annos misere trahuntur.

Præmissis hisce observationibus quæ Tyronibus satis inculcari non possunt, ad scopum meum redeo.

Qualitates corporum sunt attributa sensibus externis evidentia, aut analysi chemica eruta.

CHEMIA partes plantarum constitutivas reserans principium eorum activum revelat : *Balsamicum ; oleosum fixum, vel volatile ; principium extractivum, gummosum seu mucilaginosum, resinosum, gummoso aut extractivo-resinosum*, etc.

SAPOR a lingua percipitur et aquæ aut aut salivæ solubilia manifestat :

Fatua, insipida, aquosa ;
Oleracea, mucilaginosa, pinguia ;
Aromatica, acria, pungentia ;
Calida, fervida, urentia ;
Salsa, acida, austero-styptica ;
Dulcia, amara, nauseosa.

ODOR nares ferit et volatilia indicat:
Inodora, fragrantia, suaveolentia;
Ambrosiaca, hircina, graveolentia;
Fœtida, tetra, suspecta.

Fidem quam merentur simplicia, interdum uno alterove vocabulo indicavi; sic quod potentiam agendi spectat: *Præstantia, eximia, heroica, suspecta, venenata.* De dubiis autem vel omnino inertibus aut nihil dixi, aut signum (?) adjeci.—Cæterum quod nomina virium spectat, per se facile intelliguntur fere omnia, hinc ea hic recensere superfluum esset, præcipue cum eadem ad finem operis recensita sint. Sub *Adstringentibus* vegetabilia principio adstringente seu coriario, chemicis sub nomine *acidi gallici* noto, intelligo; sub *Stomachicis* ea quæ digestioni vitiatæ medentur. *Cardiaca* appellavi quæ motum cordis et systematis arteriosi augent; *Nervina* quæ actionem systematis nervosi languidam erigunt. Sub titulo *Alterantium* medicamenta intelligo quæ statum corporis cachecticum aut cacochymicum mutare valent; sub *Alexipharmacis* ea volo quæ venena in ventriculo aut intestinis hærentia aut externe per vulnera adplicata immutant aut destruunt. *Deobstruentia*

denique appello remedia quæ præcipue Physconiæ abdominali medentur; *Resolventia* e contra ea quæ externe adplicata absorptionem humorum ex tumoribus topicis promovere videntur.

Quod nomina morborum spectat, quos sub usu medicamentorum adduxi, Nosologiam Culleni secutus sum, paucis exceptis. Sub *Ataxia* mobilitatem systematis nervosi morbosam intelligo; sub *Physconia abdominali* autem obstructionem viscerum non solum sed et infarctum vasorum abdominalium (morbos in praxi hodie frequentissimos) comprehendo.

Menagogum specificum nullum novi præter terrorem subitum. — Ea quæ sub hoc titulo indicavi pharmaca, naturam ad hanc evacuationem dispositam solum juvare videntur.

Signum (?) adjectum dubium indicat an remedium in dato casu revera valeat.

Dosis notata ubique; ubi aliter expressum non est, ætati mediæ convenit.

Præparatorum nonnisi efficaciorum et vere utilium memini sub titulis sequentibus: Aqua (vulgo *aqua stillatitia*); Alcohol (vulgo *spiritus plantæ*); Oleum volatile (vulgo *oleum essentiale* s. *æthereum* s. *stil-*

latitium); Oleum fixum (vulgo *oleum unguinosum* s. *expressum*); Tinctura; Extractum; Succus inspissatus; Conserva; Syrupus. — Composita nulla adduxi, utpote virtutem ab ingrediente simplici maxime activo mutuantia.

Ad finem denique, præmisssis indicibus amplis, in opere tali præprimis necessariis, indicem virium adjeci, in quo simplicia juxta virtutes quas in corpore exserunt, ordine alphabetico disposita sunt.

Et hic quidem lectores fortasse plures titulos frustra quærent a me studio, non negligentia, omissos. Cæterum, ut supra monui, nullus sibi persuadeat, morbos simplici et servili adplicatione remediorum sub diversis titulis insertorum curari. Sed hic labor, hic opus: Dona naturæ lectura et instructione acuuntur; defectum eorum nullus liber supplere valet. Medicamenta præstantissima, imo ipsa heroica, sæpe fallunt si promiscue ut quidem vulgo frequentissime fieri solet, nulla aut naturæ aut causæ aut stadii morbi aut habitus ægri, ratione habita administrantur. Specifica, ut vocant remedia, utpote quæ morbo cuicunque fixo, semper et sub

omni temperamentorum et causarum diversitate debellando paria sint, nulla agnosco. Cinchona dialeipyram non semper tollit : Syphilis, sub diversis et morbi et ægri circumstantiis, diversa omnino Hydrargyri præparata poscit; hinc sales et oxyda hujus metalli ad debellandum hunc morbum cæterum efficacissima promiscue, nulla aut ægri aut morbi status ratione habita, adplicata non raro fallunt; et Opium ipsum ex eadem causa spasmum non semper compescit, nec erethismum aut dolorem ubique sedat.

Ultimo demum Elenchum medicamentorum simplicium nuper a sagacissimo medico E. DARWIN in *Zoonomia* sua secundam novam theoriam propositum subjunxi, cujus meritum non discutio, sed practicis philosophis dijudicandum relinquo; sicque opus absolvi. — Intra paucum tempus, si otium favet, Pharmacopœam Medici practici seu Epicrisin analyticam medicamentorum præparatorum et compositorum quæ a Practicis Europæ, ingenio et probitate jure celebribus, efficacissima inventa novi, publico juri tradere intendo.

DE PONDERIBUS

ET MENSURIS PHARMACEUTICIS.

Pondera pharmaceutica, in diversis Europæ regionibus usitata, sunt :

Granum (grj.) g. *un grain*, ge. *ein gran*, a. *a grain* æstimatur pondere æquare granum piperis. Quando igitur pars grani $\frac{1}{2}$ aut gr. $\frac{1}{4}$ præscribitur, granum piperis in duas aut quatuor partes finditur.

Scrupulus (℈j.) g. un *scrupule*, ge. ein *skrupel*, a. a *scruple*, continet grana viginti. In gallia scrupulus continet grana vigiuti quatuor.

Drachma (ʒj.) g. un *gros* ou une *drachme*, ge. ein *quentchen*, eine *drachme*, a. a *drachm*, a *dram*, continet scrupulos tres aut grana sexaginta ; in gallia vero grana septuaginta duo.

Uncia (℥j.) g. une *once*, ge. eine *unze*, a. an *ounce*, continet drachmas octo, seu grana 480.

Uncia semis seu dimidia (℥ß.) g. une *demi-once*, ge. ein *loth*, eine *halbe unze*, a. *half an ounce*, contiuet drachmas quatuor.

Libra medicinalis (℔j.) g. une *livre* ge. ein *pfund*, a. a *pound;* continet uncias duodecim, seu grana 5760; — iu gallia uncias sedecim.

Libra civilis, continet uncias sedecim.

Hæc tamen ponderum divisio, apparenter fere æqualis, pro ratione regionum multum differt. Nam Gallorum æque ac Anglorum libra pondere superat libram Germanorum, ita ut horum libra medicinalis unciis undecim cum drachmis quinque et semis Gallorum æquivaleat; ac drachmis tribus cum scrupulis duobus et granis XIII $\frac{21}{103}$ levior sit libra Anglorum.

Pondera supra dicta, eadem ratione divisa, ubique fere etiam pro determinandis liquidis inservinnt.

Mensuræ pro medicamentis siccis, præcipue herbis, usitatæ, vagæ omnino sunt:

Fasciculus = unc j.

N. B. juxta alios fasciculus æquivalet unciis sex aut manipulis duodecim.

Manipulus = unc ß.

Pugillus (quantum tribus digitis capi potest) = drachm ß vel j.

Mensuræ pro liquidis usitatæ sunt sequentes:

Cochleare majus = unc ß.

Cochleare minus = drach j.

Pinta Anglorum = lib. j seu unc. XVI.

Pinta Gallorum (*Pinte*) = lib. ij seu unc. XXXII.

Mensura una Germanorum = lib. ij — iij.

— dimidia (Nœssel) = lib. j ß.

Mensuræ quadrans = unc. x — xii.

Congius Anglorum (*gallon*) = libris seu pintis Anglicis viij.

Cantharus Snecorum = lib. v ß.

Ex dictis patet, in genere præstare, liquida æquè ac sicca, pondere potius quam mensura, præscribere.

ADPLICATIO

Novorum Galliæ ponderum & mensurarum pro usu medico-pharmaceutico.

Mensuræ novæ quæ æstimandis ponderibus in Gallia nuper in usum publicum introductæ fuerunt, communem ducunt normam a gravitate aquæ, certum quoddam volumen (ad datam temperaturam) occupantis: hocce liquidi volumen definitum est ope novarum mensurarum linearium, quæ ipsæ ex magnitudine terræ deductæ sunt, et ad longitudinem arcus meridiani, a polo ad æquatorem ducti, tanquam ad primigeniam unitatem referuntur.

Pondus centimetri cubici aquæ destillatæ, summe condensatæ, quæ ad gradum glaciei quam proxime accedit, *gramma* audit.

Pondus decimetri cubici ejusdem liquidi nuncupatur *kilo-gramma*, quod idem audit ac gramma millies repetitum.

Unitates quæ gramma subdividunt, totidem sunt grammatis fractiones decimales quæ designantur nominibus *deci-gramma; centi-gramma; milli-gramma;* quasi diceres decima, centesima, millesima pars grammatis.

A grammate ad kilo-gramma fit progressio per unitates pariter decimales; quæ sunt *deca-gramma* et *hecto-gramma;* quorum prius decem grammatibus, posterius centum grammatibus æquivalet.

Unitas decimalis quam dividit *kilogramma*, insignitur nomine *myria-gramma;* cujus interpretatio est *gramma* decies millies adsumptum.

Unaquæque ex prædictis unitatibus prostat metallo confecta, et in usum communem traditur, ponderibus quibuslibet æstimandis dicata; et ut ponderatio facilior redderetur, unicuique unitati suum Duplum, suus Semis adscribuntur.

Quæ cum ita sint, fluit series haud interrupta novorum ponderum, quorum valores partibus libræ et semi-libræ consignatos et veritati proximos subministrat tabula sequens.

Duplum myriagramma = libris 40.

Myriagramma = libr. 20.

Semi-myriagramma, aut 5 kilogrammata = libr. 10.

Duplum kilogramma = libr. 4.

Kilogramma = libr. 2.

Semi-kilogramma, aut 5 hectogrammata = libr. 1.

Duplum hectogramma = unciis 6.

Hectogramma = unc. 3.

Semi-hectogramma = unc. $1\frac{1}{2}$.

Duplum decagramma = unc. $\frac{2}{3}$.

Decagramma = unc. $\frac{1}{3}$.

Semi-decagramma = unc. $\frac{1}{6}$.

Duplum gramma = drachm. $\frac{1}{2}$.

Gramma = drachm. $\frac{1}{4}$.

Semi-gramma = granis 9 ad 10.

Duplum decigramma = grau. 4.

Decigramma = grau. 2.

Semi-decigramma, aut 5 centigrammata = grano 1.

Centi-gramma = grani $\frac{1}{5}$.

Præcedentem tabulam vel leviter perlustranti facile patebit, pondus 100 librarum in veteri systemate vulgo dictum centenarium (*quintal*) idem esse cum quinque Myriagrammatibus; unam libram parem esse quinque hectogrammatibus; unciam quam proxime accedere ad trientem hectogrammatis; drachmam ad quatuor grammata; granum ad semi-decigramma aut quinque centigrammata.

His probe intellectis, nullam difficultatem facessere potest conversio veterum mensurarum in novas. Hæc operandi ratio nullas medicis aut pharmacopolis moras causabit. Sat erit hic loci nonnulla referre exempla

conversionum quæ magis communiter occurrunt :

Quadrans grani = 1 aut 2 centigramm.
Semi-granum = 3 centigramm.
Granum = 5 centigrammatibus.
2 Grana = 1 decigrammati.
10 Grana = 5 decigrammatibus.
20 Grana = 1 grammati.
30 Grana = 1 $\frac{1}{2}$ grammati.
40 Grana = 2 grammatatibus.
1 Drachma = 4 grammatatibus.
1 Uncia = 3 decagrammatatibus.
1 Libra = 5 hectogrammatatibus.

Ex tabula præcedenti patet summam decigrammatum prodire, quando granorum numerus per numerum 2 dividitur, haud aliter quam in novis monetis Gallicis decimorum (*décimes*) summa obtinetur, dum per 2 dividitur numerus assium Gallicorum (*sous*).

Hinc concluditur grana 4; 6; 8 deci-grammatibus 2; 3; 4 : — et grana 5; 7; 9 decigrammatibus 2 $\frac{1}{2}$; 3 $\frac{1}{2}$; 4 $\frac{1}{2}$ coæquari.

Cæterum nullus existimet, rem ad vivum resecandam esse, atque, quando præscribuntur *ex. gr.* grana duo tartari stibiati aut drachmæ duæ sulfatis magnesiæ vel unciæ duæ aquæ aut tincturæ cujuscumque, incumbere curam, doses consignandi modo qui strictissime cum novis ponderibus conveniat; neminem enim

fugiet, nec plus nec minus proficua fore medicamina, si in dosi deficiant aut abundent nonnullæ portiunculæ aut corpuscula, quorum præsentia aut absentia vix indicatur trutina perfectissima. Id solum curandum, ut doses consignentur numeris rotundis; hosce autem et quidem solos indicat præcedens tabula.

Quicunque forte doses ponderibus libratas novis numeris exactissime expressas noscere desiderat, illi sequentes observationes servient.

In superiori tabella legitur, duo grana æquivalere uni decigrammati; revera autem unum decigramma continet duntaxat granum unum cum fractione $\frac{89}{100}$; dum ponitur ergo unum decigramma pro duobus granis in dosi quæ adhiberi intenditur, fractio $\frac{1}{20}$ deficit, quæ omnino negligi potest.

Pariter quando dicitur drachmam unam æqualem esse grammatibus quatuor, excipitur numerus fractus $\frac{1}{22}$; quatuor quippe grammata unam conficiunt drachmam cum tribus granis et grani triente; hinc, dum præscribuntur quatuor grammata pro una drachma, dosi genuinæ additur fractio $\frac{1}{22}$.

Ubi uncia pro tribus decagrammatibus accipitur, ex legitima dosi detrahitur pars $\frac{1}{31}$.

Porro quisque facile conveniet rem esse plane indifferentem, si pro grano uno

pars $\frac{18}{20}$ aut $\frac{19}{20}$ grani; pro drachma una, drachma cum tribus aut quatuor granis, (75 grana pro 72 granis); pro uncia una, uncia minus granis undecim (565 grana pro 576 granis) sumantur. Hi sunt tamen limites ultra quos non excurrunt errores quos admittit computandi ratio quæ in superiori tabella proposita fuit.

Insuper considerari meretur, in novo ponderum systemate medicis offerri modum doses accomodandi ætati et temperamentis, longè commodiorem, quam in veteri systemate; calculus enim decimalium, longe facilius quam calculus vulgaris obviam reddit rationem quam habent unitates cujusvis ordinis ad unitates ordinis superioris. Ex. gr. non ita facile videtur quid sint 20 grana ad unciam; contra, quid sit gramma hectogrammati comparatum, sine mora percipitur, nomine quo signatur unitas ordinis superioris, indicante illam esse unitatem ipsissimam ordinis inferioris centies repetitam.

Quod mensuras capacitatis pro liquidis mensurandis attinet, mensuræ novæ veteribus in præscriptionibus formularum commode substitui possunt methodo sequenti:

Litrum (*le litre*) aquæ destillatæ æquivalet pintæ Parisinæ (*pinte*) seu libris duabus et drachmis quinque gallicis veteribus; et pondere æquat kilogramma.

SEMILITRUM (*demilitre*) æquivalet libræ uni cum drachmis duabus et semis (*chopine*).

DUPLUM DECILITRUM æquivalet unciis sex cum drachmis duabus (*quart de pinte* ou *demi-septier*) et pondere æquat duplum hectogramma.

DECILITRUM æquivalet unciis tribus cum drachma una et pondere æquat hectogramma.

SEMI-DECILITRUM æquivalet unciæ uni cum drachmis sex (*gobelet*; cyathus), et pondere æquat quinque decagrammata.

N. B. *Litrum* continet circiter 50 pollices cubicos veteres; hinc *duplum centilitrum* (*double centilitre*) respondet pollici cubico, seu drachmis quinque, seu cochleari majori aquæ destillatæ.

Hic gradum sisto atque præsentibus observationibus finem impono; quæ si nulla ex parte, ut spero, claudicent, medicis offerunt maximam facilitatem mensuras et pondera vetera in nova commutandi.

CANONES.

1. *Radices sero autumno, postquam folia caulesque emarcuere, vel hyeme aut primo vere antequam folia germinant, effodiantur. In delectu radicum, spongiosæ, farinaceæ, cariosæ, imprimis vero exsucco cortice tectæ, rejiciantur; Bonitatem enim radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus. Quæ principiis aromaticis et resinosis præditæ sunt radices, lotione non purgentur; sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur. Prægrandes et succulentæ Radices in taleolos dissectæ, reliquæ quales sunt, cito siccentur, aut loco calido umbroso ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore, siccatæ frigido siccoque serventur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut uredine atque carie exedantur. Fragrantes vasis clausis, omnes locis umbrosis conserventur. Inquilinæ, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus aut facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recenter legantur et arcessantur. Quibus siccatis exigua, recentibus vero multa virtus est, ut Cochleariæ armoraciæ, Iridum, Ari maculati, Scillæ maritimæ, Bryoniæ albæ, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco reconditæ, serventur.*

2. *Ligna hyberno succidantur tempore, mox findenda. Stipites versus autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, resecentur. Cortices e fruticibus autumno, ex arboribus adulta hyeme aut accedente vere, dum facillime a ligno secedunt, aut hyeme deglubantur.*

3. *Turiones gemmæque primo vere, quo tempore turgidulæ sunt et ante explicationem foliorum decerpantur. Herbæ colligantur adultæ cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint : Quæ semper virent, quovis tempore colligere licet; verum tamen præstat. Folia colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simul ac ros, quo noctu canescunt plantæ, solis radiis dissipatus fuerit; decerpantur vero postquam defloruit et antequam semina maturavit planta. Herbæ indigenæ quotannis recentes comparari debent; effœtæ superstites, si placet, pro sale alcalino herbarum adhiberi possunt. Exsiccatio herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso et ab aëre perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.*

4. *Flores, absque calice et pistillo, sola corolla servata, decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploserint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. Coma floris colligenda dum*

flos explicari incipit. Siccentur ut herbæ, et quidem quam fieri potest citissime.

5. Semina colligantur perfecte matura, dum sponte a planta secedunt, antequam excidant, locoque ab aëre perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Quæ capsulas, involucra etc. retinent, ea his munita serventur: Plerorumque autem seminum delectus ita instituendus est, ut aquæ immittantur, et quicquid supernatat abjiciatur; quod vero fundum petit iterum siccetur. Fructus nonnisi maturi decerpantur, dum pericarpia sponte sese aperire incipiunt.

In genere notandum, vegetabilia tempore anni improprio vel ex solo artificiali, non nativo, collecta, aut male siccata, et negligenter conservata effœta sæpissime, aut plene corrupta esse; hinc a medico practico prudenti adhiberi nunquam debent nisi ex solo ubi natura eadem sponte producit, decerpta. Alpina ex Alpibus, et quæ solum sabulosum aut paludosum amant ex solo sicco arenoso aut ex humido palustri colligenda; eaque probe siccata in locis aut vasis ab accessu radiorum solarium sollicite conservanda sunt, siquidem virtutes earum in curandis morbis efficaces experiri desideramus.

MATERIA MEDICA.

I. VEGETABILIA EORUMQUE PRÆPARATA.

A

ACANTHUS MOLLIS. Folia; herba.
CLAS. *Didyn.* O. *Angiosp. Perennis; Europ. austral.*
OFFICINIS. *Branca ursina.* GALLIS. *Pied-d'ours.* GERMANIS. *Baehrenklau.* ANGLIS. *Smooth bear's breech.* HISPANIS. *Pie de oso.*
QUALITAS: mucilaginosa.
VIRTUS: emolliens?
USUS: ambusta?
DOSIS:
PRÆPARATA:

ACHILLEA AGERATUM. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl. Perennis; Europ. austr.*
OF. *Ageratum.* A. *sweet milfoil, or maudlin.*
QUAL. Odor suaveolens; sapor amaricans, aromaticus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia.
DOS.

ACHILLEA ATRATA. Herba.
OF. *Genipi veri herba.*

ADONIS VERNALIS. } Radix.
——— APENNINA. }

CL. *Polyandr.* O. *Polyg.*
VIRT. Menagoga (PALLAS.)

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM. Cortex.
CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Arborea.*
G. *Marronier d'Inde.* GE. *Wilder kastanienbaum.*
A. *Common horsechesnut.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS *extracti vel pulveris :* intermittentes.
PRÆP. Extractum.
DOS. Drachm. j. Extracti in unc. j aquæ cinnamomi, cujus gutt. lx. omni trihorio.

ÆTHUSA MEUM. Radix.
CL. *Pent.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina; Europ. austral.*
OF. *Meum; meu radix.* A. *Common spignel or bawd-money.*
QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, calefaciens.
VIRT. Stimulans; carminativa.
USUS. Tertiana; asthma pituitosum; leucorrhœa.

AGARICUS MUSCARIUS.
CL. *Cryptogam.* O. *Fungi.* *In sylvis.*
QUAL. Venenata.
VIRT. Cathartica; sudorifica.
USUS *sucoi inspissati :* Vulgo ad necandas muscas.

*

USUS *internus* : Epilepsia ; paralysis à morbis cutis retropulsis. *Externus* pulveris inspersi : ulcus malignum ; gangræna.

DOS. Pulveris gran. x—xxx cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terræ insidens sola, autumno colligenda, mundata, siccata, et pulverisata in vasis probe clausis usui servetur.

AGAVE AMERICANA. Folia.

USUS *decocti* : Syphilis.

DOS. Unc. j ad libr. j aquæ, quotidie.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Dodecand.* O. *Digyn.* *Perennis.*

OF. *Eupatorium veterum; agrimonia.* G. *Aigremoine.* GE. *Odermennige.* A. *Common agrimony.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

AJUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis; in nemorosis siccis.*

OF. *Herba consolidæ mediæ s. Bugula.* G. *Bugle pyramidale.* A. *Mountain bugle.*

QUAL. Amara; substyptica.

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL. *Monadelph.* O. *Polyandr.*

USUS chemicus, ut eximium reagens.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis; Asiatica; hortensis*

ADONIS VERNA.
———— APPENNINA. } Radix.

CL. *Polyandr.* O. *Polyg.*
QUAL.
VIRT. Menagoga (PALLAS.)
USUS.

ÆSCULUS HYPOCASTANUM. Cortex.
CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Arborea.*
GE. *Wilder kastanienbaum.* A. *Common horsechesnut.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS *extracti vel pulveris* : intermittentes.
PRÆP. Extractum.
DOS. Drach. j. Extracti in unc-j aquæ cinnamomi, cujus gutt. lx. omni trihorio.

ÆTHUSA MEUM. Radix.
CL. *Pent.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina; Europ. austral.*
OF. *Meum; meu radix.* A. *Common spignel or bawd-money.*
QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, calefaciens.
VIRT. Stimulans; carminativa.
USUS. Tertiana; asthma pituitosum; leucorrhæa.

AGARICUS MUSCARIUS.
CL. *Cryptogam.* O. *Fungi.* *In sylvis.*
QUAL. Venenata.
VIRT. Cathartica; sudorifica.
USUS *succi inspissati*, vulgo ad necandas muscas.

USUS *internus* : Epilepsia ; paralysis à morbis cutis retropulsis. *Externus* pulveris inspersi : ulcus malignum ; gangræna.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terræ insidens sola, autumno colligenda, mundata, siccata, et pulverisata in vasis probe clausis usui servetur.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Dodecand.* O. *Digyn.* *Perennis.*

OF. *Eupatorium veterum ; agrimonia.* G. *Aigremoine.*

GE. *Odermennige.* A. *Common agrimony.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

AJUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis ; in nemorosis siccis.*

OF. *Herba consolidæ mediæ seu Bugulæ.* A. *Mountain bugle.*

QUAL. Amara ; substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL. *Monadelph.* O. *Polyandr.*

QUAL.

VIRT.

USUS chemicus, ut eximium reagens.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. & O. *præced.* *Perennis ; Asiatica ; hortensis.*

OF. *Malva arborea.* GE. *Stockrosen.* A. *Common hollyhook.*

QUAL. Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *infusi* forma gargarismatis: cynanche.

ALCHEMILLA VULGARIS. Herba; radix.

CL. *Tetradyn.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Alchemilla.* G. *Alchemille.* GE. *Frauenmantel; sinau.* A. *Common ladiesmantle.* H. *Alchemila vulgar; o pie de leon.*

QUAL. inodora; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

ALLAMANDA CATHARTICA. Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Frutex scandens; Guiana.*

A. *Willow leaved allamanda.*

QUAL. Lactescens; amara.

VIRT. Cathartica; stomachica.

USUS *infusi:* colica pictonum.

ALLIUM CEPA. Radix recens; succus radicis.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Biennis.*

OF. *Cepa.* G. *Oignon.* GE. *Zwiebel.* A. *Common onion.* H. *Ajocebolla.*

QUAL. *Recentis:* odor peculiaris, *alliaceus* dictus, volatilis; sapor acris.

VIRT. Diaphoretica; anthelminthica; flatulenta;

aphrodisiaca ; diuretica ; rubefaciens. *Radicis coctæ :* emolliens; maturans. *Assatæ :* stimulans.

USUS *externus succi :* otalgia; dysecoea rheumatica. *Radicis* forma cataplasmatis: phlegmone; bubo; varix ani.

ALLIUM SATIVUM. Radix recens; ejusque succus.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Allium.* G. *Ail.* GE. *Knoblauch.* A. *Cultivated leek.* H. *Ajo sativo.*

QUAL. In principio acri et pauco oleo volatili residens; odor alliaceus, volatilis; sapor acris, subcausticus.

VIRT. Præstans: diuretica; diaphoretica; anthelminthica; rubefaciens; maturans.

USUS *succi externus :* dysecoea; herpes; clavus. *Radicis recentis, vel succi :* quartana; dyspepsia; hydrops; asthma pituitosum; scorbutus.

ALOË PERFOLIATA.
——— SPICATA,
Aliæque VARIETATES. } Succus extractivo-resinosus inpissatus.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Perennis*; *Afric. Ind. occid.*

OF. *Aloë* socotrina : *succus optimus incisione foliorum obtentus in insula Socotora.* Hepatica : *vilior expressione in insulâ Barbadoes.* Caballina : *pars post expressionem residua.* G. Ge. A. *Aloë.*

QUAL. Heroïca : in principio extractivo-resinoso residens; sapor intense amarus, nauseosus; odor nauseosus.

VIRT. Cathartica, intestinum rectum præcipue irritans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS *internus* : Obstipatio; pyrosis; dyspepsia; hæmorrhois suppressa. *Externus* : ulcus putridum; caries; otorrhœa; epiphora gr. j. pulv. oculo inflatum.

PRÆP. Extractum aquosum; tinctura; vinum.

DOS. Succi vel ejusdem extracti aquosi gr. ij; Tincturæ unc. semis—ij. Vini aloët. drachm. ad unc. semis.

ALOËXYLUM AGALLOCHUM (LOUREIRO.) Lignum.

CL. *Decandr.* O. *Monogyn.* *Arbor. Cochinchin.*

N. B. Alii hoc lignum ab *Excœcaria agallocha* derivant.

OF. *Lignum aloës S. agallochum verum.*

QUAL. Lactescens; venenatissima; medullitium trunci amarissimum.

VIRT. Inebrians; anthelminthica; excorians.

USUS. Cholera; paralysis.

DOS. Gran. xx.

ALTHÆA OFFICINALIS. Radix; herba.

CL. *Monad.* O. *Polyand. Perennis; in locis humidis.*

OF. *Althæa.* G. *Guimauve.* GE. *Eibisch.* A. *Marshmallow.* H. *Malvavisco.*

QUAL. Mucilaginosa; insipida.

VIRT. Lubricans; emolliens.

*

USUS. Tussis; raucedo; stranguria. *Externus* forma enematis vel cataplasmatis: tenesmus; phlegmone.

AMLICA INDICA. Fructus; pulpa fructus.

Tamarindus Indica. (L.) *Arborea; Ind. orient.*

N. B. Hoc nomen LINNÆI significans: *Arbor dactilifera*, improprium et absurdum est. Vid. *Asiatick Researches.*

AMMI COPTICUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Dygin.* *Ind. orient.*

N B. An semen *Adiowaen* dictum ex hac planta provenit?

Vid. Semen Adiovaen. p. 214.

AMMI MAJUS. Semen.

OF. *Ammi vulgare.* *Annua; Europ. austral.*

QUAL. Leviter aromatica; carminativa.

AMOMUM CARDAMOMUM. Semen.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Indiæ orientalis.*

Amomum repens. (SONNERAT.)

OF. *Cardamomum minus.* G. *Cardamome.* GE. *Kleine kardamomen.* A. *Lesser cardomom.*

QUAL. In oleo volatili residens; sapor acris, fervidus, aromaticus; odor gratus, fragrans.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; chlorosis.

PRÆP. Tinctura.

DOS. Pulveris gran. x—xxx. Tincturæ drachm. j—ij.

AMOMUM GRANUM PARADISI. Semen.

OF. *Cardamomum majus s. maximum.* G. *Amome de Madagascar.* A. *Grains of paradise.*

QUAL. In principio resinoso magis quam oleo volatili residens; sapor urens instar piperis; odor subaromaticus.

AMOMUM ZINGIBER. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis; Ind. oriental.*

OF. *Zingiber s. zinziber fuscum et album.* G. *Gingembre.* GE. *Ingwer.* A. *Ginger.*

QUAL. In oleo volatili et pauco principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, fervidus; odor gratus, subfragrans.

VIRT. Calefaciens; sialagoga; stomachica.

USUS. Dyspepsia; podagra aberrans; tussis stomachica; colica flatulenta; diarrhæa. *Externus:* uvulæ laxitas.

PRÆP. Conditum; tinctura.

DOS. Pulv. gran. v—x—xxx, per se vel cum lacte. Conditi drachm. j—iv. Tincturæ drachm. j—ij.

AMYGDALINUS COMMUNIS. Nuclei.

Varietas. a. sativa: dulcis et amara.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Amygdalæ dulces et amaræ.* G. *Amandes douces et amères.* GE. *Bittere und süsse mandeln.* A. *Sweet et bitter almonds.*

QUAL. In oleo fixo unguinoso residens.

VIRT. Nutriens; involvens; emolliens.

USUS *dulcium:* febres; tussis. *Amararum:* ebrietas; vermes.

PRÆP. Emulsio ex amygdalis dulcibus. Oleum ex dulcibus vel amaris promiscue paratum.

AMYGDALUS PERSICA. Folia; flores recentes; nuclei.

G. *Pêcher.* GE. *Pfirsichbaum.* A. *Common peach-tree.*
QUAL. *Nuclei :* oleoso-mucilaginosa; odor florum peculiaris, nauseosus.
USUS *decocti folior.* Hæmaturia; dysuria; nephritis.
PRÆP. Aqua florum.
DOS. Unc. j in lib. ij aquæ ad colat. unc. xviij, ejusque unc. vj bis die.

AMYRIS ELEMIFERA Resina.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arborea; Americ.*
OF. *Gummi Elemi.*
QUAL. Color pellucidus, flavescens.
VIRT. Resolvens; stimulans.
USUS *externus* in emplastris et unguentis : tumores; punctura.

AMYRIS KATAF. Gummi-Resina.

N. B. Hæc planta *Olibanum* s. *Thus* suppeditat (FOERSKAL).

USUS : Leucorrhœa. Item ad suffitus.
DOS. Drachma semis—una.

AMYRIS GILEADENSIS. } Vide Balsamea
——— OPOBALSAMUM. } Meccanensis.

AMYRIS ZEYLANICA (RETZIUS). Resina.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Zeylan.*
OF. *Gummi Elemi orientalis.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac amyr. elemiferæ.

ANACARDIUM OCCIDENTALE. Nux. (Testæ melligo).

CL. *Enneandr.* O. *Monog.* *Arbor; Ind. orient. et Brasil.*
A. *Cashew-nut.*

QUAL. *Melliginis* : nigra; urens.
VIRT. Excorians, tinctoria.
USUS. Maculæ; impetigo; herpes.

ANAGALLIS ARVENSIS. Herba.

N. B. Colligenda antequam flores explicati sint.

Varietas : a. flore rubro b. flore luteo.

SYL. *Pentand. O. Monog.* *Annua.*

REF. *Herba anagallidis rubræ.* GE. *Rother hünnerdarm; rother gauchheil.* A. *Red pimpernell.*

QUAL. Inodora; sapor acris, nauseosus.

USUS. Epilepsia; melancholia. *Extracti* anag. flore luteo : icterus. (STOLL.)

DOS. Pulveris gr. xx. quater de die. *Extracti*: ʒj-ij. Pro infuso ʒij. ad ℔j. aquæ.

ANAGYRIS FŒTIDA. Folia; semen.

SYL. *Dec. O. Monog.* *Frutex; Europ. austr.*

QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor amarus.

VIRT. Cathartica; menagoga.

USUS.

ANCHUSA OFFICINALIS. Radix; herba; flores.

SYL. *Pent. O. Monog.* *Perennis.*

REF. *Buglossum.* G. *Buglosse.* GE. *Ochsenzunge.* A. *Officinal buglass.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ANCHUSA TINCTORIA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Alcanna spuria s. vulgaris.* G. *Orcanette.* GE. *Rothe ochsenzunge.* A. *Alkanet, or dyer's bugloss.* H. *Anchusa de tinte.*

QUAL. Rubra.

VIRT. Tinctoria.

USUS.

ANDROPOGON NARDUS. Fibræ radicis.

CL. *Polyg.* O. *Monœc.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Spica nardi, s. spicæ indicæ radix.*

QUAL. Eximia: odor fragrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Cardiaca; stomachica.

USUS. Asthenia; Dyspepsia.

ANDROPOGON SCHŒNANTHUS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Arabiæ.*

OF. *Herba schœnanthi.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Carminativa; menagoga.

USUS.

ANEMONE HEPATICA. Herba; flores.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; montana.*

OF. *Hepatica nobilis.* A. *Hepatica.*

QUAL. Inodora; insipida.

VIRT.

USUS.

ANEMONE NEMOROSA. Herba; flores recentes.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

GE. *Waldanemone.* A. *Wood-anemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri volatili residens.

VIRT. Corrodens.

USUS *externus* loco cantharidum : cephalæa; tertiana; arthrodynia rheumatica; ischias.

ANEMONE PRATENSIS. Herba; florens.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis nemorosis, montanis, arenosis.*

OF. *Pulsatilla nigricans.* G. *Pulsatille; coquelourde.* GE. *Küchenschelle.* A. *Pasqueflower or meadow anemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; acerrima.

VIRT. Corrodens; rubefaciens; resolvens; diuretica.

USUS *succi inspissati :* amaurosis; paralysis. *Externus :* ulcus; herpes; caries.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo extractum;* infusum.

DOS. *Extracti :* gran. j-viij; pro infuso drach. j-iij ad ℔ j aquæ.

ANETHUM FŒNICULUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis vel perennis; hortensis.*

OF. *Semen fœniculi. s. fœniculum dulce.* G. *Fenouil,*

ou *anis doux.* GE. *Fenchel-saamen.* A. *Common fennel; sweet fennel-seed.* H. *Eneldo hinojo.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili, non acri, residens; odor teter; sapor dulcescens, aromaticus.

VIRT. Carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica infantum; defectus lactis; ophthalmia.

DOS. Pulv. gran. xx; pro infuso drach. ij-iij ad ℔j. aquæ.

ANETHUM GRAVEOLENS. Semen; herba.

CL. *Et* O. *Præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Anethum.* G. *Aneth* ou *fenouil puant.* A. *Common-dill.* H. *Eneldo de olor pesado.*

QUAL. Præstans: odor teter; sapor subaromaticus.

VIRT. Hypnotica; carminativa; lactifera.

USUS. Colica; singultus; vomitus.

PRÆP. Oleum volatile seminum; aqua; alcohol *vulg.* spiritus.

DOS. Olei volat. gutt v-x.

ANGELICA ARCHANGELICA. Radix; folia; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digy.* *Biennis; Alpina, passim hortensis.*

OF. *Angelica sativa.* G. *Angélique.* GE. *Engelwurzel.* A. *Garden-angelica.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; sialagoga; carminativa; sudorifica.

USUS. Dyspepsia; flatulentia.
PRÆP. Tinctura.

ANGELICA SYLVESTRIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *in locis humidis, nemorosis.*

A. *Wild angelica.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

ANTHEMIS COTULA. Herba cum floribus.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Annua*; *in viis et locis asperis.*

OF. *Cotula fœtida.* G. *Maroute* ou *camomille puante*; A. *Stinking camomile or may-weed.*
QUAL. Odor fœtidus; sapor amarus.
VIRT. Antispasmodica; stomachica.
USUS. Hysteria; asthma spasmodicum.

ANTHEMIS NOBILIS. Flores.

OF. *Chamælum nobile*; *Chamomilla Romana.* G. *Camomille romaine.* G. *Roemische kamillen.* A. *Common camomile.* H. *Manzanilla de Botera.*
QUAL. Eximia: in oleo volatili et extractivo amaro residens; odor suaveolens; sapor amarus.
VIRT. Antispasmodica; carminativa; stomachica.
USUS. Hysteria; colica spasmodica; flatulentia; intermittentes.

ANTHEMIS PYRETHRUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis, Europ. austral.*

OF. *Pyrethrum verum.* G. *Pyrethre* ou *racine salivaire.* GE. *Bertramwurzel; zahnwurzel.* A. *Spanish camomile, or pellitory of Spain.* H. *Anthemis pelitre.*

QUAL. Præstans: in principio resinoso residens; sapor acris, penetrantissimus, urens.

VIRT. Sialagoga; errhina.

USUS *masticatorius:* odontalgia rheumatica; paralysis linguæ; tumor glandularum salivalium.

ANTHIRRHINUM LINARIA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Biennis.*

OF. *Linaria.* A. *Common yellow toad-flax.*

QUAL. Præstans: odor hircino-urinosus; sapor subamarus.

VIRT. Diuretica; eccoprotica; alterans; resolvens.

USUS. Icterus; hydrops. *Externus*: ophthalmia; varix ani.

PRÆP. Unguentum.

APIUM GRAVEOLENS. Herba; radix; semen.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Apium.* G. *Ache des marais.* GE. *Sellery.* A. *Smallage.* H. *Apio de olor pesado.*

QUAL. Præcipue *seminum:* suspecta; in oleo volatili residens; odor subteter; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica; carminativa; phthiriaca.

USUS.

APIUM PETROSELINUM. Radix; herba; semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis.*

OF. *Petroselinum.* G. *Persil.* GE. *Petersilien.* A. *Parsley.* H. *Apio peregil.*

VIRT. *Radicis :* diuretica; resolvens; lactifuga; phthiriaca.

USUS. Icterus; dysuria; ablactatio; contusura; pediculi.

AQUILEGIA VULGARIS. Herba; flores; semen.

CL. *Polyand.* O. *Petrag.* *Perennis.*

OF. *Aquilegia.* A. *Common colombine.*

QUAL. Venenata. *Seminum:* mucilaginosa; oleosa.

VIRT.

USUS Herbæ : icterus; morbi cutis.

ARBUTUS UVA URSI. Folia.

CL. *Decand.* O. *Mongyn.* *Fruticosa; Europ. sept. in collibus arenosis.*

OF. *Uva ursi.* G. *Arbousier traînant; bousserole.* GE. *Baerentraube; sandberren; steinbeerenblaetter;* A. *Trailing arbutus, or bears-berry.* H. *Madroña uva de oso; guayuba.*

QUAL. Inodora; sapor amaro-stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Calculus urinarius; ulcus renum, vesicæ.

DOS. Gr. xx. drach. j-ij.

ARCTIUM LAPPA. Radix; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis.*

N. B. Duæ varietates.

OF. *Bardana; lappa major.* G. *Bardane; gloutron.* GE. *Klettenwuszel.* A. *Smooth-headed common &*

woolly-headed burdock. H. *Arcio lappa*; *lampazo.*

QUAL. *Radicis:* sapor dulcis, subausterus; odor nauseosus. *Seminum:* sapor intense amarus; urinam decolorans.

VIRT. *Radicis:* diuretica; alterans; *seminum:* cathartica.

USUS *decocti radicis:* morbi cutis; syphilis; arthritis?

DOS. Unc j-ij ad ℔j. aquæ.

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA. Radix.

CL. *Gynandr.* O. *Hexandr.* *Fruticosa*; *Ind. occid.*

QUAL. Odor nauseosus; serpentes fugans.

USUS *externus* succi vulneri instillati: morsura serpentum.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis*

OF. *Aristolochia vulgaris s. tenuis, s. clematitis.* G. *Aristoloche ordinaire.* GE. *Gemeine osterluzey.* A. *Upright birthwort.* H. *Aristolochia clematite.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor acris, amarus.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; resolvens.

USUS. Amenorrhæa retentionis; chlorosis; cachexiæ; cacoethes; fistula; sarcoma.

N. B. Substituitur quandoque aristolochiæ serpentariæ.

ARISTOLOCHIA LONGA.
ROTUNDA. } Radix.

CL. & O. *praced.* *Europ. austr.*
OF. *Long & round rooted birthwort.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA.
CL. & O. *præced.* *Jamaic.*
A. *Sweet-scented birthwort.*
QUAL.
VIRT.
USUS.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. Radix.
CL. & O. *præced.* *Perennis*; *Virgin. & Carolin.*
OF. *Serpentaria virginiana.* G. *Serpentaire.* GR. *Virginische schlangenwurzel.* A. *Virginian snakeroot.*
QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; odor hircinus instar valerianæ; sapor aromaticus, amaricans, acris, pungens.
VIRT. Stimulans; cardiaca.
USUS. Typhus; intermittentes; sphacelus; chlorosis; amenorrhæa retentionis; morsura serpentum. *Forma gargarismatis:* cynanche atonica.
DOS. *Pulveris*: gran. x-xxx; pro infuso drach. semis-iij ad ℔j. aquæ vel vini.

ARISTOLOCHIA TRILOBATA. Stipites.
CL. & O. *præced.* *Fruticosa*; *Surinam. Jamaic.*
A. *Three lobed birthworth.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARNICA MONTANA. Flores (*sine calice*); herba; radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina; in pratis montium.*

N. B. Foliis ovatis, integris, nervosis.

OF. *Arnica.* G. *Arnique.* GE. *Arnika; wolverley; Fallkraut.* A. *Arnica or german leopard's bane.* H. *Tobaco de montana.*

QUAL. Heroica: odor virosus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; errhina; antiseptica; resolvens.

USUS *infusi florum:* asthenia; arthrodynia rheumatica; contusura; amaurosis; paralysis; epilepsia? amenorrhæa; ischuria paralytica.

Radicis forma pulveris: diarrhœa, dysenteria; quartana; gangræna; synochus. *Externus:* ulcus malignum; sphacelus.

DOS. *Infusi* florum in sacculo suspensorum: drach. j-ij-iv. ad ℔j. aquæ. *Radicis pulv.* gran. v-x.

N. B. Cave ne flores substituantur aut misceantur floribus inulæ dysentericæ, hypochæridis radicatæ aut maculatæ; anthemis tinctoriæ, aliisve floribus flosculosis.

ARTEMISIA ABROTANUM. Herba; summitates.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; suffructic.*

OF. *Abrotanum hortense.* G. *Aurone mâle; citronelle-aurone.* GE. *Stabkraut; Stabwurz; Eberaute.* A. *Common southern wood.* H. *Yerba lombriguera.*

QUAL. Præstans : odor nidorosus; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Dyspepsia; amenorrhæa; lumbrici. *Externus* forma balnei, fotus, decocti vel infusi.

DOS. Unc j. ad ℔j. aquæ.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. Herba; summitates.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Absinthium vulgare.* G. *Absinthe.* GE. *Wermuth.* A. *Common wormwood.* H. *Artemisia axenjo.*

QUAL. Præstans; in oleo volatili et extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor intense et pure amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica; antiseptica; resolvens.

USUS. Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; amenorrhœa: icterus, tinea; achor; gangræna; vermes. *Externus* forma fotus, cataplasmatis.

PRÆP. Infusum aquosum et vinosum; tinctura; extractum; oleum volatile; conserva.

DOS. *Extracti :* drach. semis. *Conservæ* unc. j.

ARTEMISIA CAMPESTRIS.

A. *Field southern wood.* *Perennis; alpina.*

QUAL. et VIRT. Abrotani.

ARTEMISIA DRACUNCULUS. Herba recens.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Dracunculus.* G. *Estragon.* GE. *Dragon*; *kaisersallat.* A. *Taragon.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA GLACIALIS.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

A. *Silky wormwood.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA MARITIMA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium maritimum.* A. *Sea wormwood.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii.

ARTEMISIA PONTICA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium pontificum S. Romanum.* A. *Roman wormwood.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac absinthii, sed debilior.

ARTEMISIA RUPESTRIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *Alpina*; *Sibirica*, *Zelandica.*

OF. *Genipi albi herba.* A. *Creeping wormwood.*

QUAL. Odor grate aromaticus.

VIRT.

USUS. Febres intermittentes; amenorrhæa.

ARTEMISIA SANTONICA. Summitates ramulorum cum semine.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Semen cinæ s. contra. s. Santonici s. ʒedoariæ.* A. *Tartarian southern wood; or wormseed.* G. *Barbontine; santolina; poudre à vers.* GE. *Wurmsaamen; ʒwittersaamen.*

QUAL. Præstans : in oleo volatili residens; odor nidorosus; sapor acris, amarus.

VIRT. Anthelminthica; stomachica.

USUS. Vermes; anorexia.

DOS. Pro infantibus gran. x. drach. j. in pulvere vel electuario; drach. ij-iij. in infuso lactis.

ARTEMISIA VULGARIS. Herba; summitates.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Artemisia rubra et alba.* G. *Armoise ordinaire; herbe de St. Jean.* GE. *Beyfuss; St. Johannis gürtel.* A. *Mugwort.*

QUAL. Præstans : odor aromaticus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS. Tertiana.

PRÆP. Moxa.

ARUM MACULATUM. Radix recens.

Variet : A. Arum non maculatum. B. Ar. maculatum.

CL. *Gynand.* O. *Polyand.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.*

OF. *Arum.* G. *Gouet; pied de veau.* GE. *Arons-wurʒel; deuscher ingwer.* A. *Wake-robin.*

QUAL. *Recentis* Præstans : in principio acri, vola-

tili residens; sapor urens. *Siccatæ* : farinacea; subacris.

VIRT. Stimulans; sudorifica; expectorans; cosmetica. *Rec.* Corrodens; vesicans.

USUS. Dyspepsia; cephalæa; intermittentes; asthma pituitosum; cachexiæ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Pulveris gran. x-xx-xxx.

ARUNDO PHRAGMITIS.

CL. *Triand.* O. *Digyn.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS. Syphilis.

PRÆP. Decoctum ʒj-ij ad ℔jj aquæ coquendo ad colat. ℔j.

ASARUM EUROPÆUM. Fibræ radicis; folia.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis, montanis.*

OF. *Asarum.* G. *Asaret*; *cabaret.* GE. *Haselwurzel.* A. *Common asarabacca.* H. *Asaro de Europa.*

QUAL. Heroïca: in principio acri, volatili residens; odor fragrans; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Emetica; cathartica; errhina; diuretica; sudorifica; menagoga.

USUS *decocti.* Hydrops; intermittentes. *Extern.* pulv. naribus attracti: cephalæa.

DOS. Pulveris: gran. x-xx-xxx; scopo errhino gran. iij-iv. cum saccharo; pro decocto drach. ij

ad ℔j aquæ, cujus unc. j. omni bihorio vel trihorio sumenda.

PRÆP. Extractum : dosis. gr. xx.

ASCLEPIAS ASTHMATICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Frutices. Zeylan.*

QUAL. Sapor dulci-acris, subnauseosus; odor vincetoxici.

VIRT. Subemetica; cathartica; expectorans.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PRÆP. Decoctum; syrupus.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis nemorosis.*

OF. *Vincetoxicum* S. *hirundinaria.* G. *Asclepiade; dompte-venin.* GE. *Schwalbenwurzel.* A. *White & yellow officinal swallow-wort.*

QUAL. Lactescens; subvenenata; odor penetrans; sapor amaricans, acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops?

ASPARAGUS OFFICINALIS. Radix.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

G. *Asperge.* GE. *Spargel.* A. *Common asparagus.*

QUAL. Inodora; subdulcis; urinam odore fœtido imbuens, qui acido instillato corrigitur.

VIRT. *Recentis:* diuretica.

USUS.

ASPERULA ODORATA. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis, in sylvis umbrosis.*

OF. *Aspergula matrisylva* s. *hepatica stellata.* G. *Aspergule.* GE. *Waldmeister; Sternleberkraut; Meserich.* A. *Sweet scented woodroof.*

QUAL. *Siccatæ :* odor fragrans quem infuso communicat.

VIRT. Diuretica?

USUS. Infusi aquosi vel vinosi.

ASPHODELUS RAMOSUS. Radix.

CL. *Tetraud.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Asphodelus.* G. *Goldwurzel.* A. *Branchy asphodel, or king's spear.*

QUAL. *Recentis :* acris. *Siccatæ :* mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ASPLENIUM CETERACH.

CL. *Cryptog.* O. *Filic.* *Perennis; Europæ.*

OF. *Ceterach herba.* G. *Ceterac.* A. *Common spleenwort.*

QUAL. Sapor subausterus, mucilaginosus.

VIRT. ?

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Scolopendrium* s. *lingua cervina.* G. *Scolopendre.* A. *Hart's tongue spleenwort.*

QUAL. Substystica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM RUTA MURARIA. Herba.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Ruta muraria.* G. *Rue de muraille ou sauve-vie.*
A. *White maidenhair; walrue, or spleenwort.*

ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Herba.
CL. *et* O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Trichomanes s. dianthus ruber.* G. *Polytric.*
A. *Common maidenhair or spleenwort.*
VIRT. Subadstringens.

ASTRAGALUS EXSCAPUS. Radix.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; Hungariæ.*
A. *Hairy podded milk-vetch.*
VIRT. Antisyphilitica?
USUS *decocti:* Syphilis.
DOS. *Radicis siccatæ concisæ:* unc. j—ij ad libr. iij aquæ coquendo ad colat. libr. ij quotidie sumend.

ASTRAGALUS GUMMIFER.
——— TRAGACANTHA etc. } Gummi.
Frutic. Mons Liban.

N. B. Species prima maximam partem *Gummi* vulgo *Tragacantha* dicti commercio suppeditat. (LABILLARDIERE.)

OF. *Gummi tragacanthæ.* G. *Gomme adragante.*
GE. *Tragacanth gumi.* A. *Goatsthorn milk-vetch; gum tragant.*
QUAL. Mucilaginosa.
VIRT. Involvens; obtundens.
USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

ATHAMANTA CRETENSIS. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn. Perennis; candiæ, alpina.*
OF. *Semen dauci cretici.* GE. *Mohrenkümmel.* A. *Annuel spignel.*
QUAL. Acris; aromatica.
VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.
USUS. Flatulentia; tussis stomachica.

ATHAMANTA OREOSELINUM. Herba; semen; radix.

CL. *et* O. *præced. Perennis; in locis montanis siccis.*
OF. *Oreoselinum* G. *Persil des montagnes.* GE. *Bergpetersilie; grundheil.* A. *Divaricated spignel.*
QUAL. Aromatica.

ATROPA BELLADONA. Folia; radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog. Perennis; passim hortensis.*
OF. *Belladona s. solanum lethale s. Sol. furiosum.* G. *Belladone.* GE. *Tollkraut.* A. *Deadly nightshade; dwale.*
QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico residens; odor virosus; sapor acris, substypticus.
N. B. Antidotum ejus est, præmisso emetico forti, acetum, cujus coehleare majus dandum omni quinto minuto, et enema ex aceto cum aqua omni horæ quadrante, adplicando simul opium ventri.
VIRT. Narcotica; antispasmodica; resolvens.
USUS *cautus:* Mania; melancholia; epilepsia; pertussis; hydrophobia; Icterus inveteratus; hy-

drops. *Externus*. Scirrhus; cancer; fistula; arthrodynia rheumatica; ulcus malignum.

DOS. *Pulveris folior. aut rad. siccat.* gran. j. gradatim ascendendo ad gran. vj. de die in adultis; infantibus gran. $\frac{1}{8}$ gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. ij-iij.

N. B. MŒNCH ad preveniendam aut ad curandam hydrophobiam dat *radicem* omni secundo die in aqua calida, vel cerevisia adultis gran. x-xv; infantibus sex annorum gran. v: quatuor annorum gran. iij. — *Folia siccata*: adultis gran. xii-xvj. et post 48 horas gran. x-xiij. — Eadem pro infuso aquoso, scrup. j. ad unc. x. aquæ fervidæ, hujusque unc. ij adultis dantur primis diebus, dein quotidiè augendo dosin, donec siccitas et tensio faucium aut vertigo appareant. *Externus*: forma pulveris, vel cataplasmatis.

FRÆP. Succus foliorum inspissatus, vulgo *extractum*.

ATROPA MANDRAGORA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ.-austr.*

OF. *Radix mandragoræ*, G. *Mandtagore*. GE. *Alraunwurzel*. A. *Mandrake*.

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens. *Cortex radicis*: acris.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; *corticis radic.* cathartica; menagoga.

USUS. *Pulv. radicis externus forma cataplasmatis:*

Scirrhus; scrophula; tumor testiculi. *Internus :* epilepsia ?

AVENA SATIVA. Semen excorticatum; farina.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Avena.* G. *Gruau d'avoine.* GE. *Habergrüze.* A. *Cultivated white oat : oatmeal.*

QUAL. Insipida; farinacea.

VIRT. Demulcens; emolliens; nutriens.

USUS. Forma decocti, cataplasmatis.

AVICENNIA TOMENTOSA. Nucleus; succus putaminis.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea; utriusque Indiæ.*

OF. *Anacardium orientale.*

QUAL. *Nuclei :* dulcis; oleosa. *Putaminis :* acerrima.

VIRT. *Nuclei :* nutriens. *Putaminis :* corrodens; caustica.

USUS *succi :* cum calce mixtus caracteres pannis gossypinis et linteis indelebiles imprimit. *Putaminis :* Morosis; oblivio?

B

BALSAMEA MECCANENSIS (GLEDITSCH). Balsamum.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arbor; Arabiæ yemen, Mecca.*

CARACT. *Cal* 5-partitus. *cor.* 5-petal. æqualis, rubra. *stamin.* 10. longa calici inserta. *pistil.* 1. superum. *styl.* 1. *stigm.* obtus. *fol.* bipinnata : foliolis lanceolatis.

Amyris gileadensis seu opobalsamum LINN.
NOMEN NATALE. Balessan.
OF. *Balsamum de mecca; opobalsamum veram; balsamum gileadense.* G. *Beaume de mecca.* GE. *Meckabalsam.* A. *Balsam of judda; balsam of gilead.*
OPOBALSAMUM viridescens, incisione ramulorum;
CARPOBALSAMUM expressione fructus maturi;
XYLOBALSAMUM rubescens, expressione et decoctione ramulorum obtinetur. (BRUCE.)
QUAL. Præstans: tenaci-liquida; odor fragrans, gratus; sapor acris, amaricans.
VIRT. Stimulans; diuretica; cosmetica.
USUS. Blennorrhœa; tabes; morbi pituitosi; maculæ cutis.
DOS. gutt. xv-xxx-L. cum saccharo, vitello ovi, aut haustu aquæ.

BANKSIA ABYSSINICA (BRUCE.) Flores.
CL. *Tetrand. O. Monog.* *Arborea*; *Abyssin.*
NOMEN NATALE: Cusso.
QUAL.
VIRT. Anthelminthica.
USUS *infusi*: ascarides.
DOS. Manip. j. florum ad ℔ iv. cerevisiæ per 12 horas digerendo.

BELLIS PERENNIS. Flores; herba.
CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *In pratis.*
OF. *Bellis minor.* G. *Maslieben.* GE. *Gaenseblumen.* A. *Common daisy.*
QUAL.

VIRT.?

USUS. Tabes.

BERBERIS VULGARIS. Baccarum recentium succus; cortex.

CL. *Hexand.* O. *Mong.* *Fruticosa.*

OF. *Berberis.* G. *Epine-vinette; vinetier.* GE. *Sauerdorn-beeren.* A. *Common berberry.* H. *Agracejo.*

QUAL. *Baccarum:* sapor intense acidus. *Corticis:* flava; sapor amarus.

VIRT. Refrigerans; antiseptica. *Cort.* tinctoria.

USUS. Febres acutæ; cholera. *Cort.* icterus; leucorrhœa.

PRÆP. Succus; syrupus; conditum baccarum.

BETA CICLA. Succus radicis.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Hortensis.*

OF. *Beta alba.*

QUAL. Sapor aquosus, dulcis.

VIRT. Errhina.

USUS.

BETA VULGARIS. Radicis succus.

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Beta rubra.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

BETONICA OFFICINALIS. Herba et flores; radix.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis.*

OF. *Betonica.* G. *Betoine.* GE. *Betonien.* A. *Woodbetony.*

QUAL. Odor nidorosus, halituosus. *Radic.* nauseosa.
VIRT. Nervina? Errhina? *Radic.* emetica.
USUS.

BETULA ALBA. Folia tenerrima; epidermis; lympha.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* *Arborea; Europæ.*
OF. *Betula.* G. *Le bouleau ordinaire.* GE. *Birkenbaum.* A. *Common birch-tree.* H. *Abidulblanco.*
QUAL. *Olei:* suaveolens.
VIRT.?
USUS *foliorum:* Erysipelas. *Succi saccharini* (vulgo lympha dicti) terebro ex arbore primo vere obtenti: Morbi cutis; scorbutus; lumbrici.
PRÆP. Oleum epidermidis nigrum.

BIGNONIA OPHTHALMICA. Radix; succus expressus.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Frutic. Amer. meridion.*
QUAL.
VIRT.
USUS *succi expressi vel decocti:* ophthalmia membranarum.
DOSIS guttula una succi vel guttula una alterare decocti oculo instillatur omni mane.
(CHISHOLM).

BIXA ORELLANA. Radix et fœcula ex capsulis seminum arte obtenta.

CL. *Polyg.* O. *Monog.* *Arborea; Indiæ occident.*

OF. *Terra orellana* s. *orleana.* G. *Rocou.* A. *Heart-leaved bixa; or anotta.*

QUAL. *Fæculæ :* rubra; odor mucidus; sapor subamaro stypticus.

VIRT. *Radicis :* diuretica.

USUS *radicis et fæculæ :* tinctorius. Pigmentum corpori illitum contra morsus culicum munit.

BOLETUS IGNIARIUS. Quercui, tiliæ aut fago putrescentibus insidens.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi.*

OF. *Agaricus quernus* s. *agaricus chirurgorum*, s. *fungus quercinus.* G. *Agaric de chéne.*

QUAL.

VIRT. Mechanice sanguinem sistens.

USUS *externus*, ablato ab utraque parte tegmine contusus : Hæmorrhagiæ.

BOLETUS LARICINUS. Larici insidens.

OF. *Agaricus albus optimus.* G. *Agaric.* GE. *Lerchenschwam.*

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor nauseosus, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica.

USUS *intern.* hirudo deglutita; sudor phthysicorum. *Extern.* hæmorrhagiæ. *Pulv. inspersi :* ulcera.

DOS. Gran. ij.

BOLETUS SUAVEOLENS. Salici insidens.

OF. *Fungus salicis, seu fungus albus saligneus.*

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Mucilagine humectatus, leniter siccatus et cum alcoholis pauxillo in pulverem tritus: Tabes pulmonalis; asthma spasmodicum.

DOS. Pulveris drach ß-ij. bis de die cum saccharo.

BORAGO OFFICINALIS. Herba et flores.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua.*

G. *Bourrache.* A. *Common borage.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. ?

USUS.

BRASSICA ERUCA. Semen; folia.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* *Annua; montana.*

OF. *Erucæ semen.* G. *Roquette des jardins* ou *annuelle.*

QUAL. In acri volatili residens; sapor acris, fervidus, penetrans, ferè ut sinapis.

VIRT. *Veteribus* aphrodisiaca?

USUS. Paralysis linguæ.

BRASSICA OLERACEA. Folia.

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Brassica capitata alba et rubra; aliæque varietates.* G. *Choux.* A. *Cabbage.*

QUAL. Aquosa; inodora.

VIRT. ?

USUS. Cocta, vel muriate sodæ condita, germanis sub nomine *Sauerkraut*: scorbutus. *Forma cataplasmatis* mammis puerperarum applicata ad coagulum lactis impediendum. *Decocti*: Raucedo; tussis; scorbutus; combustura.

BRASSICA RAPA. Radix recens.

CL. & O. *præced.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Rapa.* G. *Weisse rüben.* A. *White turneps.*

QUAL. *Succi:* in principio saccharino et mucilaginoso residens.

VIRT. Flatulenta; diuretica.

USUS *succi expressi:* Tabes; asthma; stranguria. *Radicis recentis forma cataplasmatis:* Pernio, podagra? *Succi:* Otalgia; aphtha.

PRÆP. Syrupus frigide e succo paratus.

BROMELIA ANANAS. Bacca *(vulgo fructus)*; cortex exterior recens.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis*; *Americ. merid.*

OF. *Ananas fructus.* A. *Queen pine-apple.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor gratissime acidodulcis, subacris.

VIRT. Analeptica. *Cortic:* menagoga.

USUS.

PRÆP. Liquor *Italis* NAJANA dictus.

BRUCEA FERRUGINEA. Cortex. (HERITIER).

Brucea antidysenterica. *Abyssin.* (MILLER).

N. B. An cortex argusturæ officinarum?

NOMEN NATALE: *Wooginoos.*

QUAL.

VIRT. Antidysenterica. (BRUCE.)

USUS. Dysenteria.

DOS. Pulveris ʒß mane et vesper. in haustu lactis recenter mulsi, abstinendo ab omni potu post usum ejus. (BRUCE.)

BRYONIA ALBA. } Radix recens; succus radicis inspissatus.
——— DIOICA. }

CL. *Monœc.* O. *Syngen.* *Perennis; in sepibus.*

OF. *Bryonia.* G. *Brione; couleuvrée.* GE. *Gichtrüben; zaunrüben.* A. *white briony.* H. *Nueza blanca.*

QUAL. Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor acris, intense amarus; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelmintica; menagoga. *Externus:* Rubefaciens; resolvens.

USUS forma pulveris vel infusi: Hydrops, asthma; mania; epilepsia; arthrodynia rheumatica. *Externus radicis contusæ* forma cataplasmatis: Œdema; lupia; ecchymoma.

DOS. *Pulv. radicis siccatæ:* drach. ʒjß. *Succi inspissati:* drach. ij-ʒß.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus; succus inspissatus, vulgo *extractum.*

BUBON GALBANUM. Succus gummi-resinosus incisione obtentus, inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Afric.*

OF. *Gumi galbanum.* GE. *Galbanum. Mutterharz.* A. *Long-leaved bubon.*

QUAL. In oleo volatili residens: sapor amaro-acris; odor alliaceus, penetrans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; menagoga; expectorans; resolvens.

USUS. Hysteria; asthma; amenorrhœa; asthenia. *Externus* scopo resolvendi aut maturandi: Tumores.

DOS. Gran. xx - ʒj forma emulsionis vel pilularum.

PRÆP. Emplastrum.

BUBON MACEDONICUM. Semen; herba.

CL. & O. *Præced.* *Biennis.*

OF. *Petroselinum Macedonicum.* G. *Persil de Macédoine.* H. *Macedonian bubon or parsley.*

QUAL. Sapor aromaticus, dulcescens.

VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.

USUS. Syphilis?

BUPLEURUM ROTUNDIFOLUM. Herba; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Perfoliata.* A. *Round leaved hare ear; or thorow-wax.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT.?

USUS.

BURSERA GUMMIFERA.

CL. *Hexand.* O. *Monog.*

A. *Jamaica birch-tree.*

N. B. Quidam et hac planta quassiam simarubam derivant.

BUXUS SEMPERVIRENS. Lignum; folia.
CL. *Monœc. O. Tetrand.*
OF. *Comon Tree Box.*
QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor amarus.
VIRT. Sudorifica; alterans; *folior.* cathartica.
USUS *decocti:* Epilepsia, syphilis? *Olei:* Hirsuties?

C.

CACHRIS ODONTALGICA. Radix.
CL. *Pentand. O. Digyn.*
G. *Amarinte.*
QUAL. Sapor acris, urens.
VIRT. Sialagoga.
USUS loco anthemis pyrethri: Odontalgia rheumatica.

CACTUS OPUNTIA. Folia.
CL. *Icosand. O. Monog. Fruticosa; Europ. austr.*
OF. *Opuntiæ folia.* A. *Common Indian fig.*
QUAL. Mucilaginosa.
USUS *externus* foliorum calore mollitorum et medio dissectorum forma cataplasmatis: Dolores; dysenteria; arthrodynia.

CALAMUS ROTANG. Resina fructum tegens.
CL. *Hexand. O. monog.* *Fruticosa; Indica.*
OF. *Sanguis draconis.* G. *Sang dragon.*
N. B. Vide etiam dracæna draco, et pterocarpus draco, ex quibus promiscue desumitur resina draconis.

CALENDULA OFFICINALIS. Folia et flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. necess.* *Annua; Europ. auster.*
VAR. A. *Flore simplici.* B. *Flore pleno.*
OF. *Calendula.* G. *Souci* GE. *Ringelblumen.* A. *Common & double flowered marigold.*
QUAL. Flava; sapor amaricans.
VIRT.?
USUS.

CAMBOGIA GUTTA. Succus gummi-resinosus incisione ramulorum obtentus, inpissatus.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea; Indica.*
OF. *Gambogia; gummi gutta; gutta gamba.* G. *Camboge; gomme-gutte.* G. *Gummigutt.* A. *Gamboge.*
QUAL. Heroica: lutea; opaca; in principio resino-gummoso residens; insipida; inodora.
VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; subemetica.
USUS. Hydrops; obstipatio; tœnia; icterus; quartana; cachexiæ; morbi cutis.
DOS. Gran. iij-IV. pulveris cum saccharo triti omni trihorio in hydrope. In tœnia gr. X-XX. in obstipatione gr. j-ij.
PRÆP. Tinctura dos. ʒj-ij.
N. B. Antidotum ejus est alcali.

CAMPHOROSMA MONSPELIENSIS. Herba.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Annua; Europ. austr.*
OF. *Camphorata.* G. *Camphrée.* A. *Hairy camphorosme.*

QUAL. Subaromatica.
VIRT. Nervina; sudorifica; resolvens.
USUS. Hysteria; leucorrhœa; asthma; arthrodynia rheumatica; coryza.

CANELLA ALBA. Cortex interior arboris.

CL. *Dodec.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.* *Wintera canella* (PALLAS).
OF. *Canella alba.* A. *Laurel-leaved canella.* G. *Weisser zimmt.*
QUAL. Aromatica; sapor leviter acris, amaricans.
VIRT. Stimulans; carminativa.
USUS. Dyspepsia.
DOS. Drach. ß. j-ij in infuso: gran. XXX. in pulvere.

CANNABIS SATIVA. Semen.

CL. *Diœc.* O. *Pentand.* *Annua.*
OF. *Semina cannabis.* G. *Semences du chanvre* G. *Hanfsaamen.* A. *Hemp-seed; common hemp.*
QUAL. Præstans: in principio oleoso et mucilaginoso residens; odor virosus.
VIRT. Involvens; sedativa.
USUS *infusi aut emulsionis:* Blennorrhagia; stranguria; tussis catarrhalis.
DOSIS: unc ß-j. ad aquæ ℔ IV in infuso.
PRÆP. Oleum fixum.

CAPPARIS SPINOSA. Cortex radicis.

CL. *Polyand* O. *monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*
OF. *Capparis.* G. *Capres.* A. *Prickly caper-bush.*
QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Obstipatio; physconia abdominalis; paralysis.

PRÆP. Oleum fixum.

CAPSICUM ANNUUM. Fructus.

CL. *Pentand.* O. *monog.* *Annua.*

OF. *Piper Indicum, Hispanicum, Turcicum.* G. *Capsique; poivre d'Inde.* G. *Spanischer, oder türkischer pfeffer.* A. *Cayenne-pepper; indian pepper or capsicum.*

QUAL. Eximia: in principio resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Stimulans; stomachica; rubefaciens.

USUS. Dyspepsia; cardialgia arthritica; coryza; intermittentes.

CAPSICUM BACCATUM. Fructus.

A. *Small fruited capsicum, or Bird-pepper.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CARDAMINE PRATENSIS. Petala (*vulgo* flores) et folia.

CL. *Tetrad.* O. *Siliquos.* *Perennis.*

OF. *Flores cardamine; nasturtium pratense.* G. *Cresson élégant; cresson des prés; passerage sauvage.* GE. *wiesenkresse.* A. *Ladies smock; cuellow-flower.*

QUAL. In principio subacri residens.

VIRT. *Petalorum:* Antispasmodica. *Folior.* Antiscorbutica.

USUS *petalorum :* Convulsio ; chorea.

DOSIS : pulv. petalorum scrup. j ad drach. semis.

CARDUUS MARIANUS. Semen ; herba.

CL. *Syng.* O. *polyg. æqual.* *Annua.*

OF. *Carduus mariæ.* G. *Chardon-Marie.* A. *Milk or ladies-thistle.*

QUAL. *Semin :* oleosa : *herbæ :* amara.

USUS. Carcinoma ?

CAREX ARENARIA. Radix.

CL. *Monæc.* O. *Triand.* *Perennis ; in arenosis.*

OF. *Gramen rubrum.* G. *Laiche des sables.* GE. *Sandriedgras ; rothe graswurzel.* A. *Sea-carex.*

QUAL. *Radicis recentis :* odor resinoso-terebinthinaceus ; subdulcis.

VIRT. Sudorifica ; diuretica.

USUS loco sarsaparillæ : Morbi cutis ; syphilis.

CARICA PAPAYA. Semen ; radix ; succus lacteus incisione fructus immaturi viridis obtentus.

CL. *Diœc.* O. *Decand.* *Indiæ orient. ; Africæ.*

VIRT. Anthelminthica.

DOSIS *succi :* adultis cochleare majus ; infantibus cochleare parvulum cum haustu aquæ.

PRÆP. Succus inspissatus ; pulvis seminis ; decoctum seminis, vel radicis, aut fructus immaturi.

CARLINA ACAULIS. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis ; alpina.*

OF. *Carolina cardopatia.* GE. *Eberwurzel.* A. *Dwarf Carlina.*

QUAL. Præstans: odor graveolens, penetrans; sapor acris, amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica.

USUS. Physconia abdominalis; morbi cutis; hysteria?

CARTHAMUS TINCTORIUS. Semen; flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis; alpina.*

OF. *Safranum.* G. *Carthame.* A. *Bastard saffran.*

QUAL. Lutea; tinctoria; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica. *Florum:* cosmetica.

USUS. Tussis senilis; asthma pituitosum; icterus.

N. B. Ex his floribus et non ex carmino, ut vulgo creditur, fucus ruber, vulgo *Rouge végétal*, processu chemico ingenioso paratur Parisiis.

CARUM CARVI. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis.*

OF. *Semen carvi.* G. *Carvi.* GE. *Gemeiner oder Wiesenkümel; feldkümel.* A. *Common carraway-seed.* H. *Alcarovea.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; sapor aromaticus, acri, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Colica; intermittentes.

DOSIS: Pulv. scrup. j—drach. j; in decocto unc. j ad aquæ libr. j.

PRÆP. Tinctura; oleum volatile.

CARYOPHILLUS AROMATICUS. Flores cum pericarpio immaturo. (*Vulg.* Caryophilli.)

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea; Indica.*

OF. *Caryophilli aromatici.* G. *Giroffles.* GE. *Gewürznelken.* A. *Cloves.*

QUAL. In oleo volatili et principio acri-resinoso residens; odor gratus, fragrans, penetrans; sapor aromaticus, acris, urens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; sialagoga; stomachica; menagoga.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; odontalgia.

DOSIS. Scrup. sem. ad drach. j in pulvere, aut infuso aquoso vel vinoso.

PRÆP. Oleum volatile.

CASSIA ALATA. Folia.

CL. *Decand.* O. *Monog. Fruticosa; Ind. or. et occid.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Herpes.

CASSIA FISTULA. Fructus; pulpa fructus.

CL. *et* O. *præced. Arborea; Ægypt.; Ind. orient.*

OF. *Cassia fistula s. Fistularis; pulpa cassiæ.* G. *Casse.* GE. *Rohrkassie.* A. *Purging cassia.*

QUAL. Sapor acidulo-dulcis, mucilaginosus, subnauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Obstipatio.

DOSIS. Unc. semis—ij.

CASSIA SENNA. Folia.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa; Afric.*

OF. *Folia sennæ.* G. *Séné.* GE. *Sennes-blaetter.* A. *Senna or Ægyptian cassia.*

QUAL. Odor nauseosus; sapor subacris, amaricans.
VIRT. Cathartica.
USUS. Obstipatio. *Extern.* Herpes.
PRÆP. Tinctura; infusum.
DOSIS. *Pulveris:* Scrup. j ad drach. sem. *Infusi:* drach. iij—iv ad unc. vj aquæ addito semine aromatico coriandri sativi, cardamomi vel carvi, etc. *Tincturæ:* drach. ij—iv.

CEANOTHUS AMERICANUS. Stipites.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Frutex; Virgin. et Carolin.*
A. *American Ceanothus or new Jersey-tea.*
QUAL. Rubra.
VIRT. Alterans.
USUS *pulveris externus:* Ulcera syphilitica.

CENTAUREA BEHEN. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. frust.* *Perennis; Libanon.*
OF. *Radix Behen albi.*
QUAL. Odorata; sapor acris.

CENTAUREA BENEDICTA. Folia; herba; semen.

CL. *et* O. *præced.* *Annua, hortensis.*
OF. *Carduus benedictus.* G. *Chardon-bénit* GE. *Kardebenediktenkraut.* A. *Blessed thistle or centaury.* H. *Cardo santo.*
QUAL. *Herbæ* præstans: sapor pure et intense amarus. *Seminum:* dulcis; mucilaginosa.
VIRT. Stomachica; antacida; subemetica.

USUS *extracti, infusi vel decocti :* Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; icterus; physconia abdominal. *extern.* ecchymoma.
DOSIS *extracti :* Drach. j.

CENTAUREA CALCITRAPPA. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Annua.*
OF. *Carduum; carduus stellatus; centaurea stellata.* G. *Centaurée étoilée; chardon étoilé; chausse-trappe; pignerole.* GE. *Rittersporn-wurzel.* A. *Common star centaury or thistle.*
QUAL. Sapor amarus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Intermittentes; dyspepsia.

CENTAUREA CYANUS. Flores.

CL. *et* O. *præced.* *Annua.*
OF. *Flores cyani.* GE. *Blaue kornblumen.* A. *Blue bottle.*
QUAL. Cærulea.
USUS. Chemicus pro reagente.

CERATONIA SILIQUA. Fructus.

CL. *Polyg.* O. *Diœc.* *Arborea; Syriæ; Siciliæ.*
OF. *Siliqua dulcis; caroba.* G. *Carouge.* GE. *Johannis brod; Bockshorn.* A. *Carobtree, or St-John's bread.*
QUAL. Dulcis; mucilaginosa.
VIRT. Demulcens; expectorans.
USUS *decocti :* Raucedo; tussis ab acri; catharrhus.

*

CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

OF. *Herba cicutariæ.* G. *Persil d'âne.* A. *Wild chervil, or cow-weed.*

QUAL. Odor subfœtidus; sapor amaricans.

USUS. Physconia abdominal.

CHEIRANTHUS CHEIRI. Flores.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Europ. austr.; hortensis.*

OF. *Viola lutea, leucoium luteum; flores cheïri.* G. *Violier jaune.* GE. *Gelbe veilchen.* A. *Wild wall-flower.*

QUAL. Lutea; odor fragrans; in principio volatili residens.

VIRT. Nervina; narcotica.

USUS. Amenorrhœa; icterus; physconia abdominalis.

CHELYDONIUM MAJUS. Radix; herba recens.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Chelidonium.* G. *Chélidoine éclair.* GE. *Schellwurzel; schwalbenkraut* A. *Common celadine.*

QUAL. Præstans: in principio acri volatili residens; odor nauseosus; sapor amarus, acris; succus luteus.

VIRT. *Radicis recentis:* Diuretica; resolvens.

USUS *interni decocti:* Cachexiæ; tabes; icterus; hydrops; morbi cutanei.

DOS. *Succi externus* : Verruca ; herpes ; ulcus phagedænicum ; pterygium.

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES. Herba ; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Mexicana.*

OF. *Botrys Mexicana seu chenopodium Mexicanum.*

A. *Mexican goose-foot.* H. *Té de Espanna.*

QUAL. Eximia : odor fragrans ; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Nervina ; stimulans. *Seminum* : anthelminthica ; carminativa.

USUS : Paralysis ; asthenia nervosa ; dyspepsia ; flatulentia ; vermes.

PRÆP. Tinctura ; infusum.

CHENOPODIUM ANTHELMINTHICUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis* ; *Pennsylv.*

A. *Shrubby goose-foot.*

QUAL. Præstans : odor graveolenti-fragrans ; sapor aromaticus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS : Lumbrici.

CHENOPODIUM BONUS HENRICUS. Herba.

OF. *Herba boni Henrici.* A. *Angular leaved goose-foot, or English mercury.*

QUAL. Oleracea ; fatua.

VIRT. Refrigerans; eccoperotica.
USUS *externus*: Paronychia; ulcera; varix ani?

CHENOPODIUM BOTRYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua*; *Europ. aust.*
OF. *Herba botryos.* G. *Botrys.* G. *Traubenkraut.* A. *Jerusalem-oak*; *or cut-leaved goose-foot.* H. *Bien granada.*
QUAL. et VIRT. Chenopodii ambrosioid. sed debilior.

CHENOPODIUM RUBRUM. Herba.

OF. *Atriplex sylvestris.* A. *Red goose-foot.*
QUAL. Aquosa.
VIRT.

CHENOPODIUM VULVARIA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua.*
OF. *Vulvaria*; *atriplex fœtida* s. *Olida.* G. *Vulvaire*; *arroche puant*; *anserine fétide.* GE. *Stinkende melten*; *hundsmelte.* A. *Stinking goose-foot, or orache.*
QUAL. Præstans: odor fœtidus, hircinus.
VIRT. Antispasmodica.
USUS. Hysteria.

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. Herba et flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in pratis.*
OF. *Bellis hortensis.* s. *pratensis.* A. *Ox-eye daisy or chrysanthemum.*

QUAL. Subacris; penetrans; piperata in decocto.
VIRT. Diuretica.
USUS : Asthma; tinea?

CICHORIUM INTYBUS. Radix; herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis.*
OF. *Cichoreum.* G. *Chicorée sauvage.* G. *Wegwart; hund-laeuft; zichorienwurzel.* A. *Wild endivy or sucory.* H. *Achicorea sylvestre.*
QUAL. *Recentis* : In succo lacteo intense amaro residens.
VIRT. Deobstruens; stomachica; diuretica.
USUS *decocti* : Icterus; dyspepsia; physconia abdomin.

CICHORIUM ENDIVIA. Herba; semen.
G. Endive. A. Common endive.
QUAL. Oleracea.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.

CICUTA VIROSA. Herba; radix.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *In aquis stagnantibus, putridis.*
OF. *Cicuta aquatica.* G. *Wasserschierling.* G. *Ciguë aquatique.* A. *Water hemlock.*
QUAL. Venenata; odor teter; sapor acris.
VIRT. Narcotica; resolvens.

CIMICIFUGA FŒTIDA. Herba.
CL. *Polyand.* O. *Tetragyn.* *Sibirica.*
QUAL. Præstans : odor teter; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica ; resolvens.

USUS : Ataxia ; spasmi ; bronchocele ?

CINCHONA ANGUSTIFOLIA. (SWARZ). Cortex.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Arbuscula* ; *insulæ Doming.*

QUAL. Sapor intense amarus, subdulcis, subaromaticus.

VIRT. Roborans ; stomachica.

USUS : Febres intermittentes et remittentes ; dyspepsia ; asthenia.

CINCHONA CARYBÆA. Cortex.

CL. & O. *præcd.* *Arborea* ; *Ind. occident.*

OF. *China carybæa* ; *cortex St. Luciæ* ; *cinchona Jamaicensis.*

QUAL. Sapor substypticus ; magis amarus, sed minùs aromaticus quam cinchonæ officinalis.

VIRT. Roborans ; adstringens ; stomachica.

USUS : Febres remittentes ; intermittentes ; typhus.

CINCHONA CORYMBIFERA. (FORSTER) Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea* ; *Ind. occident.*

Nota. Idem ac *Cortex de St. Fé* esse videtur.

QUAL. Sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Stomachica ; subastringens.

USUS idem ac præced.

CINCHONA FLORIBUNDA. (SWARZ). Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea* ; *Ind. occident.*

OF. *Chinchina Sanctæ Luciæ.*
QUAL. Sapor amarus, stypticus.
VIRT. et USUS præced.

CINCHONA BRACHICARPA.

VIRT. Eadem ac Cinchonæ officinalis?

CINCHONA MONTANA. (BÂDIER.) Cortex.

CL. *et* O. *præced. Arbor insulæ Martin. et Guadel.*
OF. *China-piton.*
QUAL. Sapor intense amarus, stypticus.
VIRT. Emetica; cathartica.

CINCHONA OFFICINALIS. Cortex.

CL. *et* O. *præced. Arborea; Peruviana, montana.*
OF. *Cortex peruvianus; chinchina; cortex chinæ.*
G. *Quinquina.* GE. *Fieberrinde; kinarinde.*
A. *Peruvian bark.* H. *Quina; cascarilla de loxa.*
QUAL. Heroica: in principio adstringente resinoso et amaro mixto residens; sapor tenacissime amarus, substypticus.
VIRT. Antiseptica; roborans; adstringens; stomachica.
USUS. Febres atonicæ, putridæ, intermittentes, remittentes; asthenia; ataxia; spasmi; pertussis; tabes pituitosa; diarrhœa; scrophula; gangræna; sphacelus; ulcera phagedænica; arthrodynia a debilitate *Internus et externus:* forma pulveris; extracti; electuarii; infusi in aqua calcis, alcohole, vino, aqua; decocti; tincturæ; fotus; cataplasmatis; enematis: *Pulv. externus* frictione cum

saliva ventri adplicatus in junioribus, omni bihorio vel trihorio tempore remissionis vel intermissionis.

DOSIS *pulveris*: gran. xv—xxx ad drach. j. *Extracti*: drach. semis ad scrup. ij. In infuso vel decocto unc. j ad libr. j aquæ.

CINCHONA TECAMEZ. Cortex.

Arborea; Amer. merid.

OF. *Cortex Tecamez.*

QUAL. *Cort. pulv.* Lutescens; odor aromaticus; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *decocti vel infusi*: Asthenia ex gonorrhœa vera.

CINERARIA SIBIRICA. Radix recens.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.*

USUS. Anaphrodisia ex ebrietate (PALLAS).

CISSAMPELOS CAAPEBA. Radix.

QUAL. Mucilaginosa.

USUS. Dysuria; stranguria; morsura serpentum.

CISSAMPELOS PAREIRA. Radix.

CL. *Diœc.* O. *Monadelph. Perennis; Amer. merid.*

N. B. AUBLET refert radicem *Abutæ rufescentis* hanc radicem virtute æmulare.

OF. *Pareira brava; Butua.* A. *Cissampelos.*

QUAL. Sapor amaro-dulcis.

VIRT. Eximia: diuretica; alterans.

USUS *infusi*: Morbi pituitosi; dysuria; calculus urinarius; icterus; arthritis.

DOSIS. Unc. j ad libr. ij aquæ ad colat. libr. j hujusque unc. iij ter die.

CISTUS CRETICUS. Succus resinosus ex foliis exsudans.

Cistus Ladaniferus (HORT. KEW.).

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Ladanum; gummi-labdanum; cistus creticus.*

A. *Gum-cistus.*

QUAL. Resina amara; grisea; fumo grato.

VIRT. Stimulans; aromatica.

USUS *externus* ad emplastra; suffimigia.

CITRUS AURANTIUM. Fructus recens; cortex flavus fructus; folia; flores.

CL. *Polyadelph.* O. *Icosand.* *Arborea; Europ. austr.*

N. B. Duæ varietates.

OF. *Flavedo corticum aurantiorum; folia; flores naphæ; fructus aurantii dulcis & amari; aurantia hispaliensia, curassavica.* G. *Oranges.* G. *Pomeranzen.* A. *Seville & china orange-tree.*

QUAL. *Corticis florum et foliorum:* odor fragrans; sapor aromatico-amarus. *Succi:* Acidulo-dulcis, vel amaro-dulcis.

VIRT. Nervina; stimulans; stomachica. *Succi:* refrigerans.

USUS *corticis* forma pulveris, infusi, tincturæ: Dyspepsia; intermittentes; menorrhagia? *Foliorum:* Chorea; epilepsia; convulsio; hysteria.

DOSIS *pulveris corticis:* drach. ß. *Foliorum:* drach. ß-j ter quaterve de die.

PRÆP. Aqua destillata ; oleum volatile florum vulgo *oleum Naphæ ;* tinctura ; conditum ; syrupus corticis : oleum corticis volatile expressione paratum vulgo *oleum Bergamotte.*

CITRUS MEDICA. Fructus ejusque succus ; cortex flavus fructus.

Varietas : *citrus limonia.* *Arborea ; Europ. aust.*

OF. *Succus ; flavedo limoniorum.* s. *Citri.* G. *Citronier ; citrons.* G. *Zitronen.* A. *Lemon-tree & lime-tree.*

QUAL. *Fructus :* Sapor acidus. *Corticis :* Sapor amarus, aromaticus.

VIRT. *Succi :* Refrigerans ; antiseptica. *Corticis :* Stimulans ; stomachica.

USUS *Succi :* Scorbutus ; febres. *Corticis :* dyspepsia.

PRÆP. Succus ; oleum volatile corticis destillatione obtentum ; oleum volatile incisione et expressione corticis obtentum, vulgo oleum seu *essentia de Cedro ;* confectio seu conditum corticis et carnis fructus ; acidum citricum.

CLEMATIS RECTA. Herba cum floribus.

CL. *Polyand. O. Polyg.* *Perennis.*

OF. *Flammula Jovis.* G. *Clematite.* G. *Brennkraut ; aufrechte waldrebe.* A. *Upright virgins-bower.*

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Corrodens ; vesicans ; diuretica.

USUS *infusi vel extracti :* Exostosis syphilitica ? *Pulveris externus :* Ulcera syphilitica, cancrosa, phagedænica ? *Infusi forma lotionis :* Psora rebellis.

DOSIS *herbæ cum floribus siccatæ* : drach ij-iij ad ℔j aquæ.

PRÆP. Extractum foliorum recent. g. j.-iij.

CLEMATIS VITALBA. Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis; sarmentosa; Europ.*

OF. *Vitalbæ folia.* G. *Herbe aux gueux.* A. *Common virgins-bower, or travellers joy.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acidus, subdulcis, stypticus.

VIRT. Adstringens; corrodens; diuretica.

USUS *infusi* : Hydrops. *Externus* succi oleo excepti: Psora.

COCHLEARIA ARMORACIA. Radix recens; ejusque succus expressus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* *Perennis; hortensis, ad rivos & in locis humidis.*

OF. *Raphanus rusticanus; armoracia.* G. *Cran; raifort.* G. *Meerrettich.* A. *horse-raddish.*

QUAL. Eximia: in principio acri volatili residens.

VIRT. Emetica; diuretica; antiscorbutica; rubefaciens.

USUS. Cachexiæ; quartanæ; scorbutus; hydrops; asthma pituitosum; paralysis; arthodynia rheumatica; paraphonia.

DOSIS *radicis recentis rasæ* : ℈j-ij. *Succi expressi* : ʒß. in haustu vini.

PRÆP. Succus; aqua destillata; alcohol; infusum aquosum et vinosum.

COCHLEARIA OFFICINALIS. Herba recens; ejusque succus expressus.

CL. & O. *Præced.* *Annua; ad littora maris; hortensis.*

OF. *Cochlearia hortensis.* G. *Cranson; herbe aux cuillers.* G. *Lœffel-kraut.* A. *Common Scurvygrass.*

QUAL. *Herbæ recentis* : Eximia; in principio acri volatili residens; sapor acris.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica; alterans.

USUS *herbæ & succi* : Scorbutus; cachexiæ.

PRÆP. Conserva; succus; aqua destillata; alcohol; syrupus.

DOSIS *succi* : unc j-ij-iij. Conservæ drach. j-ij.

COCOS BUTYRACEA. } Oleum fixum fructus.
——— NUCIFERA. }

OF. *Oleum palmæ.* *Palmæ.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac aliorum oleorum fixorum.

USUS. Fissura; perniones; tumores; nodi podagrici; ventris tumor durus : Pro injectionibus anatomicis per se vel cum tertia aut quarta parte ceræ mixtum.

COFFEA ARABICA. } Semina.
——— OCCIDENTALIS. }

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Arab. & Ind. occident.*

OF. *Coffea semina.* G. *Caffier.* G. *Caffé.* A. *Coffee-tree.*

QUAL. *Semen. ustulatorum:* Fragrans; aromatica.
VIRT. Excitans; nervina; calefaciens; carminativa.
USUS *decocti seminum crudorum:* Catharrhus; rheumata; amenorrhœa suppressionis; diarrhœa. *Infusi seminum ustulatorum:* Sopor; cardialgia; cephalalgia; obstipatio; Polysarcia. *Infusi saturati* Unc. j. ad aquæ unc. iij-iv haustus omni semi hora repetendus: asthma spasmodicum (PRINGLE). *Pulveris* drach. vj cum unc. iij aut iv aquæ coctæ ad dimidium; hocque cum anatica portione succi citri mixtum calide in intermittentibus die apyrexiæ jejuno stomacho ebibendum in lecto.
PRÆP. Semen ustulatum pro infuso.

COLCHICUM AUTUMNALE. Radix.

CL. *Hexandr. O. Trigyn.* *Perennis; in pratis humidis.*
OF. *Colchicum.* G. *Colchique; mort aux chiens.* GE. *Zeitlozen; wiesen safran.* A. *Common meadow-saffran.*
QUAL. In principio acri residens; odor graveolens; sapor intense acris, nauseosus.
VIRT. Narcotica; drastico-cathartica; phthyriaca; diuretica.
USUS. Hydrops.
PRÆP. Acetum; oxymel.

COLCHICUM ILLYRICUM. Radix.

(GRONOVII et FŒRSKAL).
OF. *Radix hermodactyli.*

*

QUAL. In principio acri volatili residens.
VIRT.
USUS.

COLLINSONIA CANADENSIS. Radix.

CL. *Diand.* O. *Mong.* *Perennis; Americ. septent.*
A. *Nettle leaved collinsonia.*
QUAL. Odor nidorosus.
VIRT.
USUS. Colica lochialis.

COLUMBO. Obscura.

Vid. Radix Columbo. p. 190.

CONESSI CORTEX. Obscura.

Arbor. Ind. orient.

QUAL. Austero-amara.
VIRT.
USUS. Dysenteria (præmissis præmittendis); diarrhœa.
DOSIS. *Pulveris :* Drachma semis bis terve de die.

CONFERVA HELMINTHOCHORTON.

N. B. Non est substantia vegetabilis ut hactenus creditum fuit sed Nidus zoophyti (species polypi marini).

Vid. Corallina officinalis. p. 256.

CONFERVA RIVULARIS.

QUAL. Magnam gazis oxygenii quantitatem præcipue hyeme exhalans.

CONIUM MACULATUM.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis; in desertis umbrosis humidis.*

N. B. Caute a cicuta virosa, æthusa cynapio-

chærophyllo sylvestri, temulento et bulboso nec non a tordylio anthrisco distinguenda.

N. B. Conii maculati caracter est semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

OF. *Cicuta major* s. *Vulgaris.* G. *Ciguë ordinaire.* G. *Schierling.* A. *Common hemlock.* H. *Conio manchado; cicuta.*

QUAL. *Recentis:* Venenata; in principio narcotico et acri residens; odor teter; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; diuretica.

USUS *externus* forma pulveris et cataplasmatis: Scirrhus; ulcus phagedænicum; scrophula; tabes scrophulosa; caries; pertussis; tinea; tumor testiculi; tumor prostatæ.

DOSIS *pulveris vel succi inspissati:* gran. j. ascendendo gradatim ad gran. xx. de die.

PRÆP. Succus foliorum recentium expressus et inspissatus vulgo *extractum* cicutæ.

CONVALLARIA MAJALIS. Flores.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lilium convallium.* G. *Maguet de mai.* G. *Maiblumen.* A. *Maylilly or sweet scented lily of the vally.*

QUAL. *Recentis:* Odor fragrans; sapor amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Errhina; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS. Epilepsia?

CONVALLARIA POLYGONATUM.

Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Sigillum salomonis.* A. *Common salomon's seal.*

QUAL. Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Cosmetica?

USUS.

CONVOLVULUS JALAPPA. Radix.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Mexicana.*

OF. *Jalappa.* G. *Jalape.* G. *Jallapwurzel.* A. *Jalap bindweed; jalap.* H. *Jalapa.*

QUAL. In principio resinoso acri residens; odor ingratus; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica. *Resinæ:* Drastica; anthelmintica.

USUS: Vermes; obstipatio; physconia abdom.

DOSIS *pulveris:* Drach ß-℈ij pro adultis.

PRÆP. Resina; tinctura resinæ.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. Succus radicis gummi-resinosus inspissatus.

N. B. Optimus incisione radicis; vilior expressione aut decoctione plantæ obtentus.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Syriæ.*

OF. *Scammonium.* G. *Scamonée d'Alep.* G. *Skamonien.* A. *Scammony bindweed.*

QUAL. In succo lacteo acri et principio resinoso cum pauco gummoso residens; sapor acris, amaricans; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS.

DOSIS : Gran. v-x-xx.

PRÆP. Resina cum extracto glycyrrhizæ mixta vulgo *diagridium.*

CONVOLVULUS SEPIUM. Succus herbæ expressus et inspissatus.

OF. *Convolvulus major albus.* A. *Great bindweed.*

QUAL. et VIRT. Scammonium æmulans.

DOSIS : Gran. xx-xxx.

CONVOLVULUS SCOPARIUS. Lignum. *Frutic. insul. Barrancas.*

AN lignum Rhodium verum?

CONVOLVULUS SOLDANELLA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Ad littora maris Europæ.*

OF. *Soldanella; Brassica marina.* G. *Soldanelle; choux marin.* A. *Sea bindweed.*

QUAL. In succo lacteo acri residens; sapor acris, amaricans, nauseosus

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS : ʒj.

CONVOLVULUS TURPETHUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Indica.*

OF. *Radix turpethi.* G. *Racine de turbith.* A. *Squarre stalked bindweed.*

QUAL. In principio resinoso acri residens; sapor subinsipido-acris, nauseosus.

VIRT. Cathartica.
USUS.

COPAIFERA OFFICINALIS. Resina liquida incisione arboris obtenta (*vulgo* Balsamum).

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Americ. merid.*
OF. *Balsamum copaivæ.* S. *de copaiba.* G. *Baume de copahu.* G. *Kopaiva-balsam.* A. *Balsam of capivi.*
QUAL. Liquido-tenax; flavescens; in principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromaticus; subacris, amaricans; urinam amaram reddens.
VIRT. Stimulans; diuretica.
USUS: Blennorrhœa; leucorrhœa; morbi pulmonum, renum et hepatis pituitosi, atonici; circumcisio.
DOSIS: Gutt. XXX-XL. bis de die in haustu aquæ vel in vitello ovi.

CORDIA MYXA. Fructus (Drupa).

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arbor.; Ægypt.; Ind.*
OF. *Sebesten.* A. *Smooth leaved cordia.*
QUAL. Dulcis; mucilaginosa.
VIRT. Nutriens; lubricans.
USUS: Raucedo; tussis; stranguria.

CORIANDRUM SATIVUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Dygin.* *Annua.*
OF. *Semen coriandri.* G. *Coriandre.* G. *Koriandersaamen.* A. *Common coriander.* H. *Cilantro sativo.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus; sennæ odorem et saporem ingratum egregie mitigans.
VIRT. Hypnotica; lactifuga; carminativa.
USUS. Cum infuso sennæ.
DOSIS: Drach. j.

CORIS MONSPELIENSIS. Herba.
CL. *Pentand. O. Monog.* *Biennis; Europ. austr.*
QUAL. Præstans: sapor intense amarus; nauseosus.
USUS. Syphilis?

CORTEX ANGELINÆ. Obscura.
Insul. Grenad.
QUAL.
VIRT. Anthelminthica.
USUS: Lumbrici.
DOSIS: ʒj ad ℔iij aquæ ad colat. ℔j. Cujus uncia una alterave exhibetur omni mane.

CORTEX ANGUSTURÆ. Obscura.
Insul. Trinit.; Florid.
Vide BRUCEA.

CORTEX BELA-AYE. Obscura.
Arbor. Madagascar.
QUAL.
VIRT.
USUS. Diarrhœa; dysenteria; hæmorrhœa.
DOSIS. ℈j-iß mane et vesperi.

CORTEX CHINÆ FLAVUS. Obscura.
GE. *Cortex Chinæ regius.* *Amer. merid.*

QUAL. Sapor intense amarus; substypticus.
VIRT. Roborans; stomachica.
USUS. Intermittentes.

CORTEX. CHINÆ RUBER. Obscura.
Amer. merid.

QUAL. Sapor intense amarus.
VIRT. Eadem ac præced.
USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ SURINAMENSIS. Obscura.
Surinam.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CORTEX JUBABÆ. Obscura.
Ind. orient.

QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Nervina?
USUS.

CORTEX LAVOLA. Obscura.
QUAL.
VIRT.
USUS.

CORTEX MASSOY. Obscura.
Nov. Guinea.

QUAL. Odor gratus.
VIRT.
USUS *externus*: Tormina ventris.

CORTEX POCGEREBÆ. Obscura.
QUAL. Stÿptica; subamara;

VIRT. Adstringens.
USUS. Diarrhœa; dysenteria.

CORYLUS AVELLANA. Oleum fixum nuclei expressum.
CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Fruticosa.*
OF. *Coryli* s. *Avellanæ nuces.* A. *Common hazelnut-tree.*
QUAL. Oleum fixum, ægre rancescens, inodorum; hinc odoribus excipiendis aptum.

COSTUS. ARABICUS. Radix; Cortex Radicis.
CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind. orient. & occident.*
OF. *Costus arabicus; costus dulcis & amarus.* A. *Arabian costus.*
QUAL. In extractivo amaro et oleo volatili residens; sapor amaricans, aromaticus; odor fragrans; urinam violaceo odore imprægnans.
VIRT. Stimulans; calefaciens; menagoga.
USUS: In officinis sæpe cum canella alba confunditur.
DOSIS *pulv.* drach. semis; pro infuso unc. semis ad ℔ j aquæ.

CRAMBE ORIENTALIS. Radix recens.
CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Perennis.*
OF. *Crambe.* A. *Colewort.*
QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT. Antiscorbutica.

USUS.

CROCUS SATIVUS. Stigmata pistilli.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Alpina; Europæ austr. hortensis.*

Variet. A. officinalis autumnalis.

OF. *Crocus austriacus* s. *orientalis.* G. *Saffran.* G. *Saffron.* A. *Saffran.* H. *Azel fran cultivado.*

QUAL. Luteo-tinctoria; in oleo volatili et principio narcotico et resinoso residens; odor fragrans, virosus; sapor subaromaticus.

VIRT. Sedativa; hypnotica; leviter stimulans; antispasmodica; menagoga.

USUS: Amenorrhœa atonica; colica lochialis; pneumonia notha; vomitus. *Externus:* Ophthalmia.

DOSIS *pulveris:* gran. x-xx-xxx. *Tinct.* ʒß. *Extracti* gran. xv.

PRÆP. Tinctura; syrupus; extractum.

CROTON CASCARILLA. Cortex.

Croton lineare (HORT. KEW.).

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Americ. meridion.*

OF. *Cortex cascarillæ* s. *Eleutheriæ.* G. *Cbaquerille.* G. *Kaskarilrinde.* A. *Cascarilla or Willow leaved croton.*

QUAL. In oleo volatili et extractivo amaro residens; sapor aromaticus, amarus, subacris; odor fragrans, fumo moschato.

VIRT. Roborans; stimulans.

USUS: Dyspepsia; diarrhœa; febres intermittentes et remittentes biliosæ.

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx. Pro infuso aquoso vel vinoso drach. j. ad ℔j. *Extracti*: Drach. j.

PRÆP. Tinctura; extractum.

CROTON LACCIFERUM. Substantia resinosa (*Nidus insecti*).

CL. & O. *præced.* *Arborea*; *Ind. orient.*

N. B. Succus resinosus ex hac arbore æque ac ex fico religiosa et indica; nec non ex arbore plasonis et rhamno jujuba, punctura insecti COCCUS LACCA dicti exsudans; ejusque nidulum constituens.

OF. *Lacca* s. *gummi lacca.*

QUAL. Resina rubro tinctoria; substyptica.

VIRT. Subastringens; diuretica.

USUS. Lacca sigillatoria; vernices. *Tincturæ*: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

CROTON TIGLIUM. Semen; lignum.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Zeylanica.*

OF. *Grana tiglii* s. *tilli*: *Lignum pavanæ* s. *Moluccense.*

QUAL. Venenata, acerrima. *Semen decorticatum* oleum fixum, sine acri, continet.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica; exurens.

USUS.

CROTON TINCTORIUM. Fæcula.
CL. & O. *præced.* *Annua; Europ. austr.*
OF. *Lacmus.* G. *Tournesol.* A. *Officinal croton.*
QUAL. Cærulea, tinctoria.
USUS chemicus pro reagente.

CUCUMIS COLOCYNTHIS. Fructus; pulpa.
CL. *Monœc.* O. *Digyn.* *Annua; Asiatica; Hispan.*
OF. *Colocynthides.* G. *Coloquinte.* G. *Koloquinten.* A. *Bitter cucumber or gourd.* H. *Pepinera colquintida.*
QUAL. Odor nauseosus; sapor amarissimus, nauseosus.
VIRT. Eximia: Diuretica; deobstruens; drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica.
USUS. Physconia; hydrops; obstipatio; epilepsia.
DOSIS: *Intern.* gran. $\frac{1}{8}$. *Pulpæ* gran. xxx ad ℔ ß aquæ decoct. pro enemate.
PRÆP. Extractum cum mucilagine gummi tragacanthæ tritum, vulgo TROHISCI ALHANDAL; resina.
N. B. Antidotum ejus est camphora.

CUCUMIS MELO. Semen.
CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis.*
OF. *Semen melonum.* G. *Semence de melon.* G. *Melonen-kerne.* A. *Common melon.*
QUAL. Oleosa; subdulcis.
VIRT. Refrigerans.
USUS forma emulsionis: Febres; stranguria.

CUCUMIS SATIVUS. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen cucumis.* G. *Concombre.* GE. *Gurken saamen.* A. *Common cucumber.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CUCURBITA LAGENARIA.
——————— PEPO.
——————— CITRULLUS. } Semen.

CL. *Monœc.* O. *Syng.* *Annua; hortens.*

OF. *Semen cucurbitæ.* G. *Semence de courge ou potiron.* GE. *Kürbis-kerne.* A. *Bottle gourd; pompion, or pumpkin gourd; & water melon.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

CUMINUM CYMINUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Europ. austr. Ægypt.*

OF. *Semen cumini.* G. *Cumin officinal.* GE. *Rœmischer kümel; kronkümel.* A. *Cumin.*

QUAL. Præstans: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Colica flatulenta; tympanitis; tumores frigidi.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. Strobuli; folia.

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Asiatica.*

OF. *Folia cupressi; nuces* s. *Galbuli cupressi* s. *Cy-*

pressi. G. *Cyprès.* G. *Zipressenbaum.* A. *Upright cypress-tree.*

QUAL. Amaro-styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

CURCUMA LONGA. Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Indica.*

Amomum curcuma (JACQUIN).

OF. *Curcuma* vulgo *terra merita.* G. *Curcuma.* G. *Gelb wurzel; kurkuma-wurzel.* A. *Long rooted Turmeric.*

QUAL. In principio extractivo et pauco oleo volatili residens; sapor amarus, subaromaticus; urinam luteo colore tingens.

VIRT. Tinctoria; menagoga; diuretica; deobstruens.

USUS *internus:* intermittentes; physconia abdomin.; icterus; morbi cutis.

DOSIS *puveris* scrup. ij-drach j. In *infuso:* drach i| ad ℔ j aquæ.

CUSCUTA EPITHYMUM. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Digyn.* *Parasitica lupuli, dulcamaræ, Cannabis.*

QUAL. Odor et sapor thymi; sed debilior.

VIRT. Debilior sequenti.

CUSCUTA EUROPÆA. Herba.

Parasitica; annua.

OF. *Cuscutæ herba.* G. *Cuscute.* A. *Dodder.*

QUAL. Inodora; amaricans; subacris.
VIRT. Deobstruens.
USUS. Physconia abdomin.; intermittentes.

CYCLAMEN EUROPÆUM. Radix recens.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Hungar; Austriæ; in locis umbrosis, nemorosis.*
OF. *Cyclamen; arthanita.* G. *Saubrod; erdscheibe.*
A. *Common European cyclamen.*
QUAL. *Radicis recentis:* In principio acri volatili residens, siccatione avolans; sapor primo mucilaginosus; dein acris, urens, amaricans; *assatæ:* Esculenta.
VIRT. Drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica; resolvens.
USUS: Scirrhus; tumores frigidi; pernio; vermes.
DOSIS: Drachm j.
PRÆP. Unguentum *de arthanita.*

CYNARA SCOLYMUS. Folia.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*
OF. *Cynara hortensis.* G. *Artichaut.* G. *Artitschoken.*
A. *Artichoke.*
QUAL. Oleracea.
VIRT. Diuretica?
USUS. Hydrops.
DOSIS *succi:* ʒ ij-iij in haustu vini generosi.

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. Herba; Radix.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Biennis; in viis & cimeteriis.*

OF. *Cynoglossum.* G. *Cynoglosse.* GE. *Hundszungenwurzel.* A. *Officinal hound's tongue.*

QUAL. Odor graveolens; sapor mucilaginosus.

VIRT. Subnarcotica; phthiriaca.

USUS.

CYNOMORIUM COCCINEUM.

CL. *Monœc.* O. *Monand.* *Plantarum maritimarum parasitica; Afric.; Sicil.; Jamaic.*

OF. Fungus Melitensis.

QUAL. Nigra; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti internus:* Hœmorrhagiæ; dysenteria atonica; ulcera. *Externus:* Ulcera phagedænica.

DOSIS *pulveris:* Gr. xx ad drach. j.

CYPERUS LONGUS. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr. Syriæ; in locis humidis.*

OF. *Cyperus longus.* G. *Souchet.* GE. *Zyperwurzel.* A. *Cyperus.*

QUAL. Odor fragrans; sapor grate aromaticus, calidus.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Ulcera vesicæ, uteri, oris?

CYPERUS ODORATUS. } Radix.
——— ROTUNDUS. }

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

CYTINUS HYPOCISTIS. Succus baccarum expressus, inspissatus.

CL. *Gynand.* O. *Dodecand.* *Annua; parasitica; Europ. austr.*

OF. *Hypocistidis succus.* GE. *Hypozisten-saft.*

QUAL. Sapor acido-austerus, stypticus; alcohole solubilis.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia.

CYTISUS LABURNUM. Cortex.

VARIETAS: Alpinus.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; alpina; hortensis.*

A. *Common laburnum; cytisus alpinus.*

QUAL.

VIRT. Menagoga.

USUS *decocti:* Amenorrhœa.

D.

DAPHNE GNIDIUM. Semen.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Semen coccognidii; granum gnidium.* A. *Flax-leaved daphne.*

QUAL. Venenata.

VIRT.

USUS.

DAPHNE LAUREOLA. Cortex radicis.

OF. *Cortex mezerei.* G. *Garou; bois gentil.* A. *Common daphne, or spurge laurel.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

USUS præcipuus corticis recentis aceto emolliti loco vesicantis.

PRÆP. Unguentum ad fonticulos.

DAPHNE MEZEREUM. Cortex radicis.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Cortex laureolæ.* s. *Mezerei.* G. *Mezereum; faux garou.* G. *Kellerhals; seidelbastrinde.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica. *Extern.:* Corrodens; vesicans.

USUS *decocti corticis:* Ulcera maligna; morbi cutis et ossium syphilitici. *Externus* forma cataplasmatis: Scirrhus; orchiochele; lepra.

DOSIS: Drach ij corticis radicis (vel ʒß radicis) concisi cum portione æquali glycyrrhizæ in ℔iij aquæ coquendo ad colat. ℔ ij.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

DAPHNE THYMELÆA. Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

DATISCA CANNABINA. Herba.

CL. *Diœc.* O. *Dodecand.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *pulveris* (loco *cinchonæ*): Intermittentes.

DOSIS : Gran. xx-xxx ; repetendo hanc dosim ter quaterve tempore apyrexiæ.

DATURA STRAMONIUM. Semen; folia; succus foliorum expressus et inspissatus.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Annua; in locis desertis, arenosis.*

OF. *Stramonii herba ; daturæ semina.* G. *Endormie commun; pomme épineuse.* G. *Stechapfelkraut.* A. *Common Thornapple.*

QUAL. Venenata; in principio acri, narcotico residens; odor virosus; sapor nauseosus, amarus. *Seminis :* insipida.

VIRT. Narcotica interne vel externe applicata; dementans.

USUS *succi inspissati :* Melancholia; mania post puerperium ; epilepsia ; amentia ; carcinoma ; varix ani ; combustura.

DOSIS : gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. j-vj.

N. B. Antidotum ejus est acidum acetosum, vel acidum citricum.

DAUCUS CAROTA. Radix recens; folia; Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Biennis.*

OF. *Daucus sativus.* G. *Carote.* G. *Gelbe Mœhren; gelbe Rüben.* A. *Wild carrot.* H. *Zanahoria.*

QUAL. *Radicis :* In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, mucilaginosus.

Seminum. : odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. *Radicis* : Demulcens; antiseptica; *seminum* : stimulans; anthelminthica?

USUS *radicis rasæ forma cataplasmatis* : ulcera phagedænica, putrida, herpetica; carcinoma. *Decocti radicis* : Stranguria.

DELPHINIUM CONSOLIDA. Flores.

CL. *Polyandr. O. Trig.* *Annua.*

OF. *Flores calcitrappæ; consolida regalis.* GE. *Rittersporn.* A. *Branching larkspur.*

QUAL. Cærulea.

VIRT.

USUS.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis; in montibus Europ. austr.*

OF. *Staphisagria.* G. *Staphisaigre.* GE. *Stephanshraut; Lauskœrner.* A. *Palmated larkspur or stavesacre.*

QUAL. Præstans : Sapor amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS *pulveris* : Pediculi; acari subcutanei; odontalgia.

PRÆP. Unguentum.

DENTARIA PENTAPHYLLOS. Radix.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliquos.* *Alpina; Europ. austr.*

OF. *Dentaria minor.* GE. *Zahnwurzel.* A. *Five leaved Toothwort.*

QUAL. In principio acri volatili residens; sapor acris, nauseosus ut cochleariæ armoraciæ.

DIANTHUS CARYOPHILLUS. Petala.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Flores tunicæ hortensis; caryophilla rubra.* G. *Œillet girofflée.* GE. *Grasblumen; nelkenblumen; gartennelken.* A. *Clovepink, or clove july flower.*

QUAL. Odor fragrans.

DICTAMNUS ALBUS. Radix.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis.*

VARIET. A. *Flore niveo.* B. *Flore rubro.*

OF. *Dictamnus albus s. fraxinella.* G. *Dictame; fraxinelle.* GE. *Weisser diptam.* A. *White dittany et red fraxinella.*

QUAL. *Radicis recentis:* Odor ambrosiacus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Nervina; anthelminthica; menagoga.

USUS. Epilepsia; ataxia; leucorrhœa; vermes.

PRÆP. Tinctura gutt. xx—l ter die.

DIGITALIS PURPUREA. Folia.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Biennis; in sylvis.*

N. B. Tempore quo flores erumpunt colligenda, et caute siccanda.

OF. *Digitalis purpurea.* G. *Grande digitale.*

GE. *Fingerkraut; fingerhut.* A. *Purple Fox-glove.* H. *Dedalera purpurea; qualda perra.*

QUAL. Venenata: Sapor acris, amarus, nauseosus.

VIRT. Motum systematis arteriosi mire retardans, minuens; diuretica: *Majori dosi* emetica; drastico-cathartica.

USUS *internus forma pulveris, infusi vel tincturæ:* Hydrothorax (WITHERING), aliæve hydropis species; hæmophthysis; phthysis incipiens; tabes ex pure absorpto; asthma spasmodicum (cum opio) FERRIAR; catarrhus; rheumatismus acutus; cynanche trachealis seu stridula aut polyposa infantum (anglis *Croup*); phlegmasiæ variæ; nephritis calculosa; dysuria; palpitatio; pertussis? mania ex sero effuso; epilepsia; scrophula? *N. B.* Quandoque juvat dare cum opio, aut pro re nata, cum muriate hydrargyri et pulvere sudorifico DOVERI in morbis inflammatoriis variis.

Externus infusi, forma lotionis s. injectionis: Herpes? erythema; pustulæ faciei etc.? blennorrhagia?

DOSIS. *Pulveris:* Gran. semis—j bis terve de die pro adultis. Pro *infuso* drachm. j foliorum siccatorum ad uncias viij aquæ fervidæ per quadrihorium digerendo et colat. addendo unc. j. aquæ aromaticæ cujusdam; dosis unc. j bis de die, quæ est dosis media pro adulto (multis unc. semis bis de die sufficit). *Tincturæ* gutt. xx-xxx bis die cum unc. j aquæ cujusdam aromaticæ vel infusi cujusdam amari.

DOLICHOS SOJA. Faba.

CL. *Diadelph. O. Decandr.* *Ind. orient.*

QUAL. Subdulcis; farinacea.

USUS. Culinaris.

DOLICHOS URENS.
——— PRURIENS. } *Vid.* Labradia.

DORONICUM LATIFOLIUM.
——— PARDALIANCHES. } Radix.

CL. *Sing. O. Polyg. superfl.* *Perennis; alpina, Europ. austr.*

OF. *Doronicum.* GE. *Gemsenwurzel.* A. *Great leopard's bane.*

QUAL. Sapor dulcis, aromaticus.

VIRT. Arnicam montanam æmulans.

DORSTENIA CONTRAYERVA. Radix.

CL. *Monœc. O. Diandr.* *Perennis; Americ. merid.*

OF. *Contrayervæ radix.* G. *Contrayerva.* GE. *Giftwurzel.* A. *Contrajerva.*

QUAL. Præstans: Odor subfragrans; sapor amaricans, subaromaticus, stypticus.

VIRT. Adstringens; antiseptica; sudorifica; stomachica; stimulans.

USUS. Febres et exanthemata atonica; dysenteria.

DOSIS *pulveris.* Gran. x ad drach. j. *Tincturæ:* drach. j—ij.

DRACÆNA DRACO. Resina.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*

OF. *Sanguis draconis.* G. *Sang de dragon.* A. *Dragon-tree.*

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; apocenoses; leucorrhœa.

DOSIS. Gran. x ad drachmam semis.

DRACOCEPHALUM CANARIENSE. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; Ins. Canar.* *N. B.* Floribus spicatis; foliis compositis.

OF. *Melissa canariensis.* A. *Canary dragon's head; or balm of gilead.*

QUAL. Eximia: Odor intense fragrans; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Excitans; nervina; stomachica.

USUS. Cachexiæ; cephalalgia; cardialgia.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM.

VIRT. Multo debilior præced. *Annua.*

DRACONTIUM POLYPHYLLUM. Radix.

CL. *Polyandr.* O. *Polygyn.* *Japon.*

QUAL. Acris.

VIRT. Pellens; fortiter menagoga.

DROSERA ROTUNDIFOLIA. Herba.
CL. *Pentand.* O. *Tetrag.* *Biennis.*
OF. *Ros solis; rosella.* A. *Round leaved sun-dew, or rosa solis.*
QUAL. Lactescens; sapor acris.
VIRT. Corrodens.
USUS.

E.

ECHITES SYPHILITICA. Folia; Herba.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Surinam.*
QUAL. Lactescens.
VIRT. Antisyphilitica?
USUS *decocti*: Syphilis.

EPIDENDRUM VANILLA. Siliqua.
CL. *Gynand.* O. *Diandr.* *Fruticosa; parasitica. Ind. occident.*
OF. *Vanilla.* G. *Vanille.* GE. *Vanillen.* A. *Vanilla.*
QUAI. Eximia: pinguis; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.
VIRT. Stimulans; calefaciens; nervina; aphrodisiaca.
USUS. Potissimum ut choccoladæ ingrediens.
DOSIS. Drach. semis.

EQUISETUM ARVENSE. Herba.
CL. *Cryptog.* O. *Filices.* *Perennis.*
OF. *Equisetum; cauda equina.* A. *Corn horse-tail.*
QUAL.

VIRT. Adstringens; diuretica.
USUS. Blennorrhœa; apocenoses; tabes? Hœmaturia?

EQUISETUM HYEMALE.

QUAL. et VIRT. Præced.

ERIGERON ACRE. Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis.*
OF. *Coniza cærulea.* A. *Blue erigeron.*
QUAL. Sapor acris; synapim æmulans.
VIRT. Antiscorbutica.

ERVUM LENS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua.*
GF. *Lens; lentium semen.*
QUAL. Farinacea.
VIRT. ?
USUS.

ERVUM ERVILIA. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua; Europ. austr.*
OF. *Ervi* s. *orobi semen* A. *Flat-seeded tare, or common lentil.*
QUAL. Farinacea.
VIRT.
USUS.

ERYNGIUM CAMPESTRE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; maritim.*
OF. *Eryngium vulgare.* A. *Chardon-roland.* G. *Mannstreu; brachdistel.* A. *Common Eryngo.*

QUAL. Sapor dulcescens, subaromaticus.
VIRT. Diuretica; aphrodisiaca?
USUS. Tabes pulmonalis ulcerosa.
DOSIS. Unc. semis ad ℔ j aquæ pro infuso quotidie.

ERYNGIUM FŒTIDUM. Herba.
CL. & O. *Præced.* *Americ.*
QUAL. Eximia: odor teter, fœtidissimus, tenax.
VIRT. Cathartica; diuretica; antispasmodica.
USUS. Hysteria; hydrops.

ERYSIMUM ALLIARIA. Herba.
CL. *Tetrad.* O. *Siliqu.* *Perennis; in locis umbrosis.*
OF. *Herba alliariæ.* A. *Stinking hedge-mustard, or sauce-alone.*
QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor amarus.
VIRT. Diuretica; errhina; antiscorbutica.
USUS. Asthma; ulcus putridum.

ERYSIMUM BARBAREA. Folia.
CL. & O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Barbareæ folia.* G. *Herbe St. Barbe.* A. *Common winter hedge-mustard or cress.*
QUAL. Sapor amarus, subacris; odor herbaceus.
USUS. Antiscorbutica.

ERYSIMUM OFFICINALE. Herba recens et fructus.
CL. & O. *præced.* *Annua; ad vias & in sabulosis.*
OF. *Erysimum.* G. *Vélar; torterelle; herbe du chantre.* G. *Wegsenf.* A. *Common hedge-mustard.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris.
VIRT. Adstringens; diuretica; antiscorbutica.
PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus.
USUS *Syrupi* egregius: Paraphonia; raucedo; tussis; ischuria?

EUPATORIUM CANNABINUM. Herba; radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*
OF. *Eupatorium.* G. *Eupatoire d'Avicenne.* GE. *Wasserdost; kunigundenkraut.* A. *Common eupatorium; or hemp-agrimony.*
QUAL. Sapor intense amarus; odor acris, penetrans.
VIRT. *Radicis:* diuretica; cathartica; emetica.
USUS. Cachexiæ; hydrops; hydrocele.

EUPHORBIA CANESCENS.

CL. *Dodecand.* O. *Trigyn.*
QUAL. Acris.
VIRT. Antisyphilitica?
USUS *Americanis:* syphilis.

EUPHORBIA ESULA. Succus foliorum expressus.

CL. & O. *præced.* *In sepibus & locis aridis.*
OF. *Esula.* GE. *Wolfsmilch.*
QUAL.
VIRT.?
USUS. Icterus.
DOS. *succi* drachm. ß-j-unc. semis omni mane.
PRÆP. Extractum-gr. viij-x.

EUPHORBIA. OFFICINARUM. Succus gummi-resinosus incisione plantæ obtentus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Gummi Euphorbium.* G. *Euphorbe.* GE. *Euphorbienharz.* A. *Euphorbium, or officinal spurge.*

QUAL. Lactescens; in principio acri resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; rubefaciens; vesicans.

PRÆP. Tinctura; emplastrum.

USUS *externus pulveris* (*melius tincturæ*): punctura; caries. *Emplastri*: Arthrodynia rheumatica.

N. B. Euphorbiæ diversæ species qualitate et virtute fere similes sunt.

EUPHORBIA LATHYRIS. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis; Europ. austr.*

OF. *Cataputia minor; purgier-kœrner; spring-kœrner.* A. *Caper spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; corrodens.

EUPHORBIA PALUSTRIS. Succus foliorum expressus et inspissatus; radix; cortex radicis.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Tithymalus.* G. *Tithymale des marais.* GE. *Marsh spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; corrodens; vesicans.

USUS *externus*: Tinea; verruca; clavus; serpigo; odontalgia.

DOSIS succi inspissati gr. viij-XII-3j.

EUPHORBIA PARVIFLORA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Ind. occident.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS decocti: Syphilis.

EUPHRASIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Annua; in collibus siccis, sterilibus.*

OF. *Euphrasia.* G. *Euphraise.* A. *Common eye-bright.*

QUAL. Pinguis; amaricans.

VIRT. ?

USUS. Ophthalmia.

F.

FAGARA OCTANDRA. Resina sponte, vel incisione corticis, exsudans (JACQUIN).

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; insulæ Curaçao.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

USUS. Ad suffimigia.

Vide etiam *Populus balsamifera.*

FAGARA PTEROTA. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Jamaic.*

QUAL. Subacris; aromatica.
VIRT. Calefaciens; stomachica.

FAGARA PIPERITA. Cortex; folia; fructus.
CL. *et* O. *præced.* *Japon.*
QUAL. Acris, aromatica.
VIRT. *Foliorum:* Vesicans.
USUS *foliorum* cum farina oryzæ in pultem redactorum: Partibus e rheumatismo dolentibus instar vesicatorii adplicando; uti etiam bubonibus.

FERULA AMMON (A. BROUSSONET ex autopsia). Gummi-resina vulgo *Gummi ammoniacum* dicta.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.*
Vide Gummi-resina Ammon.

FERULA ASSA FŒTIDA. Succus gummi-resinosus, incisione radicis plantæ obtentus concretus. *Perennis; Persiæ.*
OF. *Assa fœtida; gummi assæ fœtidæ.* G. *Assa fœtida.* GE. *Teufelsdreck; stenkinder asand.* A. *Assa fœtida.*
QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, nauseosus; odor alliaceus. Ex $\frac{2}{3}$ gummi et $\frac{1}{3}$ resinæ constans.
VIRT. Stimulans; antispasmodica; anthelminthica; carminativa; menagoga; deobstruens; resolvens.
USUS *internus* et *externus* forma pilularum, tincturæ, enematis, emplastri: Hysteria; convulsio; cardialgia spasmodica; colica flatulenta; tympanitis;

*

asthma spasmodicum; pertussis; physconia abdom.; vermes; paronychia; bubo; caries.

DOSIS *pulveris:* Gran. x—xl—lx ter quaterve de die.

Tincturæ: Gutt. x—xxx—drach. duas.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; pilulæ.

FEVILLEA TRILOBATA.

USUS. Morsura serpentum.

FICUS CARICA. Fructus.

CL. *Polyg* O. *Diœc.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Carica pinguis; ficus.* G. *Figues.* GE. *Feigen.* A. *Common figue-tree.*

QUAL. Dulcis; mucilaginosa.

VIRT. Nutriens; emolliens; maturans; obtundens; expectorans; eccoprotica; herpetica?

USUS *decocti internus:* Raucedo; tussis; colica pictonum; obstipatio. *Externus* in lacte decocti, vel assati fructus forma cataplasmatis: Odontalgia; phlegmone; cynanche; bubo; anthrax.

FICUS INDICA et RELIGIOSA. Gummi-resina punctura cocci ex arbore exsudans vulgo *Gummi-lacca* dicta. *Vid.* Coccus Lacca. *Arbor. Ind. orient.*

FRAGARIA VESCA. Radix; herba; fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polyg.*

OF. *Fragaria; fraga.* G. *Fraisier ordinaire* s. *Fragaire; fraises.* GE. *Erdbeeren.* A. *Strawbery.*

VIRT. Diuretica; refrigerans.

FRAXINUS EXCELSIOR. Cortex ramulorum; semen; folia.

CL. *Polyg.* O. *Diœc.* *Arborea.*

OF. *Cortex fraxini.* G. *Ecorce du fresne ordinaire.* GE. *Eschenrinde.* A. *Common ash.*

QUAL. *Corticis :* Sapor amaricans. *Seminum :* aromaticus.

VIRT. *Corticis :* Antiseptica. *Seminum :* Diuretica; aphrodisiaca?

USUS *Corticis*, loco cinchonæ officinalis : intermittentes. *Seminum :* Lithiasis? Polysarcia? *Foliorum :* Morsura serpentum?

FRAXINUS ROTUNDIFOLIA. Aliæque SPECIES. } Succus saccharinus ex arbore exsudans.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Manna.* G. *Manne.* GE. *Manna.* A. *Manna.*

QUAL. In principio saccharino mucilaginoso residens; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Obstipatio.

DOS. Unc-j. Infantibus drach. j-iij.

FUCUS VESICULOSUS. Cineres.

CL. *Cryptog.* O. *Algæ.*

OF. *Quercus marina ; æthiops vegetabilis.* GE. *Varec.*

QUAL. Salina; alkalina.

USUS *Calcinati :* Bronchocele; scrophula.

DOS. Drach. j. bis de die.

FUMARIA BULBOSA. Radix.

CL. *Diadelph.* O. *Hexand.* *Perennis; in umbrosis.*

Variet. A. Radice cava. B. Radice non cava.

OF. *Aristolochia cava*, S. *fabacea.* A. *Hollow-rooted & solid-rooted bulbous fumitory.* GE. *Runde hohlwurzel.*

QUAL. Sapor amarus; debilior sequenti.

VIRT. Stomachica.

FUMARIA OFFICINALIS. Herba recens; succus.

CL. & O. *præced.* *Annua; in campis.*

OF. *Fumaria.* G. *fumeterre ordinaire.* G. *Erdrauch; taubenknopf.* A. *Common fumitory.*

QUAL. Inodora; sapor pure et intense amarus.

VIRT. Stomachica; antacida.

USUS. Dyspepsia; morbi cutis; cachexia; physconia abdominalis.

DOS. *succi* herbæ recentis expressi unc. ij bis de die. *Extracti :* Drach. j-ij.

PRÆP. Extractum; conserva; syrupus; tinctura.

G.

GALEGA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Galega.* G. *Geisraute; pestilenzkraut.* A. *Blue & red galega or goat's rue.*

QUAL. Sapor amaricans, mucilaginosus, subaromaticus.

VIRT?
USUS.

GALIUM APARINE. Succus ex herba, primo vere collecta, expressus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.*

OF. *Apparine.* G. *Gaillet crochant; gratteron.* A. *Goose-grass.* H. *Amor de hortulano.*

QUAL. Sapor adstringens.
VIRT.?
USUS. Scrophula; morbi cutanei?
DOS. Unc. iv bis de die.

GALIUM MOLLUGO. Herba cum floribus.

CL. *et O. præced.* *Perennis.*

OF. *Galium album.* G. *Caille-lait blanc.* A. *Great ladies bed-straat.*

QUAL.
VIRT.
USUS *succi expressi:* Epilepsia.
DOSIS. Unc. v—vj mane jejuno stomacho.

GALIUM VERUM. Herba cum floribus seu coma.

CL. *et* O. *præc. Perennis; in pratis et muris antiquis.*

OF. *Galium luteum.* G. *Gaillet vrai; vrai Caille-lait.* GE. *Waldstroh; Bettstroh.* A. *Yelow ladies bed-straw.* H. *Galio verdadero; cuajaleche.*

QUAL. *Recentis:* Odor fragrans; sapor adstringens.

*

VIRT. Coagulans lac.

USUS. Epilepsia; hæmaturia; hysteria.

GARCINIA MANGOSTANA. Cortex capsulæ; medulla.

CL. *Dodecandr.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Mangostana cortex.* A. *Breadfruit tree.*

QUAL. Styptica. *Medullæ:* Farinacea.

USUS *infusi vel tincturæ cort.:* Dysenteria; tenesmus; aphtha.

GENISTA CANARIENSIS.

N. B. LIGNUM RHODIUM non ex hac planta, ut quidam crediderunt, sed ex Convolvulo scoparia provenire nuperrime ab A. BROUSSONET didicimus.

Vid. Convolvulus scoparius.

GENISTA TINCTORIA. Herba; flores; semen.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa.*

QUAL. Luteo-tinctoria; inodora; insipida.

USUS. Hydrops.

GENTIANA AMARELLA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

OF. *Gentianella.* GE. *Hoher Himmelsstengel; herbstenzian.* A. *Autumnal gentian.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica.
USUS.

GENTIANA ASCLEPIADEA. Radix.
A. *Swallowwort-leaved gentian.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.
USUS idem.

GENTIANA CRUCIATA. Radix.
A. *Crosswort gentian.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

GENTIANA CENTAUREUM. Herba; cacumen.
CL. & O. *præced.*
OF. *Centaurium minus.* A. *Petite centaurée.* GE. *Tausendguldenkraut; Fieberkraut.* A. *Centaury gentian or lesser centaury.* H. *Gentiana centaura.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.
PRÆP. Extractum.
DOSIS. Scrup. j - drach. j.

GENTIANA LUTEA. Radix.
CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina.*
OF. *Gentiana rubra.* G. *Gentiane.* GE. *Rother enzian.* A. *Yellow gentian.*
QUAL. Intense et pure amara.
VIRT. Stomachica; antiseptica; anthelminthica.
USUS *extracti:* Dyspepsia; icterus; intermittentes; physconia abdominal.; leucophlegmatia; chlorosis; podagra; vermes.
PRÆP. Extractum; infusum aquosum vel vinosum.
DOSIS. ℈j - ʒj.

GENTIANA PURPUREA. Radix.
CL. & O. *præced.* *Norwegica.*
NORWEGIS : *Skorsite.*
OF. *Radix cursuta.* A. *Purple gentian.*
QUAL. VIRT. et USUS. Præced.

GEOFFROYA INERMIS (HORT. KEW.) Cortex.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea ; Jamaic.*
GE. *Kohlbaum-rinde.* A. *Smooth Geoffroya or bastard cabbage-tree.*
QUAL. Odor nauseosus ; sapor nauseoso-dulcis.
VIRT. Drastico-cathartica ; emetica ; anthelmintica.
USUS *decocti :* Lumbrici et ascarides.
DOS. *pulveris corticis :* Unc j ad ℔ij aquæ coctæ ad ℔jß. -- Sumendo unc j omni hora, donec alvum movere incipiat.

GEOFFROYA SURINAMENSIS. Cortex.
QUAL. *Surinam.*
VIRT. Anthelminthica efficax, ubi alia fefellerunt.
USUS Idem ac præced.
DOS. Drach. iij ad aquæ colat. ʒ viij pro adulto ; minuendo pro junioribus.

GERANIUM MOSCHATUM. Herba.
CL. *Monadelph.* O. *Decand.* *Annua.*
QUAL. Odor ambrosiacus, moschatus.
VIRT.
USUS.

GERANIUM ROBERTIANUM. Herba.

GA. *Herbe à Robert.* A. *Stinking crane-bill or herb Robert.*

QUAL. Odor hircinus; sapor salsus, substypticus.

VIRT. Subastringens; lactifuga?

USUS. Hæmaturia: profluvia. *Externus:* Bubo; ulcera vulvæ aut mammarum; Rhagas.

GEUM RIVALE. Radix.

CL. *Icosand. O. Polyg.* *Perennis; in locis humidis, nemoros i.*

OF. *Geum rivale, seu palustre.* G. *Benoîte aquatique.* GE. *Wasser-benediktenwurzel.* A. *Water avens.*

QUAL. Præstans: sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *pulveris radicis extern.* Ulcera syphilitica. *Internus:* Diarrhœa atonica; chlorosis; intermittentes.

DOS. *pulveris:* Scrup. ij-drach j. Pro *decocto* unc ß ad ℔j aquæ.

GEUM URBANUM. Radix; fibræ radicis (primo vere ex solo sicco colligendæ).

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.*

OF. *Radix caryophyllatæ* s. *gei urbani.* G. *Benoite caryophyllée.* GE. *Benediktenwurzel; Nelkenwurzel.* A. *Common avens or herb bennet.* H. *Geo domestico.*

QUAL. In principio adstringente cum pauco oleo

volatili residens; sapor subaromaticus, amaricans; odor fragrans caryophylli.

VIRT. Roborans; antiseptica; cinchonæ virtutes æmulans.

USUS. Egregius, loco cinchonæ: Intermittentes rebelles; febres atonicæ; dyspepsia; diarrhœa; amenorrhœa atonica; chlorosis.

DOS. *pulveris*: Drach j cum melle vel syrupo corticis aurantii. *Decocti aut melius infusi*: Unc j ad ℔ j aquæ.

PRÆP. Extractum; tinctura *dosi* ʒ ß ter, quaterve, tempore apyrexiæ.

GLADIOLUS COMMUNIS. Radix.

Variet.: A. Flore rubro. B. Flore incarnato. C. Flore albo.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *In locis memorosis.*

OF. *Radix victorialis rotundæ.* G. *Allermannharnisch.* A. *Cornflag.*

QUAL.

USUS. Aphrodisiaca?

USUS.

GLECOMA HEDERACEA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnops.* *Perennis.*

OF. *Hedera terrestris.* G. *Lierre terrestre.* G. *Gundelreben; gundermann; erdepheu.* A. *Ground-ivy.* H. *Yedra terrestre.*

QUAL. sapor amaricans, subacris.

VIRT. Expectorans; roborans.

USUS *infusi cum lacte ve. aqua*: Catarrhus atonicus; tabes ulcerosa.

GLOBULARIA ALYPUM. Folia.

CL. & O. *præced.* *Suffrutex*; *Europ. austr.*; *in sylvis saxosis.*

OF. *Globularia.*

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS. Intermittentes; obstipatio.

GLYCYRRHIZA GLABRA. } Radix; succus radicis expressus, et inpissatus.
——————— ECHINATA. }

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis*; *Europ. austr.*

OF. *Liquiritia; glycyrrhiza.* G. *Réglisse.* G. *Süssholz.* A. *Common liquorice & prickley headed liquorice* H. *Regaliz; orozuz; palo dulce.*

QUAL. In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, subacris, amaricans.

VIRT. Demulcens; expectorans.

USUS *in infuso* cum aliis. — *Succi*: Catarrhus; paraphonia; stranguria.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo* extractum.

GNAPHALIUM ARENARIUM. Flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis*; *in collibus sterilibus.*

OF. *Stœchas citrina.* G. *Reinblumen.* A. *Everlasting.*

QUAL. Odor suaveolens, moschum quodammodo referens; sapor aromaticus, substypticus.

VIRT.

USUS.

GNAPHALIUM DIOICUM. Flores.

OF. *Pescati.* A. *Mountain everlasting or cudweed.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Eadem ac præced.

GOSSYPIUM HERBACEUM. } Lana semen
Aliæque SPECIES. } circumdans.

CL. *Monadelph. O. Decandr. Ind. orient. & occident.*

OF. *Gossypium seu bombax.* G. *Coton.* GE. *Baumwolle.* A. *Common Cotton.*

QUAL.

VIRT. Mechanica.

USUS.

GRATIOLA OFFICINALIS. Herba cum floribus.

CL. *Diand. O. Monog. Perennis; in pratis humidis, paludosis.*

OF. *Gratiola.* G. *Gratiole.* G. *Wilder-aurin; erdgalle.* A. *Hedge-hyssop.* H. *Graciola officinal.*

QUAL. In principio extractivo residens; odor nauseosus; sapor intense amarus, nauseosus.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; anthelmintica.

USUS. Mania; ascites; vermes; syphilis? ulcera phagedænica.

DOS. Pulveris initio drach ß bis die; dein gr. X-XV ter de die. *In infuso* drach iij ad ℔j aquæ.

GUAJACUM OFFICINALE. Lignum; cortex ligni; succus gummi-resinosus ex arbore exsudans, concretus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Lignum guajacum s. lignum sanctum: Gummi guajacum; resina guajaci.* G. *Gayac; gomme guajac.* GE. *Guajakholz; franzosen-holz: guajak-gummi; guajak-harz.* A. *Officinal guajacum, or lignum vitæ: gum-gajac.* H. *Guajaco officinal.*

QUAL. *Cort. et ligni:* Sapor amaricans, subacris. *Gummi-resinæ:* Sapor acris, pungens.

VIRT. Præstans: Stimulans; sudorifica; alterans. *Extracti:* Errhina.

USUS. Syphilis; arthritis vaga; arthrodynia rheumatica et arthritica; morbi pulmonum atonici; leucorrhœa; morbi cutanei; podagra atonica, retrocedens.

DOSIS. *Ligni vel corticis ligni rasi:* In decocto unc. j ad libr. ij aquæ coct. ad colat. lib. j. — *Gummi resinæ:* Gran. x—xx ad drach. j forma pulveris, vel in alcohole diluto soluta.

PRÆP. Gummi-resina; extractum; tinctura; oleum volatile.

GUAJACUM SANCTUM.

VIRT. et USUS idem ac præced.

GUILANDINA MORINGA. Lignum; fructus; oleum fructus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arbor.; Afric. et Indor.*

An lignum Nephriticum et oleum Behen ex hac planta proveniunt?

OF. *Lignum nephriticum : Nuces behen s. been s. balani myristicæ s. glandes unguentariæ.*
GE. *Griesholz : Been-nüsse.* A. *Smooth bonduc.*
QUAL. *Ligni :* Flavo-pulescens, cæruleo tingens; sapor subacris, amaricans.
VIRT. *Fructus :* Mucilaginosa; oleosa. *Olei fructus :* Pinguis, tardissime rancescens.
USUS. *Ligni :* Nephritis calculosa? Psora.
PRÆP. Tinctura; oleum fixum *Behen* dictum.

GUMMI-RESINÆ seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA AMMON.

Vid. Ferula ammon, p. 91.

N. B. Plantam hactenus obscuram, quæ *Gummi ammoniacum* dictum largitur, esse Ferulæ speciem dubitare amplius non sinunt Plantulæ plures e seminibus a Duo A. BROUSSONET, ex Africa transmissis in horto Dni CELS, Parisiis elevatæ, quæ hac æstate læte viguerunt.

OF. *Gummi ammoniacum.* G. *Gomme ammoniaque.*
GE. *Ammoniak-gummi.* A. *Gum-ammoniac.*
QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor nauseosus, amarus, acris (quandoque caliginem inducens WICHMANN).
VIRT. Stimulans; antispasmodica; expectorans; deobstruens. *Extern.* : Resolvens.
USUS *internus :* Asthma; expectoratio difficilis; physconia abdominalis. *Externus :* Aceto scillitico soluta forma emplastri et unguenti : Lupia; tumores articulorum frigidi; hydarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo

(arthritico) affectus in me ipso primus tentavi, ejusque usu pedem ab amputatione servavi; inde hoc scopo in praxin medicam introductum fuit Londini.

DOS. Scrup. j - ij - iij.

PRÆP. Pilulæ; emulsio; solutio in aceto scillæ maritimæ; emplastrum.

GUMMI-RESINA ASSÆ FŒTIDÆ.

Vide Ferula assa fœtida.

GUMMI-RESINA BDELLIUM. Obscura.

Arab.; Afric.

QUAL. Odor fragrans; sapor amarus.

VIRT. Stimulans; deobstruens; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Forma emplastri vel unguenti.

GUMMI-RESINA CAMBOGIÆ.

Vide Cambogia gutta.

N. B. Ex stalagmite cambogioide, cambogia gutta, guttæfera vera, hyperico baccifero, aut pneumonanthis specie promiscue desumi creditur.

GUMMI-RESINA CARANNA. Obscura.

An palmæ species? *Amer. merid.*

OF. *Carannæ gummi.*

QUAL.

VIRT. Stimulans; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Tumores frigidi.

GUMMI-RESINA CATECHU.

Vide Mimosa Catechu.

OF. *Terra Japonica; succus Japonicus; catechu.*

GUMMI-RESINA EUPHORBIÆ.

Vide Euphorbia officinalis.

GUMMI-RESINA GALBANUM.

Vide Bubon galbanum.

GUMMI-RESINA GALDA. Obscura.

OF. *Gummi galda.*

QUAL. Odor et sapor resinæ amyr. elemiferæ.

VIRT. Stimulans; expectorans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA GUAJACI.

Vide Guajacum officinale.

GUMMI-RESINA HEDERAE.

Vide Hedera helix.

GUMMI-RESINA JUNIPERI.

Vide Juniperus lycia.

OF. *Olibanum, Thus.*

GUMMI-RESINA KIKEKUNEMALO. Obscura.

OF. *Kikekunemalo gummi.*

QUAL. Sapor subacris, resinosus.

VIRT. Antispasmodica; nervina; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA KINO. Obscura.

Africana.

OF. *Gummi kino* s. *gummi rubrum Gambiense.*

QUAL. Eximia : styptica; extractivo-resinosa.

VIRT. Adstringens; roborans; antiseptica.

USUS *pulv. vel infusi intern. & extern.* : Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blenorrhœa; diarrhœa. *Amaris juncta :* Intermittentes.

DOS. *pulv.* ℈j - jß. Pro infuso ʒß ad ℔j aquæ, cujus unc. ij - iij ter quaterve de die.

PRÆP. Tinctura cum alcohole diluto parata ʒß pro dosi.

GUMMI-RESINA LACCA.

Vide Ficus indica. *Ind. orient.*

OF. *Gummi Lacca.*

GUMMI-RESINA LOOK. Obscura.

OF. *Look gummi.*

QUAL. Potissimum resinosa.

VIRT. Stimulans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA LUTEA. Obscura.

QUAL. *Novæ Hollandiæ.*

VIRT.

USUS. Dysenteria; alvi profluvia.

GUMMI-RESINA MYRRHA. Obscura.

Vide Laurus myrrha.

Arborea; Littoris merid. & orient. maris rubri.

An Mimosæ, an lauri species?

OF. *Myrrha; gummi myrrhæ.* G. *Gomme myrrhe.* G. *Myrrhen.* A. *Myrrha.*

QUAL. Sapor aromaticus, intense amarus, subacris.

VIRT. Stomachica; stimulans; menagoga.

USUS *internus* Myrrhæ masticatæ vel solutæ in alcohole diluto: Dyspepsia; hysteria; asthma pituitosum; catarrhus; amenorrhœa atonica. *Externus:* Caries; ulcus; fistula; gangræna; cynanche atonica; laxitas gingivarum; aphtha.

DOS. Gran X-ʒij.

PRÆP. Tinctura. Drach ß-j pro dosi.

GUMMI-RESINA OLAMPI. Obscura. *Americ.*

OF. *Olampi gummi.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

GUMMI-RESINA OPOPANACIS.

Vide Pastinaca opopanax.

GUMMI-RESINA PAPAVERIS.

Vide Paparer sommiferum.

OF. *Opium.* — VETERIBUS. *Lachryma papaveris.*

GUMMI-RESINA RAKASIRA. Obscura.

An balsamum?

OF. *Rakasira balsamum.*

QUAL. Sapor subamarus, balsamicus.

GUMMI-RESINA SAGAPENUM. Obscura.
Africana.

OF. *Gummi sagapenum* s. *serapinum.*

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS. Hysteria; amenorrhœa atonica; tumores frigidi; physconia abdominalis. Forma pulveris vel solutionis in alcohole diluto.

DOS. Gran. x-xx-xxx.

GUMMI-RESINA SARCOCOLLA.
An ex Penea sarcocolla? *Vide* Penea.

OF. *Gummi sarcocolla.*

QUAL. Sapor nauseosus, amaro-dulcis, acris.

GUTTÆFERA VERA. (KŒNIG). Succus gummi-resinosus, ex cortice trunci aut ex foliis et ramulis fractis promanans (*vulgo* gummi-gutta dictus).
Arborea; Siamensis, Zeylonica.

OF. *Gummi-gutta* s. *gummi gambogia.*

N. B. Vide etiam Hypericum et Cambogia.

GYPSOPHILA STRUTHIUM. Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.*

QUAL. Saponacea.

H.

HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM. Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Amer. merid.*

OF. *Lignum campechianum* s. *Campechense.* G. *Bois de campêche.* GE. *Kampesch-holz; blauholz.* A. *Log-wood.*

QUAL. Tinctoria; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringen.

USUS *decocti vel extracti:* Diarrhœa; sub finem dysenteriæ.

DOS. Unc ij ad ℔ij aquæ coctæ ad ℔j.

PRÆP. Extractum gran. X-XL pro dosi.

HEDERA HELIX. Folia; baccæ; succus gummi-resinosus incisione corticis obtentus, concretus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Hedera arborea; gummi hederæ.* GE. *Epheu; Eppich; immergrün: Epheuharz.* A. *Common Ivy.*

QUAL. *foliorum*: Sapor amarus, stypticus, nauseosus. *Baccarum:* Sapor amarus, acidus. *Gummi-resinæ:* Odor et sapor leviter aromaticus.

VIRT.

USUS *infusi foliorum:* Atrophia infantum; Rhachitis; ozæna; ulcera; epiphora; fonticuli.

HEDYOTIS AURICULARIA. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Frutic. Zylonica.*

QUAL. Odor fragrans.
VIRT.
USUS. Cophosis.

HELLEBORUS FŒTIDUS. Herba; folia; succus expressus.

CL. *Polyand. O. Polyg.* *Perennis; Europ. austr.*
OF. *Helleborus fœtidus* s. *helleboraster.* GE. *Stinkende Niesswurzel.* A. *fœtid Hellebore or bears foot.*
QUAL. Præstans: Odor teter; sapor acris, amaricans, nauseosus.
VIRT. Emetica; cathartica; anthelminthica; deobstruens.
USUS *succi vel pulv. foliorum:* Asthma pituitosum; hypochondriasis; hysteria; physconia abdomin.; vermes.
DOSIS.

HELLEBORUS NIGER. Fibræ radicis.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina; Europ. austr.*
OF. *Melampodium* s. *helleborus niger.* G. *Hellébore.* GE. *Schwarze Niesswurzel.* A. *Black hellebore, or christmass rose.* H. *Helleboro negro.*
QUAL. In principio acri cum mucilaginoso resinoso residens; odor fœtidus, nauseosus; sapor amaricans, acris.
VIRT. *Præcipue recentis:* Drastico-cathartica; diuretica; menagoga; anthelminthica; deobstruens.
USUS *extracti aut decocti (vel melius infusi):* Amenorrhœa; melancholia; mania; morbi cutis;

quartana; physconia abdomin.; hydrops; vermes; psora; achor.

DOS. Drach iij ad ℔j aquæ vel vini infusi. *Pulveris* gran iij-x-xxx.

PRÆP. Tinctura dosi ʒj. Extractum dosi gran x-ʒß bis terve de die.

N. B. Cavendum ne cum radiculis adonidis vernalis, trollii Europæi, actææ spicatæ, astrantiæ majoris et præcipue aconiti napelli confundatur: Priores debiliores; posterior venenata.

HELLEBORUS VIRIDIS. Fibræ radicis.

QUAL. Sapor magis amarus, nauseosus, et acrior helleboro nigro.

VIRT.

USUS.

HERACLEUM SPONDILIUM. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.*

A. *Common cow-parsnep.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis; subaromatica.

VIRT.

USUS.

HERNIARIA GLABRA. Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Annua.*

GA. *Herniaire ou turquette.* A. *Smooth rupture-wort.*

QUAL. Inodora; insipida.

HERNIARIA HIRSUTA.

A. *Hairy rupture-wort.* *Annua.*

VIRT.?

HIBISCUS ABELMOSCHUS. Semen.

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* *Fruticosa; Asiatica.*

OF. *Semen abelmoschi* s. *grana moschata.* G. *Graine de musc; herbe à la poudre de Chypre.* A. *Target-leaved hibiscus.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS Cosmeticus : Tinea.

HIERACIUM PILOSELLA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Herba auriculæ muris.* G. *Mausoerchen.* A. *Mouse-ear hawkweed.*

QUAL. Lactescens; sapor amarus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hernia; diarrhœa; psora; herpes.

HORDEUM DISTICHON. Semen; semen excorticatum; maltum.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Cereale; annuum.*

OF. *Semen hordei : hordeum perlatum : maltum.* G. *Orge.* GE. *Gerste : Gersten-graupen : Malz.* A. *Common barley : barley; pearl-barley : malt.*

QUAL. mucilaginosa; farinacea.

VIRT. *seminis* : Demulcens; emolliens; nutriens. *Malti :* Antiseptica.

USUS *decocti malti :* Scorbutus.

PRÆP. Cerevisia; alcohol; acetum.

HORDEUM VULGARE. Semen.

A. Spring barley.

USUS idem ac prioris.

HUMULUS LUPULUS. Strobuli.
CL. *Dicec.* O. *pentand.* *Perennis.*
OF. *Lupulus.* G. *Houblon.* GE. *Hopfen.* A. *Hops.* H. *Hom recillo.*
QUAL. Odor grate aromaticus, nidorosus; sapor amarus.
VIRT. Narcotica; stomachica.
USUS. Luxatio; alopecia? *Semin.* obstipatio.

HYMENÆA COURBARIL. Resina ex cortice et radice arboris exsudans.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Brasiliensis.*
OF. *Gummi seu resina anime.* A. *Locust-tree.*
QUAL. Subflavescens; pellucida; odor fragrans; sapor resinosus.
VIRT. Nervina.
USUS. Contractura; paralysis.

HYOSCIAMUS ALBUS. Folia; semina.
CL. *Pent.* O. *Monog.* *Annua vel biennis.*
A. *White henbane.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis sed mitior.
USUS *extracti :* Amaurosis; cataracta.

HYOSCIAMUS NIGER. Herba, folia recentia.
CL. & O. *præced.* *In desertis pinquibus.*
OF. *Hyosciamus.* G. *Jusquiame.* GE. *Bilsenkraut*; *Tollkraut.* A. *Black Henbane.* H. *Belenno negro.*

QUAL. Venenata : In principio narcotico residens ; subinsipida ; odor virosus.

VIRT. Narcotica ; sedativa ; antispasmodica ; resolvens.

USUS. Paralysis ; varix ani ; hæmorrhagiæ ab irritatione ; palpitatio ; convulsio ; epilepsia ; mania.

Externe forma cataplasmatis : Scirrhus.

N. B. Loco opii, præcipue ubi obstipatio usum opii contraindicat.

PRÆP. Extractum foliorum.

DOS. Extracti gran ß-ij-XX.

HYPERICUM BACCIFERUM.

——— GUTTIFERUM (RICHARD).

Quidam gummi-resinam, *gummi-gutta* dictam, ex hac planta derivant.

CL. *Polyadelph.* O. *Icosand.* *Cayenn.*

HYPERICUM PERFORATUM. Summitates florentes.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Hypericum.* G. *Millepertuis ordinaire.* G. *Johanniskraut.* A. *Perforated St. John's wort.*

QUAL. Odor graveolens.

VIRT. Resolvens ; anthelminthica.

USUS *infusi* : Tabes pulmonalis ; hæmoptysis ; hæmaturia ; vermes.

HYSSOPUS OFEICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Suffruticosa ; hortensis.*

OF. *Herba hyssopi.* G. *Hyssope.* GE. *Isop.* A. *Common Hyssop.*

QUAL. In oleo volatili cum principio extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leniter stimulans; expectorans; resolvens.

USUS *infusi:* Morbi pulmon. pituitosi; ecchymoma.

J.

JASMINUM OFFICINALE. Flores.

CL. *Diandr.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Jasminum.* G. *Jasmin.* GE. *Jasminblumen.* A. *Common white jasmine.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Narcotica; sedativa.

USUS.

PRÆP. Oleum fragrans infusione paratum.

N. B. Flores nyctanthis et Philadelphi Coronariæ odorem jasmino similem largiuntur.

JATROPHA CURCAS. Semen.

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Americæ meridional.*

OF. *Ricinus major; ficus infernalis.* A. *Angular-leaved physic-nut.*

QUAL. *Seminis*: oleosa. *Corticis seminum*: Venenata.

JATROPHA ELASTICA. Succus lacteus incisione arboris exstillans.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Amer. austr.*

N. B. Plures aliæ arbores similem succum erogant.

NATIVIS *Caout-chouc.*

OF. *Resina elastica.* G. *Gomme* ou *résine élastique.*

USUS ad catheteres, candellas medicatas, et pessaria.

JATROPHA MANIHOT. Radix.

NATIVIS *Jucca; cassavi.* *Amer. austr.*

A. *Eatable rooted physic-nut or cassava (Tapioca).*

QUAL. *Succi radicis:* Venenata: acris; urens. *Radicis siccatæ:* Farinacea.

VIRT. *Rad. recent.* Drastica. *Farinæ:* Nutriens.

N. B. Antidotum hujus veneni est *Capsicum annuum* (CLARKE).

ILEX AQUIFOLIUM. Folia.

CL. *Tetrand.* O. *Tetragyn.* *Fruticosa; Europ. aust. in locis umbrosis, siccis.*

OF. *Agrifolium.* G. *Houx commun ou chêne vert.* GE. *Stechpalme.* A. *Holly.*

QUAL. In principio amaro-adstringente cum mucilagino-resinoso residens: sapor mucilaginoso-amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; antiseptica.

USUS *decocti:* Rigiditas articulorum post podagram remanens? intermittentes rebelles; dyspepsia.

DOSIS *foliorum concisorum:* Unc. j ad libr. aquæ.

ILEX CASSINE Folia.

CL. *et* O. *præc.* *Arborea; Carolin. Virgin. Florid.*

*

Ilex vomitoria (HORT. KEW).

N. B. Hæc planta eadem est ac *Cassine Peragua.* L.

OF. *Folia cassinæ s. apalachines Peragua.* G. *Thé des Apalaches.* A. *Dahoonholly.*

QUAL. Sapor amarus, snbaromaticus.

VIRT. Stomachica, stimulans; expectorans. *Recentium:* Emetica; cathartica.

USUS: Morbi pituitosi pulmonum; diabetes? colica nephritica?

ILLICIUM ANISATUM. Fructus; (semen cum Capsulis.)

CL. *Polyand.* O. *Polyg. Arborea; Asiat. Chinens.*

OF. *Semen anisi stellati; badian.* G. *Anis de la Chine.* GE. *Sternanis.* A. *Indian anise.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor aromatico-dulcis instar anisi.

VIRT. Stomachica; carminativa; expectorans.

USUS *pulveris vel infusi:* Morbi pulmonum atonici.

N. B. Semen infuso Theæ additum, idem magis gratum stomacho reddit.

DOS. *pulv.* gran. xxx. *Infusi:* drach. j ad libr. j aquæ.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn. Perenn. alpin. Europ. aust.*

OF. *Imperatoria.* G. *Impératoire.* GE. *Meisterwurzel.* A. *Common masterwort.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili et principio resinoso residens; odor fragrans; sapor amaro-acris, aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; sialagoga.

USUS. Amenorrhœa atonica; dyspepsia; colica flatulenta; paralysis; intermittentes; serpigo; sterilitas?

DOSIS *puveris* : Gran. X-XXX.

INDIGOFERA TINCTORIA. Fecula.

CL. *Diadelph.* O. *Decandr.* *Frutic.; Ind. & Afric.*

OF. *Indigo.*

QUAL. Cærulea; tinctoria.

VIRT. Phthiriaca.

USUS. Diarrhœa; lochia nimia?

INULA DYSENTERICA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in fossis siccatis.*

OF. *Herba conyzæ.* A. *Meadow Inula, or middle Fleabane.*

QUAL. Odor debilis; sapor subacris.

VIRT?

USUS. Dysenteria; psora.

INULA HELENIUM. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Enula campana* s. *helenium.* G. *Inula campana; aunée.* GE. *Alantwurzel.* A *Common inula or elecampane.* H. *Ala.*

QUAL. Præstans : In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Stimulans, angelicam æmulans; expectorans; stomachica, alterans; anthelminthica.

USUS *pulveris & tincturæ :* Dyspepsia; cachexiæ; tussis; asthma pituitosum; physconia abdominis; psora; hæmorrhoides mucosæ.

DOSIS. Drachm. semis-unam.

PRÆP. Tinctura; conditum; extractum.

IRIS FLORENTINA. Radix.

CL. *Triand* O. *Monog.* *Perennis; Italiæ.*

OF. *Iris Florentina.* G. *Iris de Florence.* GE. *Violenwurzel.* A. *Florence orrice.* H. *Lirio de Florencia.*

QUAL. In acri corrosivo residens, siccatione avolans; odor fragrans instar violæ. *Radicis recentis:* sapor acris, amaricans.

VIRT. *recentis :* Cathartica; diuretica; expectorans; errhina.

USUS.

DOSIS.

IRIS FŒTIDA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Spathula fœtida* s. *xyris.* G. *Glayeux puant.* A. *Stincking itis, or gladwyn.*

QUAL. Eximia: Nigra; odor fœtidus, teter; sapor acris, ingratus.

VIRT. Deobstruens; diuretica; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS. Hysteria; scrophula; hydrops.

DOSIS. ʒß.

IRIS GERMANICA. Radix recens.

CL. *et* O. *præc.* *Perennis in sylvis.*

OF. *Iris nostras.* G. *Flambe ; fleur de lys.* GE. *Blaue schwertel lilien.* A. *German iris or flower de luce.* H. *Lirio de alemania.*

QUAL. *Radicis recentis :* In acri volatili residens; sapor acris, amarus, nauseosus. *Siccatæ :* farinacea.

VIRT. *Recentis :* Subemetica ; diuretica ; errhina ; expectorans ; menagoga.

IRIS PSEUD-ACORUS. Radix; succus radicis expressus.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis ; ad littora fluviorum et lacuum.*

OF. *Acorus palustris ; pseudoacorus ; iris palustris ; gladiolus luteus.* G. *Iris ; gladiole des marais.* GE. *Gelbe schwertelwurzel ; falscher kalmus ; wasserschwertel ; drachenwurzel ; gelbe lilien.* A. *Yellow iris ; water flag ; or flower de luce.* H. *Lirio espadannal.*

QUAL. *Recentis :* Inodora ; sapor acris, substypticus.

VIRT. *Succi :* Diuretica. *Radicis :* adstringens.

USUS. Hydrops ; stomacace.

DOSIS *succi :* Drach. j ad unc. semis.

IRIS TUBEROSA. Radix.

CL. *et* O. *præced.* *Syriæ ; Arab.*

An radix Hermodactili officinalis ?

QUAL. Inodora ; acris, dulcescens.

VIRT. Cathartica ; alterans.

USUS. Amaurosis; arthrodynia rheumatica.

DOS. Drach. ij.

JUGLANS REGIA. Cortex viridis fructus immaturi; putamen et dissepimentum nucum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Arborea.*

OF. *Nuces juglandes immaturæ.* G. *Ecorce verte des noix.* GE. *Unreiffe wallnüsse.* A. *Common walnut-tree; green walnuts.* G. *Brout des noix.*

QUAL. *Corticis et putaminis:* Odor graveolens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; anthelminthica.

USUS *decocti:* Syphilis inveterata; morbi cutanei varii.

DOSIS. Libr. j ad libr. xx aquæ ad colat. libr. x, cujus libr. j—ij de die.

PRÆP. Extractum drach. semis—j vermes infantum: angina; ulcera oris.

JUNIPERUS COMMUNIS. Baccæ; lignum.

CL. *Diœc.* O. *Monadelph.*

OF. *Juniperus* G. *Genevrier ordinaire.* GE. *Wachholder Beeren, holz.* A. *Common juniper wood; juniper-berries.*

N. B. Gummi-resinam, *Sandaracam* dictam, non ex Junipero ut hactenus vulgo assertum fuit, sed ex Thuya provenire nuper didicimus. *Vide* Thuya articulata.

QUAL. *Baccarum:* In oleo volatili copioso, et principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromatico-dulcis. — *Ligni:* Eadem, sed debilior.

VIRT. *Baccarum, ligni et resinæ:* Stimulans; diuretica; alterans; carminativa. *Decocti et extracti:* Minus stimulans; magis diuretica.

USUS *decocti aliorumque præparatorum* : Cophosis? hydrops; asthma; catarrhus; morbi cutis. *Olei* : vermes.

DOSIS *pulv.* Drach. semis. — In infuso drach. iij—iv ad libr. j. aquæ vel vini.

PRÆP. *Ligni et baccarum* : Decoctum; infusum. *Baccarum* : Extractum; rob; aqua stillatitia; oleum volatile; alcohol.

JUNIPERUS LYCIA.
——————THURIFERA. } Gummi resina.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; littoris merid. et orient. maris rubri.*

N. B. Dubium est an gummi-resina, *Thus* seu *Olibanum* dicta, ex *Junipero*, aut potius, ut FOERSKAL asserit, ex *Amyridis* specie aut ex ambobus proveniat.

Vid. Amyris kataf.

JUNIPERUS SABINA. Folia.

VARIET. A. cupressifolia.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa; hortensis.*

OF. *Sabina.* G. *Sabine.* GE. *Sevenbaum; sadebaum.* A. *Common savin.* H. *Enebrio sabina.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili copioso residens; odor hircosus; sapor acris; amaricans.

VIRT. Stimulans; corrodens; menagoga; antispasmodica; diuretica; depilans; anthelminthica.

USUS *internus* : Amenorrhœa atonica. *Externus forma pulveris, decocti, infusi, aut cataplas-*

matis : Caries; tinea; psora; ulcera fungosa; verrucæ; condylomata; odontalgia.

DOSIS *pulveris :* Gr. v—xv.

PRÆP. Aqua stillatatia; oleum volatile; extractum.

K.

KAEMPFERIA ROTUNDA. Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Zedoaria.* G. *Zédoire.* GE. *Zittwerwurzel.* A. *Zedoary.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor subfragrans; sapor subacris, amaricans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; anthelminthica.

USUS *pulveris (præcipue zeylonici) :* Dyspepsia, pyrosis; febres intermittentes, atonicæ; vermes; cardialgia podagrica; podagra aberrans.

DOSIS Scrup. j. per se vel cum lacte.

PRÆP. Aqua stillatitia; alcohol; tinctura.

KAJEPUT OLEUM.

Vide Melaleuca leucadendron.

KIKEKUNEMALO.

Vide Gummi-resina kikekunemalo.

KINO.

Vide Gummi-resina kino.

L.

LABRADIA PRURIENS. } Pubes leguminis
———— URENS. } rigida.

N. B. PAIVA ex autopsia ad hoc novum genus refert *Dolichum prurientem et urentem* LINN.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS. Drach. j—iv cum syrupo aut mucilagine.

LACTUCA SATIVA. Herba; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*

G. *Laitue ordinaire.* A. *Garden lettuce.*

USUS. Culinaris.

LACTUCA VIROSA. } Herba; succus.
———— SCARIOLA. }

OF. *Lactuca sylvestris.* G. *Laitue vireuse.* GE. *Wilder lattich.* A. *Strong scented lettuce.* H. *Lechuga hedion da y ponzonnosa.*

N. B. In locis palludosis colligenda.

QUAL. In succo lacteo acri residens; odor teter; sapor acris, amarus.

VIRT. Sedativa; diuretica.

USUS. Hydrops; icterus.

DOSIS *succi* ad mellis consistentiam inspissati, vulgo *extractum* dicti, drach. j—iv de die.

LAGOECIA CUMINOIDES. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; insul. Græc.*

OF. *Ammi veterum.* A. *Wild cumin.*

QUAL. Præstans: Sapor aromaticus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

*

LAMIUM ALBUM. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Annua.*

OF. *Lamium album; urtica mortua: galeopsis.* GE. *Weisse taube nesseln.* A. *White archangel nettle or dead-nettle.*

QUAL. Oleracea; odor teter.

LASERPITIUM LATIFOLIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis, alpina: in locis siccis.*

OF. *Gentiana alba.* GE *Weisse enzianwurzel.* A. *Broadleaved lasserwort.* H. *Laserpitio de hoja ancha.*

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, acris, amarus.

VIRT. Stomachica; stimulans; diuretica.

LASERPITIUM SILER. Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Alpina: in locis siccis.*

OF. *Siler montanum.* GE. *Rossk ümmel.* A. *Mountain lasserwort.*

QUAL. Aromatica; cumini odore et sapore remissiore.

VIRT. Carminativa stomachicha.

USUS. Colica lochialis.

LATHRAEA SQUAMMARIA. Radix.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis: in locis nemorosis, umbrosis.*

OF. *Dentaria major.*

QUAL.

VIRT?

LAURUS CAMPHORA. Substantia resinosa volatilis, *Camphora* dicta; præcipue ex ramis arboris sublimatione parata.

CL. *Enneand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Camphora.* G. *Camphre.* GE. *Kampfer.* A. *Camphire-tree.* H. *Canfor.*

QUAL. Heroica: in principio volatili residens; odor fragrantissimus; sapor acris, aromaticus, amaricans; simul cum sensu frigoris.

VIRT. Nervina; antispasmodica; antiseptica; anthelminthica; resolvens.

USUS *internus:* Febres, et exanthemata atonica; cardialgia; hysteria; mania; nymphomania; satyriasis; (*cum sulphure*) colica pictonum. *Externus:* Arthrodynia rheumatica; ophthalmia; grangræna; ulcus fungosum; morsura insectorum; colica spasmodica.

DOSIS. Cum saccharo trita aut mucilagine vel alcohole subacta; gr. v gr. xv bis terve de die, ascendendo ad drach. ij.

PRÆP. Alcohol camphoratum; æther camphoratus; acetum camphorat.; acidum nitricum camphoratum, seu solutio camphoræ nitrica; oleum camphorat. unguentum camphoratum.

An opium est antidotum camphoræ?

N. B. An oleum volatile camphoræ Javæ, Suma-

træ, etc. in arthrodynia arthritica et rheumatica adeo celebre ex eadem arbore provenit?

LAURUS CASSIA. Cortex; flores.

Varietas Lauri cinnamomi. (THUNBERG).

OF. *Flores cassiæ; calyces cassiæ; cassia cinnamomea; cortex cinnamomi indici; folia malabathri; cassia lignea; xylocassia.* GE. *Mutterzimmt.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus; debilior sequente.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Paralysis linguæ.

N. B. Flores supplere possunt corticem cinnamomi.

PRÆP. Oleum volatile.

LAURUS CINNAMOMUM. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Zeylonica.*

OF. *Cinnamomum verum* s. *acutum.* G. *Canelle.* GE. *Zimmt.* A. *Cinnamom-tree.*

QUAL. Heroica: in oleo volatili residens; odor intense fragrans; sapor dulcis, dein subacris, aromaticus, gratus.

VIRT. Cardiaca; stimulans; calefaciens; roborans; antispasmodica; stomachica; carminativa; aphrodisiaca.

USUS Dyspepsia; anaphrodisia; morbi atonici.

DOS. *pulveris:* Gr. x-xxx.

PRÆP. Infusum aquosum vel vinosum frigidum; aqua; alcohol; tinctura; oleum volatile.

LAURUS CULILAWAN. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Amboin. & insul. Molucc.*

OF. *Cortex culilawan ; caryophiloides.*

QUAL. Præstans : sapor aromaticus, caryophillum aromaticum æmulans, mucilaginosus, subadstringens.

VIRT. Calefaciens; roborans; carminativa; stomachica.

USUS. Paralysis; colica flatulenta; dyspepsia.

LAURUS MYRRHA. (LOUVEIRO). Cortex ; gummi-resina.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; China, Cochinchina.*

An gummi-resina myrrha ex hac arbore?

LAURUS NOBILIS. Folia ; Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Europ. austr.*

OF. *Laurus.* G. *Laurier : baïes de laurier.* GE. *Lorbeerbaum : lorbeerbeeren.* A. *Common sweet bay.* H. *Laurel noble.*

QUAL. Præstans : In oleo volatili cum oleo fixo mixto residens ; sapor aromaticus, subacris, amaricans.

VIRT. Calefaciens ; stomachica ; carminativa ; resolvens ; phthiriaca.

USUS *In- & externus :* Amenorrhœa ; dyspepsia ; chlorosis ; hysteria ; colica lochialis. *Olei :* Tumores frigidi ; psora ; pediculi.

PRÆP. Oleum laurinum.

LAURUS PECURIM ? (BERGIUS). Fructus.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Brasiliæ.*

OF. *An faba pechurim ex hac arbore?*

QUAL. In oleo volatili cum oleo unguinoso mixto residens; odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; subastringens.

USUS. Sub finem dysenteriæ; diarrhœa, tormina ventris.

DOS. *pulveris*: Gr. x cum saccharo.

LAURUS SASSAFRAS. Radix; cortex radicis.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Virginiæ.*

OF. G. GE. *Sassafras.* A. *Sassafras-tree.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, subdulcis.

VIRT Stimulans; diuretica; sudorifica.

USUS *decocti vel infusi*: Cachexiæ; Syphilis? Arthrodynia arthritica et rheumatica; psora.

PRÆP. Oleum volatile.

LAVANDULA SPICA. Flores.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; Europ. austr.; hort.*

OF. *Lavendula.* G. *Lavande.* GE. *Lavendel.* A. *Common lavender.* H. *Espliego; alhucenna.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Paralysis; aphonia; balbuties.

PRÆP. Oleum volatile; aqua; alcohol; tinctura lavandulæ composita Ph. Lond.

LAVANDULA STŒCHAS. Flores.

CL. *et* O. *præced.* *Suffruticosa : Europ. austr.*

OF. *Stœchas Arabica s. stœchas spica* A. *French lavender.*

QUAL. Fragrans, præcedenti graveolentior.

LAWSONIA INERMIS. Radix.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Orientalis.*

OF. *Alcanna vera s. orientalis* A. *Smooth lawsania.*

QUAL. Tinctoria : Radix rubra, folia lutea.

LEDUM PALUSTRE. Folia cum floribus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa : in locis humidis, nemorosis.*

OF. *Rosmarinus sylvestris.* G. *Lede ou romarin sauvage.* GE. *Post ; porsch ; wilder rosmarin ; wanzenkraut.* A. *Hillrose ; bohemian rosemary or marsh-ledum.*

QUAL. Heroica : in oleo narcotico cum extractivo amaro-adstringente residens ; odor nidorosus ; sapor amaricans, adstringens.

VIRT. Narcotica ; sudorifica ; phthiriaca.

USUS *infusi* : Lepra ; psora ; tinea ; pertussis ; insecta.

DOSIS. Unc. semis—j ad libr. j aquæ, lactis, vel seri lactis infusi per horam, cujus libra semis-una de die sumenda.

LEONURUS CARDIACA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis.*

OF. *Cardiaca.* A. *Common motherwort.*

QUAL. Amara.

USUS. Hysteria.

*

LEONTODON TARAXACUM. Radix.

CL: *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Taraxacum; dens leonis.* G. *Pissenlit: dent de lion.* GE. *Pfaffenrœhrlein; lœwenzahn.* A. *Common dandelion.* H. *Amargon.*

QUAL. In succo lactescente, amaro, salso residens.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS. *Decocti vel extracti radicis:* Physconia abdomin.; icterus; quartanæ rebelles.

DOSIS. Unc. ij—iij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Succus recens expressus; extractum.

LEPIDIUM IBERIS. Herba.

CL. *Tetradyn.* O. *Silicul.* *Annua; Europ. austr.*

QUAL. Sapor acris.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS. Febres intermittentes; cachexiæ.

LEPIDIUM SATIVUM. Herba recens.

OF. *Nasturtium hortense.* G. *Cresson alenois; passerage.* GE. *Gartenkresse.* A. *Garden cresses.* H. *Nastuerzo.*

QUAL. *Herbæ et seminum:* In principio acri leniori residens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; hydrops; achor.

LEUCOIUM VERNUM, aliæque species.

CL. *Hexand.* O. *Monog.*

OF. *Lunaria major; viola lunaris; leucoium lunatum; bulbonach.* G. *Lunaire; perce-neige.* GE. *Knotenblume; Schneetrœpfchen.* A. *Snowdrop.*

QUAL. Mucilaginosa.

LICHEN APHTHOSUS.

CL. *Cryptog.* O. *Algæ.*
OF. *Muscus cumatilis.*
QUAL. Tetra, mephitica.
VIRT. Cathartica; anthelminthica.
USUS *infusi vel decocti :* Vermes; aphtha.
DOS. *Pulveris* infantibus gr. xij mane et vesperi.

LICHEN CANINUS.

OF. *Herba musci canini.* A. *Ground-liverwort.*
QUAL. Tetra, mephitica.
VIRT. Alterans.
USUS. Hydrophobia? Mania; asthma convulsivum (BUTTER).

LICHEN COCCIFERUS.

CL. & O. *præced.*

Ad radices arborum in sylvis pineis.

OF. *Muscus pyxidatus; herba ignis.* GE. *Bechermoos; fiebermoos; feuerkraut.* A. *Cup-moss.*
QUAL. Sapor Substypticus.
VIRT. Subadstringens.
USUS. Pertussis?

LICHEN ISLANDICUS.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina; in locis siccis, petrosis, nemorosis.*
OF. *Muscus Islandicus.* G. *Islændisches moos.* A. *Iceland-lichen or liverwort.*
QUAL. Præstans : amara, subadstringens, mucilaginosa.
N. B. Amarities coctione et siccitate multum minuitur.

VIRT. Nutriens; eccoprotica.
USUS. Tabes; hæmoptysis; tussis.
DOS. Unc. ß ad ℔j; aquæ vel lactis decoct. ad ℔j.

LICHEN PLICATUS.

OF. *Musci arborei seu quercini herba.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Hæmorrhagiæ.

LICHEN PULMONARIUS.

OF. *Herba pulmonariæ arboreæ.* GE. *Lungenmoos.*
QUAL. Sapor amarus, salsus.
VIRT.
USUS. Tussis; icterus.

LICHEN ROCCELLA.

CL. & O. *præced.* *Insular. archipel & Canariens.*
OF. *Roccellæ herba.* G. *Orseille.*
QUAL. Subsalsa, subacris; tinctoria rubra.
VIRT.
USUS. Tinctorius.
PRÆP. Pigmentum vulgo *Lacmus* dictum.

LIGNUM ALOES. *Vide* Aloëxylum.

SIN. *Lignum agallochi* s. *Aspalathi* s. *Calambac.*

LIGUSTICUM LEVISTICUM. Radix; Semen; herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina.*
OF. *Ligusticum; levisticum.* G. *Liveches; semences d'ache.* GE. *Liebstœckel.* A. *Common lovage.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus, acris, calidus, angelicam archangelicam æmulans. *Semina* urinam nigro colore inficiunt.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; lactifera.

USUS.

LILIUM CANDIDUM. Radix; petala recentia.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Radix & flores lilii albi.* G. *Lys.* GE. *Weisse lilien.* A. *Common white lily.*

QUAL. *Petalorum recentium:* Odor fragrans. *Radicis:* sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS.

LINNÆA BOREALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; Europ. septentr.*

A. *Two flowered Linnæa.*

QUAL. *Floris:* Odor fragrans. *Herbæ:* Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. subadstringens; Diuretica.

USUS *infusi* in lacte vel aqua: Arthrodynia rheumatica; psora.

LINUM CATHARTICUM. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Pentag.* *Annua.*

GF. *Linum catharticum.* G. *Lin purgatif.* GE. *Purgier flachs.* A. *purging flax.*

QUAL. Sapor subsalsus, amaricans, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Hydrops; nephritis.

DOS. Drach. ij herbæ siccatæ ad ℔ j aquæ pro infuso.

LINUM USITATISSIMUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Semen lini.* G. *Grains de lin.* GE. *Leinsaamen; flachssaamen.* A. *Common flax; linseed.* H. *Laxor.*

QUAL. Mucilaginosa; oleosa.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti vel infusi:* Dysuria; nephritis; blennorrhagia; *forma enematis:* tenesmus. *Farinæ* forma cataplasmatis: cynanche; phlegmone.

PRÆP. Oleum fixum expressione frigida paratum.

DOS. Seminum unc. ß-j ad ℔ ij aquæ.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Balsamum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Arborea; Virgin. Mexic.*

OF. *Storax; styrax liquida.* A. *Mapple-leaved liquid amber, or sweet gum.*

QUAL. Liquido-tenax; coloris grisei; odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS *externus:* Paralysis; psora.

LITHOSPERMUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lithospermum; milium solis.* G. *Gremil; herbe aux perles.* GE. *Meerlirs; steinhirse; perlkrautsaamen.* A. *Officinal gromwell.*

QUAL. Insipida; inodora.

LIRIODENDRON TULIPIFERA. Cortex.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea; Amer. septentr.*

OF. *Cortex loriodendri.* A. *Common tulip-tree.*

QUAL.

VIRT.

USUS in America frequens, loco Cinchonæ officinalis : intermittentes.

LOBELLIA SYPHILITICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Monog.* *Perennis; Virginiæ.*

OF. *Lobelia.* G. *Cardinal bleu.* A. *Blue lobelia, or cardinal flower.*

QUAL. Lactescens ; acris ; nauseosa.

VIRT. Emetica ; drastico-cathartica.

USUS *decocti :* Syphilis ?

DOS. Unc. semis ad aquæ libr. xij coquendo ad libr. viij.

LOBELIA LONGIFLORA. }
——— TUPA. } Radix.

QUAL. Acriores præcedenti.

LONICERA DIERVILLA. Stipites.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Canadensis.*

OF. *Diervilla.* A. *Yellow flowered upright honeysuckle.*

QUAL. Odor et sapor nauseosus.

VIRT.

USUS *Canadensium :* Syphilis ; blennorrhagia ; dysuria.

*

LONICERA PERICLYMENUM. Herba; stipites et flores.

OF. *Caprifolium.* A. *Common wood-bine or honey-suckle.*

QUAL. Odor et sapor ingratus.
VIRT. ?
USUS.

LONICERA SYMPHORICARPOS. Stipites. *Fruticosa; Carolinæ.*

A. *Shrubby St. Peters-wort.*

QUAL. Styptica.
VIRT. Subadstringens.
USUS. Intermittentes ?

LUPINUS ALBUS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen lupini.* G. *Lupin.* GE. *Feigbohnen.* A. *White lupin.*

QUAL. Farinacea; amara.
VIRT. Cosmetica ?
USUS. Vermes.

LYCOPERDON BOVISTA.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi.*

OF *Bovista: crepitus lupi.*
QUAL. Præstans: Styptica.
VIRT. Adstringens; obstipans.
USUS. Hæmorrhagiæ; hæmorrhois; ulcera; intertrigo.

LYCOPERDON TUBER.

G. *Truffle.*
QUAL. Odor hircinus.
VIRT. Aphrodisiaca ?
USUS. Culinaris : anaphrodisia.

LYCOPODIUM CLAVATUM. Pollen.

CL. *Cryptog.* O. *Musci.* *In Sylvis.*
OF. *Semen lycopodii ; muscus clavatus.* A. *Common club-moss.*
QUAL.
VIRT. Exsiccans.
USUS. Excoriatura : ad inspergendas pillulas, bolos.

LYCOPODIUM SELAGO.

OF. *Muscus erectus.* A. *Fir club-moss.*
VIRT. Drastico-cathartica ; menagoga ; phthiriaca.
USUS. Hydrops ; pediculi.

LYSIMACHIA NUMMULARIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis ; in locis humidis, umbrosis, nemorosis.*
OF. *Herba nummulariæ.* A. *Creeping loose-strife, or money-wort.*
QUAL. Subacida, subacris.
VIRT. Subadstringens.
USUS. Leucorrhœa.

LYTHRUM SALICARIA. Folia ; radix.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.* *Perennis ; in locis aquaticis.*

OF. *Salicaria* s. *lysimachia purpurea.* GE. *Rother Weiderich.* A. *Common or purple willow herb.*

QUAL. Prætans : Substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria atonica; leucorrhœa; hæmoptysis.

M.

MALVA ALCEA. Fores.

A. *Vervain mallow.*

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* *In alpibus ad Sylvas.*

MALVA ROTUNDIFOLIA. } Herba; radix.
——— SYLVESTRIS. }

Annua; ad muros & edificia.

OF. *Malva vulgaris* s. *alcea.* G. *Mauve.* GE. *Pappeln.* A. *Round-leaved or dwarf mallow.*

QUAL. Præstans : Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; demulcens; laxans.

USUS. Phlegmone; stranguria; tussis.

MARANTA GALANGA Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Galanga major & minor.* G. *Galanga officinal.* GE. *Galgantwurzel.* A. *Galangel.*

QUAL. Præstans: In principio resinoso magis quam in oleo volatili residens; odor fragrans; sapor amaricans, acris, aromaticus, zingibere magis pungens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; menagoga. *Recent.* errhina.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; colica flatulenta, et lochialis; vomitus navigantium? Singultus; vertigo; *exteru.* herpes.

DOSIS. Gr. x-xv.

PRÆP. Tinctura.

MARRUBIUM VULGARE. Succus recens; herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; ad vias et deserta.*

OF. *Marrubium album.* G. *Marrube blanc.* GE. *Weisser andorn; marienuessel.* A. *Common white hoarhound.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor subamarus, subsalsus, ingratus.

VIRT. Expectorans; menagoga; anthelminthica.

USUS. Asthma pituitosum; icterus; chlorosis; physconia abdominal.; ptyalismus ex hydragyro?

MATRICARIA CHAMOMILLA. Flores.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Chamomilla vulgaris* s. *nostras* s. *Chamemœlum vulgare.* G. *Camomille.* GE. *Kamillen-blumen.* A. *Corn feverfew.*

QUAL. In oleo volatili et principio extractivo amaro residens; odor fragrans, ingratus; sapor amarus.

VIRT. Leviter stimulans; antispasmodica.

USUS. Dyspepsia; vomitus gravidarum? cardialgia;

Dysenteria; colica spasmodica; febres intermittentes; hysteria; dysuria? Forma balnei, enematis, cataplasmatis, infusi, pulveris.

DOS. *pulveris:* Drach. ß-j. In infuso drach. ij-iij ad ℔ j aquæ.

PRÆP. Aqua; oleum volatile; syrupus.

MATRICARIA PARTHENIUM. Herba; Flores.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis incultis.*

OF. *Matricaria.* G. *Matricaire.* GE. *Mutterkraut.* A. *Common feverfew.*

QUAL. Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica; menagoga; lactifuga.

USUS *externus* forma balnei, enematis, cataplasmatis. *Internus:* colica; hysteria; dyspepsia.

MELALEUCA LEUCADENDRON. Oleum volatile ex foliis destillatione obtentum.

CL. *Polyadelph.* O. *Polyand.* *Arborea; insul. Sumatræ & nov. Caledoniæ.*

NATIVIS *cajoput dictum ex* cajo *arbor, et* puti *alba; id est, arbor epidermide alba notatus.*

OF. *Oleum cajeput.* G. *L'huile de cajeput.* GE. *Cajeputoel.* A. *Cajeput-oil.*

QUAL. Odor intense fragrans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; carminativa; menagoga; insecta fugans.

USUS *intern.* Cardialgia sputatoria; colica flatulenta; spasmi; paralysis. *Extern.* Anaphrodisia? Varix ani; odontalgia; paralysis linguæ.

DOS. Gutt. iij-x. Sæpius de die cum saccharo.

MELISSA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; Canariensis; hortensis.*

OF. *Melissa citrata* s. *hortensis.* G. *Mélisse; citronelle-mélisse.* GE. *Zitronen-melisse.* A. *Common balm.*

QUAL. In oleo volatili residens; fragrans odore citri; sapor aromaticus.

VIRT. Leviter stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga.

USUS *infusi:* Hysteria; palpitatio; chlorosis; amenorrhœa.

PRÆP. Infusum; aqua; alcohol; oleum volatile.

MELISSA CALAMINTHA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*

OF. *Calamintha montana.* GE. *Bergmünze.* G. *Calamen des montagnes.* A. *Mountain balm or calamint.*

QUAL. Odor debilior præcedent. sapor leviter aromaticus.

VIRT. Stomachica; expectorans; resolvens.

USUS Asthma.

MELITTIS MELISSOPHYLLUM. Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Melissophyllum.* G. *Mélisse batarde.* A. *Bastard balm.*

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor subamarus.
USUS *infusi* : Amenorrhœa; nephritis?

MENISPERMUM COCCULUS. Fructus, seu nux.
CL. *Diœc. O. Dodecand.* *Sarmentosa; Ind. orient.*
OF. *Cocculus indicus; semen cocculi.* G. *Coques du Levant.* GE. *Kokkelkœrner, Fischtollkœrner.* A. *Indian cockles; Indian berries.* H. *Coca de Levante.*
QUAL. Venenata; sapor summe amarus, urens.
VIRT. Narcotica; phthiriaca.
USUS. Ad necandos pisces, pediculos.

MENTHA AURICULARIS. Herba.
CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Ind. orient.*
QUAL. Fragrans; amara.
VIRT. Resolvens.
USUS. Cophosis; tumores.

MENTHA CERVINA. Herba.
CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*
N. B. Floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus.
A. *Hyssop-leaved mint.*
QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, gratior pulegio.

MENTHA CRISPA. Folia; herba.
CL. & O. *præced.* *Perennis; hortensis.*
OF. Mentha crispa. G. *Menthe frisée.* GE. *Krausmünze.* A. *Curled mint.* H. *Menta rizada.*

QUAL. In oleo volatili residens : Odor fragrans; sapor aromatico-amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; antaphrodisiaca; resolvens.

USUS. Cephalalgia; hysteria; anorexia; vomitus; colica; pertussis; satyriasis. *Externus :* Dolor artuum a spasmo; coagulum lactis in mammis; ecchymoma; tumores frigidi.

DOS. *infusi :* Unc. j. ad ℔ j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua; conserva; syrupus.

MENTHA PIPERITA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Angliæ; hortensis.*

OF. *Mentha piperitis.* G. *Menthe poivrée.* GE. *Pfeffermünze.* A. *Peppermint.* H. *Menta piperita.*

QUAL. Eximia : In oleo volatili camphorino residens : Odor fragrans; sapor acris, aromaticus cum sensu frigoris.

VIRT. Eadem ac præcedentis, sed fortior.

USUS. Idem ac præcedentis.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua.

MENTHA PULEGIUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Pulegium.* G. *Menthe pouliot.* GE. *Poley.* A. *penny-royal mint.* H. *Poleo.*

QUAL. In oleo volatili residens; eadem ac menthæ crispæ sed acrior.

VIRT. Eadem ac menthæ crispæ.

USUS. Spasmi durante menstruatione; tussis; raucedo.

MENTHA SATIVA.

A. *Marsh mint.*

MENTHA SYLVESTRIS. Herba.

OF. *Menthastrum; mentha longifolia.* A *Horse mint.*

MENTHA VIRIDIS. Herba.

N. B. Spicis oblongis; foliis lanceolatis, nudis, serratis, sessilibus; staminibus corolla longioribus.

OF. *Mentha spicata.* G. *Baume verte.* A. *Spearmint.*

QUAL. Eadem ac menthæ crispæ sed gratior.

MENYANTHES TRIFOLIATA. Folia.

CL. *Pentand. O. Monog. Perennis; in locis humidis, paludosis.*

OF. *Trifolium fibrinum* s. *aquaticum* s. *palustre* s. *paludosum.* G. *Trefle de marais.* GE. *Bitterklee; fieberklee.* A. *Common buck-bean or marsh-trefoil;* H. *Menyanthes de tres en rama.*

QUAL. In principio extractivo amaro residens; sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Adstringens; roborans; anthelminthica; diuretica; deobstruens.

USUS *infusi, vel extracti :* Dyspepsia; chlorosis; leucophlegmatia; physconia abdomin.; icterus; asthma; arthrodynia; podagra atonica; intermittentes; scorbutus; lepra; herpes; ulcus malignum.

DOSIS *infusi :* Unc j ad libram j aquæ.

PRÆP. Extractum : Dosidrach. ij.

MERCURIALIS ANNUA. Herba.
CL. *Diœc. O. Enneand.*
OF. *Mercurialis.* G. *Mercurial.*
QUAL. Suspecta.
VIRT. Cathartica; hypnotica; repellens; cosmetica.
USUS. Decocti pro clysmatibus; syphilis?

MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM. Herba.
CL. *Icosand. O. Pentag.* *Annua.*
A. *Annual mercury or dramond fig marygold or ice-plant.*
QUAL. Sapor blande salinus, refrigerans.
USUS *succi*: Dolor spasmodicus vesicæ urinariæ; dysuria; ischuria; calculus; pertussis.
DOS. Unc. j - jß ad ℔ j aquæ in decocto.

MESPILUS GERMANICUS. Fructus.
CL. *Icosand. O. Pentag.* *Arborea.*
OF. *Mespilus.* A. *Narrow & broad leaved dutch medlar.*
QUAL. Styptico-farinosa.
VIRT. Dulcis; subadstringens.
USUS.

MIMOSA CATECHU. Succus extractivo-seu gummi-resinosus, decoctione ligni et inspissatione obtentus.
CL. *Polyg. O. Monœc.* *Arborea; Ind. orient. provinciæ Bahar.*
OF. *Catechu s. terra Japonica.* G. *Cachou.* GE. *Katechu; kaschu.* A. *Catechu; Japan-earth.*

QUAL. In principio extractivo resinoso adstringente residens; sapor subamarus, postea dulcescens, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *pulveris vel tincturæ*: Diarrhœa; dysenteria atonica; hæmorrhœa. *Externus*: Ulcus laxum; relaxatio uvulæ et gingivarum; defluxio acris catarrhalis.

DOS. *pulv.* gr. x-xxx-drachm j.

PRÆP. Tinctura, in aqua et alcohole fere æque solubilis.

MIMOSA NILOTICA. } Gummi; et succus
——— SENEGAL. } fructus immaturi expressus et inspissatus.

OF. *Gummi arabicum : succus acaciæ veræ seu Ægyptiacæ inspissatus.* G. *Gomme arabique.* GE. *Arabischer gummi.* A. *Gum arabic; gum senegal: Ægyptian & Senegal mimosa.*

QUAL. *Gummi* : Mucilaginosa; dulcis; nutriens. *Succi inspissati in aqua solubilis* : Styptica.

VIRT. *Gummi* : Involvens. *Succi* : Roborans; adstringens.

USUS *gummi internus* in solutione aquosa : Dysuria; dysenteria; paraphonia catarrhalis; ophthalmia.

MOMORDICA ELATERIUM. Radix; fructus recens; succus ejusdem extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Monœc.* O. *Syng.* *Europ. austr.; annua; hortensis, agrestis.*

OF. *Elaterium* s. *cucumis asininus.* G. *Momordique sans vrilles; concombre sauvage.* GE. *Esselsgurken; springgurken.* A. *Squirting momordica or cucumber.*

QUAL. Utriusque: Sapor intense amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; menagoga; diuretica.

USUS. Obstipatio; hydrops; amenorrhœa; scrophula?

DOS. Radicis gr. XV-XXX.

PRÆP. Succus inspissatus, vulgo *Elaterium* dictus, dosi gr. I-IV.

MONARDA FISTULOSA. Folia.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; Canadensis.*

OF. *Herba monardæ.* A. *Purple monarda.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Nervina; stomachica; deobstruens.

USUS *infusi:* Febres intermittentes.

MORUS NIGRA. Fructus recens; folia; cortex.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* *Arborea; Europ. austr. hortensis.*

OF. *Fructus mori recentis.* G. *Maulbeeren.* A. *Common mulberry-tree.*

QUAL. *Fructus:* Sapor dulcis, subacidus. *Foliorum:* Stypticus.

VIRT. Refrigerans. *Folior:* Adstringens.

USUS. Febres. *Corticis* : Tænia.
PRÆP. Rob; syrupus.

MYRICA GALE. folia.
CL. *Diœc.* O. *Tetrand.* *Fruticosa ; paludosa ; Europ. austr.*
OF. *Myrtus Brabantica.* G. *Piment royal.* GE. *Myrten.* A. *Sweet gale willow ; or candle berry myrtle.*
QUAL. Luteo-tinctoria ; odor nidorosus ; sapor amarus.
VIRT. Narcotica.
USUS. Psora; pediculi.

MYRISTICA AROMATICA. (SWARTZ). Nux seu fructus; nucleus; integumentum nuclei reticulare vulgo *Macis* dictum.
CL. *Monœc.* O. *Monand.* *Arborea ; insul. Bandæ.*
Myristica moschata. (THUNBERG).
Myristica officinalis. (LINN.).
OF. *Nux moschata : macis.* G. *Noix muscade : mace.*
GE. *Muskatnuss : muskatblüthe.* A. *Nutmeg ; mace.*
QUAL. *Utriusque :* In oleo volatili simul ac fixo aromatico residens : Odor fragrans ; sapor grate amaricans, aromaticus, stypticus.
VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa; obstipans; *majori dosi :* hypnotica ; sedativa.
USUS. Dyspepsia ; flatulentia ; colica ; diarrhœa; stranguria.
DOS. Gran. IV-XX.
PRÆP. Nux condita ; oleum volatile et oleum fixum fragrans.

MYROXYLON PERUIFERUM. Balsamum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Amer. merid.*

OF. *Balsamum Peruvianum.* G. *Baume du Pérou.* GE. *Peruvianischer Balsam.* A. *Balsam of Peru.*

QUAL. Præstans: odor suaveolens; sapor acris.

USUS. Dyspepsia; spasmi; amenorrhœa; blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes; ulcera. *Extern.* Arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. VI-XXX. Sæpius de die cum vitello ovi aut saccharo.

MYRTUS CARYOPHYLLATA. Cortex.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient. & occident.*

OF. *Cassia caryophyllata.* G. *Nelkenrinde; nelkenzimmt.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, pungens.

VIRT. Stomachica.

USUS.

MYRTUS COMMUNIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Myrtus.* A. *Common myrtle.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, substypticus.

VIRT. Calefaciens; adstringens.

USUS. Profluvia.

MYRTUS PIMENTA. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Piper Jamaicence ; fructus pimenti* (FALSO *semen amomi veri*). G. *Poivre de Jamaique.* GE. *Nelkenpfeffer ; englisches gewürz.* A. *Jamaica pepper or long leaved pimento , or allspice.*

QUAL. Odor fragrans, gratus ; sapor aromaticus.

VIRT. Calefaciens ; stomachica ; stimulans.

USUS.

N.

NEPETA CATARIA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis ; in muris antiquis.*

OF. *Cataria ; nepeta.* GE. *Katzenmünze.* A. *Common catmint.*

QUAL. Odor hircinus, felibus gratus ; sapor nauseosus, amarus.

VIRT. Nervina ; menagoga ; anthelminthica.

USUS. Hysteria ; chlorosis.

NERIUM ANTIDYSENTERICUM. Cortex.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Frutiosa ; Ind. orient.*

OF. *Cortex conessi ; cortex antidysentericus , seu profluvii.* A. *Oval leaved rosebay.*

QUAL. Lactescens ; sapor amarus. *Recentis :* Acris ; virosa.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Intermittentes pertinaces ; sub finem dysenteriæ ; diarrhœa ; odontalgia.

NICOTIANA TABACUM. Folia siccata.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Herba tabaci; nicotiana.* G. *Tabac.* GE. *Tobak.* A. *Tobacco.*

QUAL Heroica: venenata; in principio narcotico acri residens; odor nauseosus; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Diuretica; emetica; drastico-cathartica; stimulans; errhina; phthiriaca; deobstruens; sialogoga; narcotica.

USUS *internus* tincturæ, vini, aut extracti: Hydrops; morbi pectoris pituitosi; scirrhus; icterus. *Externus* fumi (melius infusi) forma enematis: Obstipatio; ileus; hernia incarcerata. Forma lotionis: psora; ozæna; phimosis. — Pulvis tabaci cum aqua vel alcohole diluto in pastam redactus, carpo interno applicatus: Intermittentes.

N. B. Idem præcordiis appositus vomitum ciet.

DOS. *Folior siccat.* drach. semis-j ad unc. IV aquæ infusæ per horam. *Vini vel tincturæ:* Gutt XL-C omni bihorio in hydrope.

PRÆP. Extractum; tinctura; vinum *Ph. Edinb.*

NIGELLA SATIVA. Semen.

CL. *Polyand.* O. *Tetragyn.* *annua; insul. archipel.*

OF. *Semen nigellæ* s. *melanthii.* GE. *Schwarzkümmel; schwarzer koriander.* A. *Small fennelflower*

QUAL. Venenata: in oleo volatili, simulque fixo residens: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; lactifera; errhina; sialagoga, menagoga; anthelminthica.

USUS.

NYMPHÆA ALBA. Radix; flores.
CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis paludosis, aquosis.*
OF. *Nymphæa.* G. *Nenuphar blanc.* A. *White water lily.*
QUAL. *Florum:* Fragrans. *Radicis:* In oleo acri residens, exsiccatione avolans.
VIRT. *Florum:* antaphrodisiaca? Refrigerans; hypnotica. *Radicis:* Vesicans.

NYMPHÆA LUTEA.
A. *Yellow water lily.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

O.

OCYMUM BASILICUM. Herba; semen.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *annua; hortensis.*
OF. *Herba Basilici.* GE. *Basilienkraut.* A. *Common sweet basil.*
QUAL. *Herbæ:* Odor fragrans; sapor aromaticus. *Seminis:* Mucilaginosa.
VIRT. Nervina.
USUS Vomitus; rheumata.

OENANTHE CROCATA. Herba.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Europ.*
A. *Hemlockwater-dropwort.*
QUAL. Mucilaginosa.
VIRT. Emolliens.
USUS.

OLEA EUROPÆA. Oleum fixum, expressione fructus paratum.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Oleum olivarum.* G. *Huile d'olives.* GE. *Baumoel.*

A. *Common European olive : olive-oil.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS *intern. & extern.* : Dysenteria; tenesmus; tussis; stranguria; nephritis; enteritis; morsura.

N. B. Oleum calidum toti corporis superficiei frictione adplicatum donec sudor profluat, curare æque ac arcere pestem, nuper didicimus.

ONONIS ARVENSIS
——— SPINOSA. } Radix; herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; ad vias, & in locis sterilibus.*

VAR. A. flor. Purpur. B. Flor. alb.

OF. *Anonis* s. *Ononis.* G. *Arrête-bœuf; bugrane.* GE. *Hauhechel.* A. *Thorney purple & white rest-harrow.*

QUAL. Sapor subacris, ingratus.

VIRT. Diuretica.

USUS. Testiculi tumor durus; hydrocele; icterus; ischuria?

DOS. Pulveris drach. j; in decocto unc. semis ad libram j aquæ.

ONOPORDIUM ACANTHIUM. Herba recens; succus expressus.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Carduus tomentosus; acanthium* G. *Pédane.* GE. *Weg-distel; grosse zellblume.* A. *Woolly onopordium or cottonthistle.* H. *Toba.*

VIRT. Specifica anticancrosa?

USUS *succi recentis* externe adplicati: Carcinoma; præcipue ulcera faciei cancrosa.

ONOSMA ECHIOIDES. Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.*

N. B. Substitutur anchusæ tinctoriæ.

OF. *Anchusa lutea.*

QUAL.

VIRT. Menagoga?

USUS.

OPHIORRHIZA MUNGOS. Radix.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Radix serpentum* s. *mungos.*

QUAL. In extractivo amaro residens; sapor subsalsus, intense amarus.

VIRT.

USUS. Morsura; hydrophobia? Mania?

OPHIOXYLUM SERPENTINUM. Lignum.

CL. *Polyg. O. Monœc.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Lignum serpentum* s. *serpentinum.* A. *Scarlet-flowered ophioxylum.*

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS *infusi*: Quartana; morsura.

DOS. Drach. semis ad libram j aquæ.

ORCHIS BIFOLIA. Radix.
CL. *Gynand.* O. *Diand.* *Perennis.*
OF. *Satyrium.* GE. *Stendelwurzel.*
QUAL. et VIRT. Sequentium.

ORCHIS MASCULA.
——— MILITARIS.
——— MORIO, etc. } Radix.
CL. & O. *præced.* *Perennis; in Sylvis.*
OF. *Radix salep; salap.* A. *Male orchis; man orchis & female orchis.*
QUAL. Mucilaginosa. *N. B.* Odor quarumdam specierum hircinus.
VIRT. Nutriens; involvens; aphrodisiaca?
USUS. Anaphrodisia? Dysenteria; tabes; ulcera interna.
DOS. Drach. ij pulveris ad libram j aquæ in decocto.

ORIGANUM CRETICUM. Spicæ.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; Europ. austr.*
OF. *Origanum Creticum.* G. *Origan.* GE. *Spanischer hopfen; kretische dosten.*
QUAL. In oleo volatili acri residens: odor fragrans, gratus; sapor acris, aromaticus, amaricans.
VIRT. Stimulans; menagoga; resolvens.
USUS. Odontalgia: In balneis.
PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM DICTAMNUS. Folia.
CL. & O. *præced.* *Perennis; suffruticosa; Archipel.*
OF *Dictamnus Creticus.* G. *Dictame de Candie.* GE. *Kretischer diptam.* A. *Dittany of Candia.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans debilis; sapor aromaticus, calidus.
VIRT. Stimulans; nervina; menagoga; resolvens.
USUS.
PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM MAJORANA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis, Europ. austr.*
OF. *Majorana.* G. *Marjolaine.* GE. *Majoran.* A. *Sweet or knotted marjoram.* H. *Almoradux.*
QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.
VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; menagoga; errhina; resolvens.
USUS. Anosmia; coryza.
PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM SYRIACUM. Herba.

A. *Syrian herb mastich.*
QUAL. Aromatica.
VIRT. Stimulans.
USUS.

ORIGANUM VULGARE. Herba.

CL. & O. *Præced.* *Perennis; in locis montanis, nemorosis, siccis.*
OF. *Origanum vulgare.* G. *Origan.* GE. *Dosten; wohlgemuth.* A. *Common marjoram.* H. *Origano sylvestre.*
QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, amaricans, subacris: tinctoria.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.
USUS. Tussis; tabes pulmonalis pituitosa; chlorosis; œdema: In balneis frequens.
N. B. Theæ succedaneum.
PRÆP. Oleum volatile.

ORYZA SATIVA. Semen.

CL. *Hexandr.* O. *Digyn.* *Annua.*
OF. *Grana oryzæ.* G. *Riz.* GE. *Reis.* A. *Common rice.* H. *Arroz.*
QUAL. Mucilaginosa; farinosa; dulcis.
VIRT. Nutriens; involvens.
USUS *Cibarius:* Diarrhœa; dysenteria.

OSMUNDA REGALIS.

CL. *Cryptog.* O. *Filices.*
A. *Royal or flowering osmunda.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.

OXALIS ACETOSELLA. Herba recens; Folia.

CL. *Decand.* O. *Pentag.* *Perennis; Europ.*
OF. *Acetosella* s. *lujula.* G. *Oseille des bucherons.* GE. *Sauerklee.* A. *Common wood-sorrel.* H. *Oxalide acederilla; aleluja.*
QUAL. In acido peculiari residens; sapor intense acidus, gratus.
VIRT. Refrigerans.
USUS. Febres. *Externus fol. recent. contusor.* forma cataplasmatis: ulcera glandularum scrophulosa.

PRÆP. Oxalas acidulus potassæ *vulgo* sal acetosellæ. (G. Oxalate acidule de potasse:) Acidum oxalicum; conserva; syrupus.

OXALIS CERNUA.

QUAL. et VIRT. Præced.

OXALIS CORNICULATA.

CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*

A. *Yellow wood-sorrel.*

QUAL. et VIRT. præcedentis.

P.

PAEONIA ANOMALA. Radix.

CL. *Polyand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Intermittentes.

PAEONIA OFFICINALIS. Radix; flores; semen.

CL. & O. *præced.*

OF. *Paeonia.* G. *Pivoine.* GE. *Paeonien; gichtrosen; pfingstrosen.* A. *Common paeony.*

QUAL. *Radicis recentis:* Odor teter, fœtidus. *Siccatæ:* sapor farinaceus, substypticus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; subastringens.

USUS. Epilepsia; Intermittentes. (PALLAS).

N. B. Succus radicis recentis paeoniæ foliis bifidis expressus majori dosi in epilepsia tentari meretur.

PANAX QUINQUEFOLIUM. Radix.
CL. *Polyg.* O. *Diœc.* *Perennis; Tartariæ; Amer. septentr.*
OF. *Radix ginseng.* A. *Ginseng.*
QUAL. Sapor gratus, leniter aromaticus.
VIRT. Leniter stimulans. — Aphrodisiaca?
USUS. Anaphrodisia? asthenia? marasmus?
DOS. Scrup. j-drachm j.

PANICUM DACTYLUM. Radix.
CL. *Diand.* O. *Digyn.* *Europ. austr.*
QUAL.
VIRT.
USUS. Substituitur radici tritici repentis in Italia.

PANICUM ITALICUM. Semen.
CL. & O. *præced.* *Annua.*
OF. *Milii semen.* G. *Millet.* A. *Italian panic-grass.*
QUAL. Farinacea.
VIRT. Nutriens; involvens.
USUS.

PAPAVER RHŒAS. Flores.
CL. *Polyand.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*
OF. *Papaver rhœas, seu erraticum.* G. *Pavot coquelicot.* GE. *Klatschrosen.* A. *Common red poppy.* H. *Adormidera sylvestris amapola.*
QUAL. Subamara.
VIRT. Subnarcotica.
USUS.
PRÆP. Syrupus læte ruber.

PAPAVER SOMNIFERUM. Capsulæ seminales : Succus gummi - resinosus incisione vel expressione capsularum seminalium immaturarum obtentus, vulgo *Opium* dictus.

CL. & O. *præced.* *Annua ; Ægypt. & Asiæ meridion. ; Europ. hortensis.*

OF. *Capita papaveris albi : Opium.* G. *Pavot somnifere : Opium.* GE. *Weisser mohn : Mohnsaft* A. *Common white poppy : Opium.*

QUAL. Heroica : in principio narcotico cum gummi-resinoso volatili juncto residens ; odor teter, virosus ; sapor nauseosus, acris, amarus.

VIRT. Narcotica ; sudorifica ; obstipans : *majori dosi* stimulans ; cardiaca.

USUS *internus* : Dolor ex irritatione aut spasmo ; dolor phlegmasiarum post evacuationes debitas ; intermittentes ante paroxismum vel finito stadio frigoris ; dysenteria atonica ; diarrhœa ; Cholera ; tussis ex acri tenui ; lochia dolorifica et hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut spasmo ; menstruatio dolorifica ; podagra atonica (magna dosi) ; rheumatismus post v. s. necessarias ; asthma ; hysteria ; nephralgia ; cardialgia ; colica pictonum ; tetanus ; convulsio ; blennorrhagia ; tumor epididymidis vel testiculi syphilitica ; ulcera syphilitica rebellia ; ulcera phagedænica ; gangræna senilis. *Externus* forma enematis, fotus, linimenti.

DOSIS. Gr. I-XV de die.

PRÆP. Solutio opii in vino vel alcohole diluto; extractum aquosum; syrupus; decoctum capsularum; linimenta varia.

N. B. Semina nulla qualitate, nisi oleosa demulcente, gaudent.

PARIETARIA OFFICINALIS. Herba; radix.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* *Perennis.*

OF. *Parietaria.* G. *pariétaire.* GE. *Glaskraut; mauerkraut.* A. *Wall pellitory.*

QUAL. Aquoso-insipida.

VIRT. Refrigerans; diuretica.

USUS. Stranguria; tabes?

PARIS QUADRIFOLIA. Herba; baccæ.

CL. *Octand.* O. *Tetrag.* *Perennis.*

A. *Herb paris; true love or one berry.*

QUAL. Odor teter; sapor dulcescens.

VIRT. Antispasmodica; narcotica.

USUS. Convulsio; mania; bubo; ophthalmia.

PARNASSIA PALUSTRIS. Herba; flores.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.* *Perennis.*

OF. *Hepatica alba.* A. *Grass of Parnassus.*

QUAL. Amaricans.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PASTINACA OPOPANAX. Succus gummi-resinosus concretus, incisione plantæ et radicis, obtentus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Gummi opopanax.* A. *Rough parsnep.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; odor graveolens; sapor acris, amaricans.

VIRT. Nervina; eccoprotica; carminativa; menagoga.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PASTINACA SATIVA. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis.*

OF. *Pastinaca.* A. *Garden Parsnep.*

QUAL.

VIRT?

SUSUS. Intermittentes?

DOS. *pulveris*: Drach j-Unc. semis.

PEDICULARIS PALUSTRIS. } Herba re-
Aliæque SPECIES. } cens.

CL. *Didyn.* O. *Gymnops.*

A. *Lousewort.*

QUAL. Ingrata.

VIRT. ?

USUS. Fistula; ulcus callosum.

PENAEA SARCOCOLLA. }
——— MUCRONATA. } Gummi-resina.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Æthiopica.*

N. B. *Gummi sarcocollæ offic. ex his plantis provenire creditur.*

QUAL. Inodora; sapor amaricans, acris, nauseosus.
VIRT. Stimulans; cathartica.
USUS.

PENTAPETES MUHUCUNDA? Flores.

CL. *Monadelph.* O. *Dodec.* *Ind. orient.*
Muhucunda BENGALIS.
QUAL. Mucilaginosa.
VIRT.
USUS *infusi flor. recent.* Blennorrhagia. *Pulv. flor. siccat. naribus attracti* : Cephalæa nervosa.

PETIVERA ALLIACEA. Herba.

CL. *Hexand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa; Ind. occident.*
OF. *Scorodoniæ herba.* A. *Common guinea hen-weed.*
QUAL. et VIRT. allium æmulans.
USUS. Intermittentes.

PEUCEDANUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis.*
OF. *Peucedanum.* A. *Common sulphur-wort.*
QUAL. Lactescens; odor nauseosus; sapor dulcescens.
VIRT. Diuretica? Expectorans?
USUS. Ulcera; odontalgia.

PEZIZA AURICULA.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi.*
OF. *Auricula Judæ; fungus sambuci.*
QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS *externus* forma *gargarismatis* : Angina? *Collyrii* : Ophthalmia?

PHALARIS CANARIENSIS. Semen.

CL. *Diand.* O. *Monog.*

OF. *Semen canariense.* A. *Manured canary grass.*

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

PHASEOLUS VULGARIS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

A. *Kidney-bean.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; cosmetica?

USUS.

PHELLANDRIUM AQUATICUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis; in locis paludosis.*

OF. *Phellandrium* s. *fœniculum aquaticum.* G. *Phellandrie.* GE. *Wasser-fenchel* A. *Water phellandrium.* H. *Milenrama aquatico.*

QUAL. Odor et sapor aromaticus, acris.

VIRT. Stimulans; narcotica?

USUS *pulv. vel decocti* : Dyspepsia; intermittentes; hypochondriasis? Ulcera scrophulosa, atonica; tabes pulmonalis pituitosa.

DOS. Pulveris unc. semis-j cum lacte omni mane; pro decocto unc j ad libram unam aquæ vel aquæ calcis.

PHŒNIX DACTYLIFERA. Fructus.

Palma; Asiæ & Africæ.

OF. *Dactyli.* G. *Dattes.* A. *Date Palm-tree.*

QUAL. Sapor dulcis, mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; expectorans.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

PHYLLANTHUS EMBLICA. Fructus siccatus cum nuce.

CL. *Monœc.* O. *Triand.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Myrobalani emblicæ.* A. *Shrubby philanthus.*

QUAL. Sapor acidulus, austerus, subacris.

VIRT. Adstringens. *Infusi:* Cathartica.

USUS. Stomacace; dysenteria.

PHYSALIS ALKEKENGI. Baccæ; semina.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

OF. *Solanum vesicarium; baccæ alkekengi.* G. *Coqueret; alkékenge.* GE. *Judenkirschen.* A. *Winter-cherry.* H. *Vegiga de perro.*

QUAL. *fructus:* Sapor grate acidulus. *Corticis fructus:* Sapor intense amarus.

VIRT. *fructus:* Diuretica; eccoprotica.

USUS. Nephritis; Dysuria; hydrops.

PHYTOLACCA DECANDRA. Succus foliorum expressus.

CL. *Decand.* O. *Decagyn.* *Perennis; Virginiæ; passim hortensis.*

OF. *Phytolacca.* G. *Phytolaque; raisin d'Amérique.*

GE. *Amerikanische kermesbeeren; Amerikanischer nachtschatten.* A. *Branching phytolac or virginian poke.* H. *Yerba carmin.*

QUAL. *Tenellæ :* Aquosa. *Adultæ* : Acris.

VIRT. Corrodens; anticancrosa?

USUS. Succi guttatim instillati : Ulcera cancrosa.

PIMPINELLA ANISUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Ægyptiaca.*

OF. *Semen anisi.* G. *Anis.* GE. *Anies.* A *Anise.*

QUAL. In oleo volatili non acri residens; sapor dulcescens, aromaticus; odor virosus, fragrans.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera; resolvens.

USUS *pulveris* : Flatulentia. *Olei* : Rheumatismus.

DOSIS *pulveris* : Scrup. j - drach. semis. In infuso : Unc. semis ad libram j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile. Gutt. x - drachm ij pro dosi.

PIMPINELLA MAGNA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Pimpinella nigra.* G. *Grand boucage.* GE. *Schwarze bibernellwurzel.* A. *Great burnet saxifrage.*

QUAL. In oleo volatili cæruleo residens; odor et sapor aromaticus.

PIMPINELLA SAXIFRAGA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

N. B. VARIETAS. A. Alba. B. nigra.

OF. *Pimpinella alba s. nostras.* G. *Petit boucage; saxifrage.* GE. *Weisse Bibernellwurzel.* A. *Small burnet saxifrage.*

QUAL. Præstans: In principio resinoso acri residens; Odor hircinus; sapor acris, calidus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; resolvens.

USUS *pulveris et tincturæ:* Angina serosa; hysteria.

PRÆP. Tinctura.

PINUS ABIES. Summitates; resina granulata incisione arboris obtenta.

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea.*

OF. *Abies: resina alba: pix Burgundica: Colophonium.* G. *Sapin.* GE. *Tannenbaum.* A. *Norway spruce fir-tree.* H. *Pino abeto.*

QUAL. *Summitatum seu foliorum teneriorum acerosorum:* Resinosa; sapor acescens, resinosus. — *Resinæ:* Sapor gratus, amaricans; odor fragrans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS *decocti summitatum:* Morbi cutis. *Resinæ fusæ cum sebo externus:* Lepra ichthyosis CULLEN.

PRÆP. Resina fusa per linteum colata, vulgo *Pix Burgundica.* Resina addito aceto cocta ad siccitatem usque, vulgo *Colophonium.*

PINUS BALSAMEA. Resina liquida, incisione aut perforatione arboris obtenta.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Amer. septentr.*

OF. *Balsamum Canadense.* GE. *Kanadischer balsam.* A. *Canada balsam.*

QUAL. Resinosa; odor fragrans, gratus; sapor subaromaticus, leviter pungens, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi cutis; acre herpeticum in corpore vagum; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS. Gut. xl—lx.

PINUS CANADENSIS. Cortex.

G. *Sapinette de Canada.* A. *Hemlock-Spruce.*

USUS *decocti :* Scorbutus; syphilis Canadensis (BOWMANN).

PINUS CEMBRA. Resina liquida.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; alpina.*

OF. *Balsamus Carpathicus; balsamus Libani.* A. *Sibirian stone pine-tree.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans.

USUS. Blennorrhœa; ulcera.

PINUS LARIX. Resina liquida.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; alpina.*

OF. *Terebinthina Veneta s. larigna.* G. *Térébinthine: Melèse.* GE. *Terpentin : Lerchenbaum.* A. *Venitian turpentin : common white larch-tree.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans; urinam violaceo odore imbuens.

USUS. Idem ac præced.

PINUS MUNGHOS. (SCOPOLI.) Oleum destillatione obtentum.

CL. *et* O. *præced. Arborea; German. Hungar. alpina.*

OF. *Oleum templinum.* A. *Krummholz-oel.*

PINUS PINEA. Nuclei.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Pinei.* G. *Pin-pignier* A. *Stone pine-tree.*

QUAL. Dulcis; oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes; stranguria.

PINUS PICEA. Resina liquida, incisione arboris obtenta.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Terebenthina Argentoratensis : resina alba.* A. *Silver fir-tree.*

PINUS SYLVESTRIS. Turiones; resina alba liquida, perforatione aut incisione arboris obtenta.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Terebinthina communis : Pix alba.* G. *Terebenthine : résine blanche; galipot.* GE. *Gemeiner terpentin; weisses pech.* A. *Common turpentin; white rosin : scots fir or pine-tree.*

QUAL. Resinosa; acris; amara.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica; depilatoria.

USUS *internus :* Arthrodynia; blennorrhœa; asthma pituitosum; scorbutus. *Decocti turionum vel resinæ liquidæ :* Morbi cutis; herpes. *Externus resinæ liquidæ* forma enematis : Obstipatio. *Forma unguenti vel emplatri :* Ulcera atonica.

DOS. *Turionum :* Unc. semis-j ad libras ij aquæ vel seri lactis coct. de die sumendum. *Resinæ*

liquidæ : Unc. semis - j vitello ovi subacta cum aqua mixta pro enemate. *Interu.* ; Gran. v - x villeto ovi vel saccharo subacta.

PRÆP. Resina alba liquida calore ignis exsiccata vulgo *colophonium*. Resina nigra destillatione per descensum obtenta, fumo inquinata, liquida vulgo *pix nigra liquida;* resina solida vulgo *pix navalis*. G. Goudron ; poix. GE. Theer; schiffpech. A. Tar; pitch. --- Oleum volatile terebinthinæ; aqua picea.

PIPER CUBEBA. Fructus siccatus.

CL. *Diandr. O. Trigyn.* *Sarmentosa; Ind. orient.*

OF. *Cubebæ.* G. *Cubebes.* GE. *Kubeben; schwindelkærner.* A. *Cubebs.* H. *Pimienta cubeba.*

QUAL. Acris; aromatica ; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; carminativa ; sialagoga.

USUS Vertigo; morosis?

PIPER LONGUM. Fructus.

CL. & O. *Præced.* *Sarmentosa; Ind. orient.*

OF. *Piper longum.* G. *Poivre long.* GE. *Langer pfeffer.* A. *Long pepper.*

QUAL. et VIRT. Sequentis.

PIPER NIGRUM. Fructus.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa; Ind. orient.*

N. B. Piper album est fructus maturus cortice privatus.

OF. *Piper nigrum, album.* G. *Poivre.* GE. *Gemeiner pfeffer.* A. *Black, or white common pepper.*

QUAL. In principio resinoso residens; acris; aromatica; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; errhina; phthyriaca.

USUS *internus :* Intermittentes ; dyspepsia ; singultus. *Externus :* Uvulæ relaxatio ; pediculi.

PISTACIA CHIO. (TOURNEFORT). Resina liquida.

CL. *Diœc. O. Pentandr.* *Arborea; Ins. Chio.*

N. B. Sub hoc nomine in horto botanico Parisino existit arbor à Tournefort ex insula Chio allata, ex qua incolæ hujus insulæ terebinthinam e Chio veram depromunt.. Hæc arbor longe minor est pistacia terebintho, foliola pauciora et folia undulata, glauca habet. Terebinthinam e Chio in commercio vulgo obviam ex hac et pistacia terebintho promiscue depromi probabile est.

PISTACIA LENTISCUS. Resina alba, incisione arboris exsudans, concreta.

CL. & O. *præced.* *Arborea ; Europ. austr.*

OF. *Mastiche ; gummi mastiche.* G. *Mastic.* GE. *Mastix.* A *Mastiche : common mastick-tree.* H. *Almastiga ; almaciga.*

QUAL. Resinosa ; aromatica.

VIRT.

USUS. Masticatorius ; item suffimigia.

PISTACIA TEREBINTHUS. Resina liquida.

GL. & O. *præced.* *Arborea; Asiæ, Afric. & Europ. austr.*

OF. *Terebinthina de Chio seu Cyprina.* GE. *Zyprischer terpentin.* A. *Common turpentin-tree.*

QUAL. Resinosa; odor fragrans; sapor gratus, amarus, subacris; urinam violaceo odore imbuens.

VIRT Stimulans; diuretica; eccoprotica; resolvens.

USUS. Tussis; tabes; ulcus; blennorrhœa.

PISTACIA VERA. Nuces.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Asiæ & Europ. austr.*

OF. *Pistaciæ.* G. *Pistaches.* G. *Pistazien.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PISUM SATIVUM. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Hortensis.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PLANTAGO MAJOR.
———— MEDIA.
———— LANCEOLATA. } Herba; radix; semen.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In viis passim.*

OF. *Plantago.* G. *Plantain.* GE. *Wegwart.* A. *Great, hoary, & rib-wort plantain.*

QUAL. Insipida; substyptica.

USUS. Tertianæ; ulcus.

N. B. Succum plantaginis majoris efficacissimum contra morsum *Crotali horridi* antidotum esse nuper didicimus.

PLANTAGO PSYLLIUM. Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Annua; Europ. austr. in Campis arenosis.*

OF. *Semen psyllii.* G. *Herbe aux puces.* GE. *Flohsaamen.* A. *Flea-wort or clammy plantain.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Involvens.

USUS. Raucedo; ophthalmia.

PLUMBAGO EUROPÆA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Dentellaria; dentaria.* GE. *Zahnwurzel.* A. *European leadwort.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris, urens.

VIRT. Caustica.

USUS. Carcinoma? odontalgia.

PLUMERIA ALBA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

A. *White plumeria.*

QUAL. Lactescens.

USUS *decocti:* Syphilis?

POINCIANA PULCHERRIMA.

CL. *Decandr.* O. *Monog.*

VIRT. Menagoga.

POLYGALA AMARA. Radix; folia.

CL. *Diadelph.* O. *Octand.* *Subperennis; in montibus nemorosis.*

*

OF. *Polygala amara.* G. *Polygale amère.* GE. *Bittere kreutzblume.* A. *Bitter milkwort.*

QUAL. *Radicis :* Subdulcis, amaricans. *Foliorum :* Sapor intense amarus.

VIRT. *Foliorum et radicis :* Stomachica; expectorans.

USUS *Radicis :* Morbi pectoris atonici; pertussis; tabes pulmonalis.

DOSIS *Pulveris radicis :* Drach. semis, bis terve de die. *Decocti* radic. unc. ij ad libram ij aquæ reductæ ad libram unam de die sumend.

POLYGALA SENEGA. Radix; cortex radicis.

CL. *et* O. *præced.* *Perennis; Virgin. Pensylv.*

OF. *Senega; seneka; polygala Virginiana.* GE. *Senekawurzel.* A. *Rattlesnake-root or officinal milkwort.*

QUAL. Heroica : In principio resinoso residens; sapor acido-acris, subaromaticus, ad finem intense amarus, urens.

VIRT. Subemetica; cathartica; sudorifica; diuretica; expectorans; sialagoga; deobstruens.

USUS. Hydrops; arthrodynia; arthritis; morbi pulmonum atonici, pituitosi. Morsura serpentum præcipue *crotali horridi* Americæ. Tabes; pleuritis?

DOSIS *pulveris :* Gran. x—xxx. — *In decocto :* Scrup. j — drach. semis ad libram j aquæ sumend. unc. semis—j omni hora, donec alvum movere incipiat.

PRÆP. Decoctum; infusum vinosum; tinctura.

POLYGALA VULGARIS. Radix.
CL. & O. *præced.* *Subperennis.*
QUAL.
VIRT.
USUS.

POLYGONUM AVICULARE. Herba.
CL. & O. *præced.* *Annua.*
OF. *Centumnodium; sanguinaria; herba sanguinalis.*
A. *Common knot-grass.*
QUAL. Substyptica.
VIRT.
USUS.

POLYGONUM BISTORTA. Radix.
CL. *Octand.* O. *Trigyn.* *Perennis; in pratis humidis,*
OF. *Bistorta.* G. *Bistorte.* GE. *Natterwurzel.* A. *Great bistort or snakeweed.*
QUAL. In copioso principio adstringente residens; sapor stypticus.
VIRT. Roboraus; adstringens.
USUS. Cum gentiana forma pulveris, decocti, infusi: Intermittentes; profluvia; leucorrhœa.
DOS. Drach. iij de die.

POLYGONUM FAGOPYRUM. Semen.
QUAL. Farinacea.
VIRT. Nutriens.
USUS.

POLYGONUM HYDROPIPER. Herba.
CL. & O. *præced.* *Annua; in fossis humidis.*
OF. *Hydropiper; persicaria.* G. *Poivre d'eau.* GE.

Wasserpfeffer; flœhkraut; pfersichkraut. A. *Water-polygonum; water-pepper or arsmart.*

QUAL. Lutea; acris; urens.

VIRT. Diuretica; corrodens; rubefaciens.

USUS.

POLYGONUM PERSICARIA.

OF. *Persicaria.* A. *Spotted polygonum or persicaria.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYPODIUM FILIX MAS. Radix.

CL. *Cryptog.* O. *Filices.* *In umbrosis, nemorosis.*

N. B. Planta 6 ad 7 pedum altitudinis: Frondibus bipinnatis; pinnis obtusis crenulatis; stipite paleaceo.

OF. *Filix mas.* G. *Fougère mâle.* GE. *Johanniswurzel.* A. *Male fern or male polypody.* H. *Polypodio helecho masculino.*

QUAL. Sapor ingratus, mucilaginoso-dulcis, stypticus, sub finem amaricans.

VIRT. Anthelminthica. Lactifera? Menagoga?

USUS. Tænia; lumbrici; rhachitis?

DOSIS *pulveris*: Gran. XXX-drach. j infantibus: drach. ij-iij adultis, subjuncto cathartico.

POLYPODIUM FRAGRANS. Herba.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans.

USUS.

POLYPODIUM VULGARE. Radix mollis.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in rimis petrarum.*

OF. *Polypodium.* G. *Polypode ordinaire; polypode de chêne des anciens.* GE. *Engelsüss.* A. *Common polypody.*

QUAL. Sapor dulcis, subnauseosus, tandem amarus.

VIRT. Expectorans; eccoprotica.

USUS.

POLYTRICHUM COMMUNE. Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Musci.*

OF. *Adianthum aureum.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POPULUS BALSAMIFERA. Resina.

An balsamum?

CL. *Diœc.* O. *Octand.* *Amer. septentr.*

N. B. JACQUIN tacamahacam ex Fagara octandra derivat.

OF. *Gummi tacamahaca.* A. *Common tacamahac poplar tree.*

QUAL. Præstans: Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cophosis; vomitus; hysteria.

POPULUS NIGRA. Gemmæ.

A. *Black poplar tree.*

QUAL.

VIRT. Obtundens; emolliens; soporifera.

USUS. Diarrhœa; ambustura?

PORTULACA OLERACEA. Semen.
CL. *Dodecand.* O. *Monog.*
A. *Garden purslane.*
QUAL. Aquosa.
VIRT. Refrigerans; lac coagulans.
USUS. Stranguria?

POTENTILLA ANSERINA. Radix; herba.
CL. *Icosand.* O. *Polygyn.* *In fossis & pratis humidis.*
OF. *Folia argentinæ s. anserinæ.* A. *Silver cinquefoil or wild tansy.*
QUAL. Insipida.
VIRT.?
USUS.

POTENTILLA REPTANS. Radix; herba.
CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis.*
OF. *Quinquefolium; pentaphyllum.* A. *Common cinquefoil.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Diarrhœa; sub finem dysenteriæ.

POTERIUM SANGUISORBA. Herba.
CL. *Monand.* O. *Polyand.* *Perennis; alpina.*
OF. *Pimpinella italica rubra.* A. *Common burnet.*
QUAL. Odor subfragrans; sapor stypticus.
VIRT. Adstringens.
USUS.

PRIMULA VERIS. Radix; herba; corollæ.
VARIET. A. Officinalis.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Flores paralyseos.* G. *Primevère.* GE. *Schlüssel-blumen.* A. *Common cowslip.*

QUAL. *Plantæ recentis* : Odor fragrans. *Radicis* : Sapor amaricans.

VIRT. Nervina? Narcotica? *Radicis* : Errhina.

USUS.

PRUNELLA VULGARIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Consolida minor.* A. *Common self-heal.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PRUNUS AVIUM. Fructus; gummi.

CL. *Icosand. O. Monog.* *Arborea.*

OF. *Cerasorum nigrorum fructus.* G. *Merisier.* A. *Small fruited cherry tree.*

QUAL. *nuclei* : Sapor et odor laurocerasum æmulans. *Fructus* : Sapor acidus.

VIRT.

USUS.

PRÆP. Aqua; alcohol, vulgo kirschwasser. (Italorum *marascino*).

PRUNUS CERASUS. Fructus; nuclei; gummi.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Cerasorum rubrorum fructus.* G. *Cerisier.* GE. *Kirschen-baum.* A. *Cultivated cherry tree.*

QUAL. *fructus* : Sapor acidulo-dulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS *nucleorum* : Ad aquam stillatitiam parandam.
Gummi : Idem ac gummi Mimosæ niloticæ.

PRUNUS DOMESTICA. Fructus; pulpa.
CL. & O. *præced.* *Arborea.*
OF. *Pruna damascena* s. *gallica.* G. *Prunes de damas.*
GE. *Pflaumen ; zwetschgen.* A. *Common plum tree.*
QUAL. Sapor mucilaginoso-dulcis, acidulus.
VIRT. Eccoprotica.
USUS. Febres; obstipatio.

PRUNUS LAURO-CERASUS. Folia.
CL. & O. *præced.* *Hortensis ; arborea.*
OF. *Lauro-cerasus.* G. *Laurier-cerise.* GE. *Kirschlorbeerbaum.* A. *Common laurel.* H. *Lauro real.*
QUAL. Venenata : In oleo volatili et principio narcotico residens ; sapor amarus.
VIRT. Narcotica; antispasmodica; deobstruens.
USUS *aquæ* : Scirrhus; cancer? Obstructio hepatis? dysuria; Syphilis? Phthisis?
PRÆP. Aqua stillatitia. *Dosi* gutt. XXX-XL.

PRUNUS PADUS. Cortex.
CL. & O. *præced.* *Arborea.*
A. *Common bird-cherry tree.*
QUAL. *corticis* : Sapor amarus, substypticus.
VIRT.
USUS *decocti vel extracti* : Intermittentes ; syphilis ?
DOS. In decoto unc. j ad libram j aquæ, omni mane sumend.

PRUNUS SPINOSA. Baccæ; flores; succus baccarum inpissatus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Prunus sylvestris; acacia nostras* s. *germanica: succus acaciæ inspissatus.* G. *Prunellier.* GE. *Schlehendorn.* A. *Sloe tree.* H. *Endrino.*

QUAL. *Baccarum:* Sapor stypticus, acidulus. *Florum:* Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. *Baccarum:* Antiseptica; roborans; adstringens. *Florum:* Eccoprotica.

USUS *fructus:* Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa.

PRÆP. Aqua florum; succus baccarum inspissatus.

PSYCHOTRIA EMETICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Mexicana.*

Nota. Incertum est, an ad idem genus pertineat radix ipecacuanhæ fuscæ ex Brasilia allata.

OF. *Ipecacuanha vulgaris* s. *vera* s. *cinerea* s. *grisea.* GE. *Graue Brechwurzel.* A. *Ipecacuanha.*

QUAL. In principio resinoso residens: Odor nauseosus; sapor amaricans, leviter pungens.

VIRT. Emetica.

USUS. Asthma spasmodicum; spasmi; ad præveniendam febrem puerperalem mox initio gr. $\frac{1}{4}$-$\frac{1}{3}$ omni quadrihorio (*Doulcet*) Menorrhagia; hæmoptysis; dysenteria; diarrhœa; pertussis.

DOS. *pulveris* gran j-iij. *scopo emetico:* gran. XV-XX.

PRÆP. Pulvis sudorificus Doveri; vinum ipecacuanhæ; trohisci.

PTERIS AQUILINA. Radix.
CL. *Cryptog.* O. *Filic.* *Perennis.*
OF. *Filix fœmina.* A. *Common brake, or female fern.*
QUAL.
VIRT. Anthelminthica : Quibusdam eadem æstimatur ac Polypod. filicis maris.
DOSIS *pulveris* : Drach. semis-j mane et vespere cum melle.

PTEROCARPUS DRACO. Resina.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; Americ. meridion. et Ind. orient.*
N. B. Resina promiscue ex hac planta et ex dracæna dracone et calamo rotang desumitur.
OF. *Sanguis draconis.* G. *Sang dragon.*
QUAL. Rubra; inodora; styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Profluvia; diarrhœa; hæmorrhagiæ.

PTEROCARPUS SANTALINUS. Lignum.
CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Santalum rubrum.* G. *Santale rouge.*
QUAL. Saturate rubra; tinctoria.
VIRT.
USUS.

PULMONARIA OFFICINALIS. Herba.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in sylvis.*
OF. *Pulmonaria maculosa.* A. *Common lungwort.*
QUAL. Sapor subsalsus, mucilaginosus, amaricans.
VIRT.
USUS.

PUNICA GRANATUM. Floris petala; cortex fructus; semen.

CL. *Icosand. O. Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Flores balaustiorum : Cortex Granatorum s. psydii s. malicorii.* G. *Le grenadier.* A. *Common pomme granate tree.*

QUAL. *rubra :* Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti vel infusi aquosi seu vinosi florum aut corticis externus* forma fotus, injectionis, gargarismatis : Prolapsus; laxitas uvulæ; blennorrhœa. — *Internus :* Diarrhœa.

DOSIS *flor. vel corticis :* Unc. j ad libram j aquæ vel vini rubri.

PYROLA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Decand. O. Monog.* *Perennis.*

OF. *Pyrola.* A. *Round leaved winter-green.*

QUAL. Sapor stypticus, amaricans.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PYRUS COMMUNIS. Fructus.

CL. *Icosand. O. Pentag.* *Arborea.*

OF. *Pyrus.* G. *Poire.* GE. *Birnen.* A. *Common pear tree.* H. *Peral commun.*

QUAL. Sapor dulcis, substypticus.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PYRUS CYDONIA. Fructus recens; semen; cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Cydonia.* G. *Coins.* GE. *Quitten.* A. *Common quince tree.* H. *Peral membrillero.*

QUAL. *fructus :* Odor gratus; sapor acido-stypticus : *Seminis :* Mucilaginosa.

VIRT. Adstringens; refrigerans. *Semin.* involvens. *Cort.* menagoga?

USUS.

PRÆP. Rob ex succo expresso cum saccharo inspissatum; mucilago seminum.

PYRUS MALUS. Fructus.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Poma borstorfiensia.* G. *Pomme.* GE. *Apfel.* A. *Common apple tree.* H. *Peral menzeno.*

QUAL. Sapor acido-dulcis.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *forma cataplasmatis :* Ophthalmia; ulcera putrida. *Decocti* : Febres.

N. B. Succus ex pomnis communibus, immaturis, (Anglis *crabs* dictis) expressus, in Anglia sub nomine *verjus* venditur.

Q.

QUASSIA AMARA. Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Cayen. Surinam.*
OF. *Quassia.* G. *Quassia.* GE. *Quassienholz.* A. *Quassy.* H. *Quasia amarga.*
QUAL. Eximia : Inodora; sapor intense et pure amarus.
VIRT. Stomachica; antacida; antiseptica.
USUS decocti (melius infusi) triturando cum aqua vel vino : Dyspepsia; intermittentes; arthritis; leucorrhœa.
DOS. Drach. ij - unc. semis infus. in libra j aquæ vel vini, cochleatim sumend. - Pulv. gr x.
PRÆP. Extractum.

QUASSIA SIMARUBA. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*
OF. *Simaruba.* G. *Simarouba.* GE. *Ruhrrinde.* A. *Winged leaved quassia.*
N. B. Quidam corticem simarubæ ex Bursera gummifera derivant.
QUAL. Inodora; sapor pure amarus.
VIRT. Stomachica; subadstringens; diuretica.
USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria atonica; intermittentes.
DOSIS *pulveris* : Drach. semis.-j. *Decocti* drach. ij-unc. semis ad libram j ß aquæ, ad colat. libra j. — Unc. semis-j sumenda omni bihorio vel trihorio.

QUERCUS CERRIS. Excrescentiæ a punctura insecti (*cynips quercus* dicti) ejusque nidum constituentes, *vulgo* Gallæ.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.*

OF. *Gallæ turcicæ.* G. *Noix de Galles.* GE. *Gallaepfel.* A. *Galls : Turkey oak-tree.*

QUAL. Præstans : Styptica.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS pulveris, decocti, unguenti : Varix ani; prolapsus; blennorrhœa.

QUERCUS ROBUR. Fructus seu glandes; cortex; folia; cupola glandis.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Quercus.* G. *Chêne ordinaire.* GE. *Eiche.* A. *Common oak tree.*

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; obstipans.

USUS *decocti glandium assatarum :* Tabes mesenterica infantum? Morbi cutis? -- *Externus foliorum, corticis & cupolæ glandis decoct. in vino rubro vel aqua* forma fotus, injectionis, gargarismatis : Prolapsus vaginæ, recti; relaxatio uvulæ; cynanche atonica; hæmorrhœæ; leucorrhœa; blennorrhœa. *Internus* in pulvere, infuso vinoso, vel decocto aquoso, præcipue cum amaris : intermittentes; blennorrhœa; diarrhœa.

DOSIS : Unc. j ad libram j vini rubri vel aquæ, cochleatim sumend. — *Pulveris cupolæ glandis :* Drach. semis.

PRÆP. Unguentum ex unc. vij axungiæ porcinæ cum drachm j pulveris gallarum. — Tinctura et infusum aquosum præcipue pro examine aquarum mineralium; acidum gallicum.

QUERCUS SUBER. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Cortex suberis.* G. *Liége.* A. *Cork-barked oak, or cork-tree.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *corticis* combusti mixti cum oleo fixo: Hæmorrhois.

R.

RADIX BENGALE. Obscura.

An eadem ac cassumuniar?

RADIX CALAGUALÆ.
——— CALAGUELLÆ. } Obscura.

Peruvian.

QUAL.

VIRT. Diuretica; deobstruens?

USUS.

RADIX CASSUMUNIAR. Obscura.

OF. *Radix cassumaniar* s. *Casumar* s. *Bengale* s. *Risagon.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, camphoratus.
VIRT. Stomachica; nervina; antispasmodica.
USUS.

RADIX CHYNLEN. Obscura.

Chinens.

QUAL. Sapor intense amarus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia; colica flatulenta.

RADIX COLUMBO. Obscura.

Zeylon.

SYN. *Radix Calombæ* s. *Colombæ* s. *Calumbæ.*
QUAL. Intense amara.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria. *Externus:* Ulcera.
DOSIS. Gr. XX-XXX.

RADIX IKAN. Obscura.

Chinens.

QUAL.
VIRT.
USUS.

RADIX LOPEZ. Obscura.

Afric; Ind. orient.

SYN. *Lopeziana radix.*
QUAL.
VIRT.
USUS. Alvi profluvia chronica.

RADIX MATALISTA. Obscura.
Americ.

QUAL.
VIRT. Cathartica.
USUS.

RADIX SERPENTARIÆ. *Vide* Aristolochia.
N. B. Ubi ad manus non est, eidem substitui posse radicem achilleæ millefolii nuper didicimus.

RADIX TIMAC. Obscura.
Ind. occident.

QUAL.
VIRT. Diuretica?
USUS. Hydrops.

RANUNCULUS ABORTIVUS. Folia.
CL. *Polyand.* O. *Polyg.*
QUAL. Acris; vesicans.
VIRT.
USUS. Syphilis?

RANUNCULUS ACRIS.
——— ALPINUS.
——— ARVENSIS.
——— BULBOSUS.
——— FLAMMULA.
——— ILLYRICUS.
——— LINGUA.
——— SCELERATUS.
——— THORA.

Folia, seu caulis recens.

CL. & O. *præced.* *In locis umbrosis.*

QUAL. Venenata : Acris ; corrodens.
VIRT.
USUS Foliorum ranunc. acris et ranunc. sceleratí, et bulbi ranunc. bulbosi *externus* : Arthrodynia rheumatica. *Carpo adplicata* forma pultis quibusdam horis ante paroxysmum et ibi relicta per 8 aut 12 horas : Intermittentes rebelles.
PRÆP. Aqua destillata ex Ranunculo flammula, et ran. lingua parata, emeticum præstantissimum præbet.

RANUNCULUS FICARIA. Radix recens.
CL. & O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Chelidonium minus.* GE. *Schollkrautwurzel.* A. *Pilewort crowfoot or lesser celadine.*
QUAL. Subinsipida.
VIRT. Cosmetica ; diuretica.
USUS. ?

RAPHANUS SATIVUS. Radix recens ; succus.
CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Hortensis.*
OF. *Raphanus.* G. *Radis.* GE. *Rettich.* A. *Common garden raddish.*
QUAL. In principio acri residens.
VIRT. Stimulans ; diuretica ; resolvens ; rubefaciens.
USUS *succi expressi* : Scorbutus ; asthma ; raucedo ; ischuria.

RHAMNUS CATHARTICUS. Baccæ ; sucus inspissatus.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Spina cervina.* G. *Nerprun.* GE. *Kreuzbeeren.* A. *Purging buckthorn.*

QUAL. Sapor nauseosus, amarus; odor ingratus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS *decocti*: Hydrops; cachexiæ; syphilis?

DOS. Drach. ij baccarum ad libram j aquæ.

PRÆP. Syrupus ex succo expresso et saccharo.

RHAMNUS FRANGULA. Cortex interior.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; in locis humidis, umbrosis, nemorosis.*

OF. *Frangula.* G. *Aune noir; bourdaine.* GE. *Faulbaumrinde.* A. *Black alder or berry-bearing alder.* H. *Arraclan.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelmintica.

USUS. Hydrops; psora; vermes; varix ani.

DOS. Drach. semis - ij.

RHAMNUS ZIZYPHUS. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Jujubæ.* A. *Shining-leaved rhamnus.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis.

VIRT. Lubricans; expectorans.

USUS. Tussis; stranguria.

PRÆP. Syrupus.

RHAMNUS JUJUBA. Baccæ.

CL. & O. *Præced.* *Ind. orient.*

A. *Blunt-levaed rhamnus*

QUAL. et VIRT. præced.

RHEUM PALMATUM. Radix.

CL. *Enneand.* O. *Trigyn.* *Perennis; Asiæ septent.; passim hortensis.*

OF. *Rhabarbarum verum* s. *Sibericum* s. *Turcicum.* G. *Rhubarbe.* GE. *Rhaharber.* A. *Officinal rhubarb.* H. *Ruibarbo.*

QUAL. Lutea: In principio mucilaginoso-resinoso et salino peculiari (*oxalas calcis*) præcipue residens. Odor radicis recentis nauseosus; sapor acris, amarus, substypticus, nauseosus.

N. B. Sal rhei, ex acido oxalico et calce constans, male pro selenite habitus fuit.

VIRT. Cathartica; roborans; antacida; stomachica; anthelminthica.

USUS. Diarrhœa; colica; dysenteria sub finem; rhachitis; obstructio viscerum abdom.

DOSIS *pulv.* Gran. x-drach. j. *Infus.* drach. j ad unc. vj-viij. aquæ.

PRÆP. Tinctura; syrupus; infusum aquosum alcalisatum *vulgo* tinctura aquosa.

RHEUM RHAPONTHICUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Rhaponticum.* G. *Rhapontic.* GE. *Rhapontikwurzel.* A. *Rhapontic rhubarbe.*

QUAL. Odor et sapor magis stypticus, sed minus nauseosus præcedent.

VIRT. Adstringens; cathartica debilior præced.

USUS. Diarrhœa; leucorrhœa.

RHEUM UNDULATUM. (PALLAS.) Radix.

AN rhabarbarum Chinense? — In frustis longis ex India orientali allatum.

A. *Wave-leaved rhubarb.*

VIRT. Cathartica; rheo palmato fortior.

RHODIOLA ROSEA. Radix.

CL. *Dicec.* O. *Octand.* *Perennis; alpina.*

OF. *Rhodia radix.* G. *Rhodiole.* GE. *Rosenwurzel.*
A. *Rose-root.*

QUAL. Fragrans odore roseo; rubicunda; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Leucorrhœa; cephalalgia.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

Stipites et herba.

CL. *Decand.* O. *Monog. Fruticosa; Asiæ septentr.; in montibus frigidis.*

OF. *Rhododendron chrysanthum.* G. *Rosage.* GE. *Sibirische schneerose.*

QUAL. In principio extractivo-amaro, adstringente et narcotico residens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Sudorifica; adstringens : fere instar ledi.

USUS *infusi* : Arthrodynia arthritica; rigiditas articulorum post podagram; contractura; paralysis.

DOSIS. Drach. ij—unc. semis ad unc. ix—xij aquæ calidæ per 24 horas digestæ. — Hujus infusi mane unc. ij sumend.

*

RHODODENDRON FERRUGINEUM.

VIRT. et USUS præced.

RHUS CORIARIA. Baccæ et semina.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Sumach.* A. *Elm-leaved sumach.*

QUAL. In principio acido intense adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; blennorrhœæ.

RHUS RADICANS. Folia.

VIRT. Acris; stimulans; diuretica.

USUS *extracti:* Phthysis pituitosa; melancholia; paralysis; herpes?

RHUS TOXICODENDRON. Folia.

USUS. Paralysis (ALDERSON); Herpes?

DOSIS *forma pulveris:* Gran. j—iv ter quaterve de die.

RIBES NIGRUM. Folia; baccæ recentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Ribes nigrum.* G. *Cassis.* GE. *Schwarze Johannis beeren.* A. *Common black currant.*

QUAL. Odor teter: Sapor acidulo-stypticus.

VIRT. *foliorum:* Diuretica; sudorifica.

USUS *infusi:* Rheumatismus; cynanche mucosa; dysenteria; morsura.

PRÆP. Roob fructus, et syrupus.

RIBES RUBRUM. Baccæ recentes; succus.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Ribes rubrum.* G. *Groseilles rouges.* GE. *Rothe Johannis beeren.* A. *Red currant.* H. *Agracejo.*

QUAL. Sapor intense acidus.
VIRT. Refrigerans.
USUS. Febres; scorbutus.
PRÆP. Roob; syrupus.

RICINUS COMMUNIS. Oleum ex semine decorticato expressum.

CL. *Monœc. O. Monadelph. Biennis; Indiæ utriusque.*
OF. *Cataputia major; ricinus major: Oleum ricini s. oleum palmæ christi* s. *oleum de kerua.* G. *Huile de ricin.* GE. *Palmoel; ricinusoel.* A. *Common palma christi.*
QUAL. *seminum:* Oleosa. *Corticis seminum:* Acris; venenata.
VIRT. *olei fixi seminum decorticat:* Leniter motum peristalticum ciens, cathartica; anthelminthica.
USUS *olei:* Obstipatio; dysenteria; ileus; nephritis; colica plumbea; tænia.
DOSIS. Unc semis-ij in haustu alcoholis diluti cum saccharo.

ROSA ALBA. Petala.

CL. *Icosand. O. Polygyn.* *Fruticosa; hortensis.*
QUAL. et VIRT. Rosæ gallicæ.

ROSA CANINA. Fructus a semine liberatus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*
OF. *Rosa sylvestris: Fructus cynosbati.* G. *Eglantier de chien; cynorrhodon.* GE. *Hagebutten; hahnebutten; wilde rose.* A. *Wild briar; hiptree, or dog-rose.*

QUAL. Odor fragrans; sapor dulci-stypticus.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.
PRÆP. Roob; conserva; decoctum.

ROSA CENTIFOLIA. } Petala.
——— DAMASCENA. }

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*
A. *Hundred leaved rose & damask rose.*
QUAL. et VIRT. Sequentis.
PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

ROSA GALLICA. Petala.
CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*
OF. *Flores rosarum rubrarum.* G. *Fleurs des roses.*
GE. *Rothe rosen.* A. *Red officinal rose.*
QUAL. Odor fragrans; sapor substypticus.
VIRT. Leviter adstringens.
USUS præcipue cosmeticus: Profluvia.
PRÆP. Infusum aquosum *vulgo* tinctura; conserva; mel; syrupus.
N. B. Fungi rosarum sunt exerescentiæ a punctura insecti, *Cyneps rosæ* dicti, ortæ.

ROSMARINUS OFFICINALIS. Folia; summitates florentes.
CL. *Diand.* O. *Monog.* *Hortensis; fruticosa.*
OF. *Rosmarinus Hispanicus* s. *hortensis: flores anthos.* G. *Romarin.* GE. *Rosmarin.* A. *Common rosemary.* H. *Romero officinal.*
QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; stomachica. *Externe:* Resolvens.

USUS *infusi:* Dyspepsia; chlorosis; hysteria; tertiana; asthenia nervosa.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

RUBIA TINCTORUM. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Rubia tinctorum.* G. *Garance.* GE. *Krappwurzel; færberroethe.* A. *Madder-root; dyers madder.*

QUAL. Præstans: In extractivo adstringente residens; rubra; styptico-amara.

VIRT. Adstringens; roborans; diuretica; urinam et ossa tingens.

USUS *decocti:* Pneumonitis notha; morbi pulmonum et hepatis pituitosi; rhachitis; physconia abdomin.; icterus; amenorrhœa.

DOS. Unc. j ad libram iij aquæ coctæ ad libram ij. Sumend. unc. iij ter quaterve de die.

RUBUS ARCTICUS. Baccæ; seu fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polygam.* *Fruticosa; Perennis; Norlandiæ.*

OF. *Baccæ Norlandicæ.* GE. *Norlandische Himbeeren.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acidulus.

USUS. Synochus; febres biliosæ.

RUBUS CHAMÆMORUS. Fructus recens.

A. *Mountain bramble or cloud berry.*

QUAL. Inodora; aquosa.

VIRT. Refrigerans.
USUS.

RUBUS IDÆUS. Fructus recens.
CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; Perennis.*
OF. *Fructus rubi idæi.* G. *Framboises.* GE. *Himbeeren.* A. *Raspberry.*
QUAL. Sapor acidulo-dulcis; odor gratus; fragrans.
VIRT. Refrigerans.
USUS. Febres; scorbutus.
PRÆP. Aqua; succus; roob; acetum.

RUMEX ACETOSA. Herba recens; radix; semen.
CL. *Hexandr. O. Trigyn.* *Perennis.*
OF. *Acetosa vulgaris s. nostras.* G. *Oseille ordinaire.* GE. *Sauerampfer.* A. *Garden sorrel.* H. *Acedera.*
QUAL. *Herbæ recentis:* Sapor acidus. *Radicis & seminum* Acido-austerus, amarus.
VIRT. Antiseptica.
USUS *herbæ recentis vel succi:* Scorbutus; morbi cutis. *Herbæ contusæ* forma cataplasmatis: ulcera scrophulosa.

RUMEX ACUTUS. Radix; herba; semen.
CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis humidis.*
OF. *Lapathum acutum; oxylapathum.* G. *Patience aiguë.* GE. *Grindwurzel.* A. *Sharp-pointed dock.*
QUAL. Styptica; nauseosa; sapor amaricans, acidulus.
VIRT. Adstringens.

USUS *decocti radicis* : Psora, aliique morbi cutis. *Extern.* ulcera laxa.

RUMEX ALPINUS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina; Europ. austr.*

OF. *Rhabarbarum monachorum.* A. *Alpine dock or monks rhubarb.*

QUAL. Sapor amaro-austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Ulcera.

RUMEX CRISPUS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

A. *Curld dock.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RUMEX HYDROLAPATHUM. (*Hort. Kew.*) Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Lapathum aquaticum; hydrolapathum.* G. *Patience aquatique.* GE. *Wasser-ampfer.* A. *Water-dock.*

QUAL. Sapor amarus, acris, stypticus.

VIRT. Adstringens; resolvens.

USUS *decocti* : Morbi cutis; stomacace? *Extern.* forma lotionis : Ulcera.

DOSIS : Drach ij-unc. semis ad libram j aquæ.

RUMEX PATIENTIA.

A. *Patience dock or rhubarb.*

RUMEX SANGUINEUS. Radix.
CL. & O. *præced.* *Biennis.*
OF. *Lapathum sanguineum.* A. *Bloody dock.*
QUAL. Sapor austerus.
VIRT. Adstringens.
USUS. Dysenteria; ulcera.

RUMEX SCUTATUS. Herba.
CL. & O. *præced.* *Biennis; Europ. austr.*
OF. *Acetosa rotundifolia.* A. *French-sorrel.*
QUAL. Sapor grate acidus.
VIRT. Refrigerans.
USUS.

RUSCUS ACULEATUS. Radix.
CL. *Diœc.* O. *Syng.* *Fruticosa; alpina.*
OF. *Ruscus; bruscas.* GE. *Mausdorn-wurzel.* A. *Prickly butchers-broom.*
QUAL. Sapor subdulcis, dein amarus; fere ut solani dulcamaræ.
VIRT. Roborans; diuretica; resolvens.
USUS *decocti:* Physconia abdom.; morbi cutis; icterus; hydrops.

RUSCUS HYPOGLOSSUM. Herba.
CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Europ. austr.*
OF. *Uvularia.* A. *Double leaved butchers-broom.*
QUAL.
VIRT. Adstringens.
USUS. Laxitas uvulæ.

RUTA GRAVEOLENS. Herba; semen.

N. B. Colligenda anteqnam flores emittit.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Suffruticosa, Perennis; alpina; hortensis.*

OF. *Ruta hortensis.* G. *Rue sauvage.* GD. *Raute; weinraute.* A. *Common rue.* H. *Ruta de olor pesado.*

QUAL. Heroica: In oleo volatili residens; odor teter; sapor nauseosus, acris, amaricans.

VIRT. Sudorifica; carminativa; antiseptica; antispasmodica; menagoga; anthelminthica; phthiriaca; resolvens; rubefaciens.

USUS *internus* infusi, aut decocti aquosi vel vinosi: Hysteria cum amenorrhœa; spasmi; cephalalgia; singultus; epilepsia; flatulentia. *Externus* decocti vinosi cum melle rosaceo: Ozæna et exulceratio gingivarum putrida cum carie alveolarum dentium (PLENK). Forma fotus aut cataplasmatis: Gangræna, ulcera putrida. — Halitus hominis sani qui rutam masticavit, oculo aperto admissus caligini seu debilitati visus e lectura assidua profuit. Eodem scopo vapor decocti per infundibulum oculo admissus servire potest.

PRÆP. *ex herba*: Acetum; oleum volatile; aqua; conserva; extractum ope alcoholis paratum.

S.

SAGUS SEU PALMA FARINARIA. (RUMPHII). Farina medullæ. *Palma; Ind. orient.*

LINNÆUS grana sagu ex Filice : *Cicas circinalis* dicto derivat.

OF. *Sagu seu sago grana.*

N. B. Grana trituratione medullæ cum aqua et exsiccatione parantur.

QUAL. Farinacea; mucilaginosa.

VIRT. Nutritiva.

USUS. Cum succo citri et aliquando cortice flavo citri, cinnamomo et saccharo : Dysenteria; tabes.

SACCHARUM OFFICINARUM. Succus plantæ expressus, inspissatus et crystallisatus.

CL. *Triand. O. Digyn.* *Perennis; Ægypt.; Ind. orient. & occident.*

OF. *Saccharum album; canthum.* G. *Sucre.* GE. *Zucker.* A. *Sugar : common sugar cane.* H. *Azucar.*

QUAL. In principio acido et mucilaginoso residens : Sapor gratus; salino-dulcis.

VIRT. Demulcens; antiseptica; nutriens.

USUS. Raucedo; tussis. *Extern.* pulvis oculo inflatus : Macula corneæ.

PRÆP. Syrupus simplex; alcohol dilutum *Rhum* dictum; acidum oxalicum. -- Saccharum est ingrediens universale conservarum et syruporum.

SALIX ALBA.
——— AMYGDALINA.
———PENTANDRAetc. } Cortex ramulorum.

CL. *Diœc.* O. *Diand.* *Arborea.*

OF. *Salix.* G. *Saule.* GE. *Weidenbaum.* A. *Willow-tree.* H. *Sauce.*

QUAL. Sapor amaro-stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS præcipue ut succedaneum cinchonæ: Intermittentes, aliique morbi in quibus cinchona officinalis adhibetur.

N. B. Diversæ salicis species easdem fere virtutes habent sed *Amygdalinam* cæteris efficaciorem invenit C. KORTUM.

DOSIS *pulveris:* Gran. xx—drach. j. *Decocti:* Unc. semis—j. in libra una semis aquæ coquendo ad libr. j.

PRÆP. Extractum.

SALVIA HORMINUM. Semen.

CL. *et* O. *præc.* *Perennis; hortensis.*

VARIET. A. *Coma violacea.* B. *Rubra.*

OF. *Semen hormini.* A. *Purple et red topped sage.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Ophthalmia.

SALVIA OFFICINALIS. Folia; herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Salvia.* G. *Sauge.* GE. *Salbey.* A. *Garden sage.* H. *Salvia.*

*

QUAL. In oleo volatili et extractivo adstringente residens; odor fortis, fragrans; sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga. *Extern.*: Resolvens.

USUS *infusi vinosi*: Tumor mammarum ex lacte post ablactationem (VAN SWIETEN); leucorrhœa. — *Infusi aquosi* forma gargarismatis: Cynanche mucosa; relaxatio gingivarum.

SALVIA SCLAREA. Herba.

CL. *et* O. *præced.* *Biennis; Europ. austr.*

OF. *Sclarea; gallitrichum.* G. *Orvale ou toute-bonne.* A. *Common clary.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Fortior præced. nervina; errhina.

USUS. Leucorrhœa; colica; hysteria.

SALSOLA KALI aliæve species. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Europ. maritimæ austr.*

PRÆP. Soda.

SAMBUCUS EBULUS. Baccæ recentes; cortex interior; folia; flores; semen; radix.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa.*

OF. *Ebulus.* G. *Hieble; sureau nain.* GE. *Attich; nieder hollunder.* A. *Dwarf-elder, or danewort.*

QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor acris, nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; narcotica.

USUS *decocti* cort. et foliorum: Hydrops; psora; leucorrhœa.

DOSIS foliorum vel corticis drachj-ij. *Succi baccarum* unc. semis-j.

FRÆP. Roob baccarum.

SAMBUCUS NIGRA. Cortex interior; Turiones; flores; baccæ recentes.

OF. *Sambucus.* G. *Sureau ordinaire.* GE. *Hollunder; flieder.* A. *Common black-berried elder.*

QUAL. et VIRT. *corticis & turionum:* Eadem ac prioris. *Baccarum:* Sapor grate acidulus.

VIRT. *florum:* Diaphoretica. *Extern.* resolvens.

USUS *infusi corticis vel turionum*: Hydrops; erysipelas.

DOSIS *florum, corticis vel turionum:* Drach. ij-unc semis ad libr. j aquæ pro infuso.

PRÆP. Roob ex baccis recentibus: Febres.

SANGUISORBA OFFICINALIS. Radix.

CL. *Tetrand. O. Monog. Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Pimpinella Italica; sanguisorba.* G. *Pimprenelle noire.* GE. *Schwarze biberuellwurzel.* A. *Common burnet-saxifrage.*

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS. Hæmarrhagiæ; *sub finem* dysenteriæ.

SANICULA EUROPÆA. Herba.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis; in pratis.*

G. *Sanicle.* A. *Common sanicle.*

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Resolvens?

USUS.

SANTALUM ALBUM. Lignum.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

Idem ac *Sirium myrtifolium* Linn. esse videtur (DRIANDER).

OF. *Santalum citrinum* s. *album.* G. *Santal.* GE. *Weisses, gelbes sandel-holz.* A. *Yellow saunder.*

QUAL. Ligni citrini: In oleo volatili et principio resinoso residens; odor fragrans, subambrosiacus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; sudorifica.

USUS. Rheumata.

SANTOLINA CHAMÆ CYPARISSUS. Herba; folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Abrotanum montanum; abrotanum fœmina; santolina.* G. *Aurone femelle.* GE. *Zypressenkraut.* A. *Lavender-cotton.*

QUAL. Odor nidorosus; sapor grate aromaticus, amarus.

VIRT. Roborans; carminativa; anthelminthica.

USUS. Leucorrhœa; vermes.

SAPINDUS SAPONARIA. Fructus.

CL. *Octand. O. Trigyn.* *Arborea; Brasil. & Jamaic.*

OF. *Nuculæ saponariæ.* A. *Common soap-berry.*

QUAL. Spumescens, saponacea; sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; deobstruens.

USUS *extracti vel tincturæ* : Chlorosis. (Lewis).

SAPONARIA OFFICANILIS. Radix; folia.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Perennis; hortensis; in pratis humidis, profundis.*

OF. *Saponaria.* G. *Saponaire.* GE. *Seifenkraut.* A. *Common soapwort.* H. *Xabonera.*

QUAL. *radicis recentis* : Trita spumescens; saponacea; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti*: Morbi cutanei; blennorrhagia; icterus; syphilis? Ulcus phagedænicum? Leucorrhœa.

SATUREJA CAPITATA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Suffruticosa; Cretæ & Archipel.*

OF. *Thymus Creticus.* A. *Ciliated savory.*

QUAL. et VIRT. Thymi sed fortior.

USUS.

SATUREJA HORTENSIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis; Europ. austr.*

OF. *Satureja.* G. *Sarriete.* GE. *Pfefferkraut.* A. *Summer savory.* H. *Axedrea.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Nervina; stimulans; menagoga; stomachica; aphrodisiaca?

USUS. Anorexia; anaphrodisia.

SAXIFRAGA CRASSIFOLIA. Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

QUAL.

VIRT. Eximie antiseptica. (PALLAS).

USUS.

SAXIFRAGA GRANULATA. Radix; semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina.*

OF. *Saxifraga alba.* G. *Weisse steinbrechwurzel.* A. *White saxifrage or sengreen.*

QUAL. Acris; pungens.

VIRT. Diuretica.

USUS.

SCABIOSA ARVENSIS. Herba; flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Scabiosa.* G. *Scabieuse ordinaire.* GE. *Skabiose.* A. *Field Scabious.*

QUAL. Sapor leviter amarus.

VIRT.?

USUS. Morbi cutis; psora?

SCABIOSA SUCCISA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis, nemorosis.*

OF. *Succisa; morsus diaboli.* A. *Devil's-bit scabious.*

QUAL. Sapor dulco-amaricans.

VIRT.

USUS.

SCANDIX CEREFOLIUM. Herba recens.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; hortensis.*

OF. *Chærefolium; cerefolium; chærophyllum.* G. *Cerfeuil.* GE. *Kœrbelkraut.* A. *Garden cicely or chervil.* H. *Perifollo.*

QUAL. Leniter odorifera; aromatica.
VIRT. Diuretica; deobstruens; lactifera.
USUS. Hæmoptysis? tabes? hæmorrhois? physconia abdominalis.

SCILLA MARITIMA. Radix recens, vel siccata.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr. ad littora maris arenosa.*
OF. *Radix squillæ alba & rubra.* G. *Scille; squille.* GE. *Meerzwiebel.* A. *White and red rooted officinal squill or sea-onion.* H. *Cebolla albarruna.*
QUAL. Heroica: In principio acri volatili residens; sapor intense amarus, nauseosus, acris.
VIRT. Diuretica; expectorans; emetica; cathartica.
USUS. Hydrops; icterus; pneumonia notha; asthma pituitosum (cum opio, aut aromate, aut hydragyro). *Extern.* Ventri adfric. Hydrops.
DOSIS *radicis recentis:* Gran V–XX. *Siccatæ:* Gr. ij-vj. --- In infuso drach. ij ad libr. j vini.
PRÆP. Infusum vinosum; acetum; oxymel scilliticum.

SCORZONERA HISPANICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis; hortensis.*
OF. *Scorzonera.* G. *Scorsonére.* GE. *Skorzonerwurzel.* A. *Garden-vipers grass or scorzonera.* H. *Escorzonera de Espanna.*
QUAL. Oleracea; mucilaginosa.
VIRT.?
USUS.

SCORZONERA HUMILIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis apricis.*

OF. *Radix scorzoneræ.* A. *Dwarf vipers-grass.*

N. B. Pharmacopolæ huic scorzoneram Hispanicam sæpe substituunt.

QUAL. Amaricans; lactescens.

VIRT.

USUS.

SCROPHULARIA AQUATICA. Folia.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; in aquosis, paludosis; Europ. austr.*

OF. *Scrophularia aquatica.* G. *Grande scrofulaire.* GE. *Wasserbetönie; wasserbraunwurzel.* A. *Water figwort.*

QUAL. Odor debilis fœtidus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS. Sennæ addita in infuso saporem ejus nauseosum corrigit.

SCROPHULARIA NODOSA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in fossis & humidis umbrosis.*

OF. *Scrophularia fœtida.* GE. *Kropfwurzel; braunwurzel.* A. *Knobby rooted figwort.*

QUAL. Præstans: Odor teter, fœtidus, siccando avolans; sapor amaricans, nauseosus.

VIRT. Carminativa; anthelminthica; sudorifica.

USUS. Scrophula; varix ani; psora; cynanche.

SCUTELLARIA GALERICULATA. Herba.

CL. *Didyn.* O *Angiosp.* *Perennis; ad stagna & fossas.*

OF. *Herba tertianariæ.* A. *Common skull-cap, or hooded willow-herb.*

QUAL. Odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT.

USUS.

SECALE CEREALE. Seminis farina; fermentum panis.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Secale.* G. *Seigle.* GE. *Roggen.* A. *Rye.* H. *Centeno cereal, ò de pan.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens. *Fermenti:* Leniter irritans.

USUS fermenti panis pro sinapismis.

SEDUM ACRE. Herba recens; succus expressus.

CL. *Decand.* O. *Pentag.* *Perennis, sempervirens.*

OF. *Sedum minus.* G. *Vermiculaire brûlante.* GE. *Hauslach, Mauerpfeffer.* A. *Wall stone-crop or pepper.*

QUAL. In principio acri residens; subcorrosiva.

VIRT. Diuretica; emetica.

USUS *herbæ recentis contusæ:* Cancer; ulcus phagedænicum.

SEDUM TELEPHIUM. Radix; herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Telephium; crassula major.* A. *Common white orpine.*

QUAL. Sapor mucilaginosus, subacidus.

VIRT.

USUS. Varix ani; paronychia; scorbutus.

SEMECARPUS ANACARDIUM. Fructus.

CL. *Pentand. O. Trigyn.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Anacardium orientale* s. *anacardium verum officinarum.* G. *Noix à marquer.*

QUAL. *nucis*: Oleosa. *Succi inter corticem fructus externum & internum*: acris, ad notanda lintea caracteribus nigro-fuscis utilis.

VIRT. *Nuclei*: Nutriens: *Putaminis* caustica.

USUS. Succus acris cum oleo et saccharo in syphilitide adhibetur in India orientali; item in morosi et oblivione.

SEMEN ADIOWAEN.(BENGALIS).Obscura

An Ammi Copticum? *Ind. orient.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor gratus, aromaticus, quasi ex satûreja et mentha piperita compositus.

VIRT. Excitans; stimulans; carminativa.

USUS. Asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; cardialgia.

SEMEN AJAVÆ. Obscura.

Ind. orient.

USUS. Arthritis vaga, atonica.

SEMPERVIVUM TECTORUM. Succus herbæ recentis.

CL. *Dodecand. O. Dodecag.* *Perennis.*

OF. *Sedum* s. *sempervivum majus.* GE. *Hauswurzel; grosser hauslauch.* A. *Common house-leek.*

QUAL. *succi* : Sapor acido-austerus; acriusculus.
VIRT. Refrigerans; adstringens.
USUS. Febres; combustura; aphtha; clavus.

SENECIO VULGARIS. Herba.
CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*
OF. *Herba senecionis.* G. *Seneçon ordinaire.* A. *Common groundsel.*
QUAL. Sapor salsus; oleraceus.
VIRT. Anthelminthica.
USUS forma cataplasmatis scopo emolliendi et resolvendi. *Internus succi* : Vermes equorum (Anglis *Botts* dicti); lumbrici.

SERRATULA AMARA.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*
A. *Sawwort.*
QUAL.
VIRT.
USUS *decocti* : Intermittentes; syphilis?

SESAMUM ORIENTALE. Oleum seminis expressum.
CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Annua; Chinæ et Japon.*
OF. *Semen sesami.* G. *Grains de sesame.* A. *Oriental sesamum, or oily grain.*
QUAL. Oleosa.
VIRT. Emolliens.
USUS. Dolores; pruritus; marasmus; phlegmone.

SESELI TORTUOSUM. Semen.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Europ. austr.*
OF. *Seseli Massiliense.* A. *Hard meadow saxifrage.*
QUAL. Sapor acris; odor aromaticus.

*

SIGESBECKIA ORIENTALIS. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor amarus.

VIRT.

USUS. Stranguria; calculus? Podagra? Leucorrhœa?

SINAPIS ALBA. Semen; farina seminis.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliq.* *Annua.*

OF. *Semen erucæ s. sinapios albæ.* G. *Sénevé blanc.* GE. *Weisser oder gelber senf.* A. *White mustard.*

QUAL. In principio acri cum oleo volatili et fixo residens.

VIRT. Rubefaciens; stimulans.

USUS *externus* in sinapismis. *Internus* idem ac sequentis.

SINAPIS NIGRA. Semen; farina seminis.

CL. *et* O. *præced.* *Annua; in campis sub tritico; hortensis.*

OF. *Semen sinapeos nigræ.* G. *Sénevé noir; grains de moutarde.* GE. *Schwarzer senf.* A. *Common black mustard.* H. *Mostaza nigra.*

QUAL. Eadem sed præstantior et acrior priori.

VIRT. Stimulans; subemetica; diuretica; cathartica. *Externe:* Rubefaciens; vesicans.

USUS *internus:* Dyspepsia; asthma pituitosum; obstipatio; scorbutus; hydrops; intermittentes; paralysis. *Externus:* Herpes; arthrodynia rheumatica.

DOSIS *seminum integrorum :* Drach. ij-unc. semis.
PRÆP. Serum Sinapinum : Farina pro sinapismis.

SISON AMOMUM. Semen.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.*
OF. *Amomum vulgare.* A. *Field honeywort.*
QUAL. Sapor grate aromaticus, amaricans.
VIRT. Stimulans; carminativa.
USUS. Flatulentia; sterilitas?

SISYMBRIUM NASTURTIUM. Herba recens; succus expressus.
CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *In rivis & locis humidis.*
OF. *Nasturtium aquaticum.* G. *Cresson de fontaine.*
GE. *Brunnen-kresse.* A. *common water-cresses.*
QUAL. In principio acri residens; sapor acris, amaricans; trita odorem pungentem spargens.
VIRT. Diuretica; antiscorbutica.
USUS. Scorbutus; obstipatio.
PRÆP. Succus, dosi unc. ij; conserva.

SISYMBRIUM SOPHIA. Semen.
CL. & O. *præced.* *Annua; in sabulosis.*
OF. *Semen sophiæ.* A. *Flix-weed.*
QUAL. In principio acri residens; acris; fervida.
VIRT. Anthelminthica.
USUS.

SISYMBRIUM TENUIFOLIUM.
CL. & O. *præced.* *Biennis.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac Sisymb. nasturtii.

SIUM NINSI. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis; Japonica.*

OF. *Radix ninsi; ninzin; ninsing.*

QUAL. Sapor subdulcis, amaricans, suavis, subaromaticus.

VIRT. Cardiaca; impinguans.

USUS. Anaphrodisia? asthenia; marasmus?

SIUM NODIFLORUM. Succus herbæ.

A. *Creeping water-parsnep.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Morbi cutis (WITHERING).

DOSIS *succi*: Unc. j-iv. Omni mane.

SMILAX CHINA. Radix.

CL. *Diœc. O. Hexand.* *Perennis; Chinæ, Persiæ.*

OF. *Radix Chinæ orientalis.* G. *Squine; esquine.* GE. *Chinawurzel.* A. *Chinese smilax.*

QUAL. Inodora; sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Syphilis; podagra?

DOSIS. Unc. j ad libram j aquæ.

SMILAX SARSAPARILLA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa; Perennis; Peruv. Mexic. Brasil.*

OF. *Radix sassaparillæ.* G. *Salsepareille.* GE. *Sassaparilla.* A. *Sarsaparilla, or medicinal smilax.* H. *Zarzaparilla.*

QUAL. Præstans: Sapor mucilaginosus, amaricans.

VIRT. Diuretica; diaphoretica; alterans.
USUS. Syphilis; cachexiæ; arthritis.
DOS. *pulveris* : Drach. j-ij. — In decocto unc. j ad libr. ij aquæ coctæ ad libr. j.

SOLANUM DULCAMARA. Stipites repentes.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Sarmentosa; in locis humidis, umbrosis.*
OF. *Dulcamara.* G. *Douce-amère; morelle grimpante.* GE. *Alpranken; bittersüss.* A. *Bitter-sweet, or common woody night-shade.* H. *Solano dulce-amargo.*
QUAL. *recentis* : Heroica : Odor teter, virosus; sapor amaro-dulcis, nauseosus.
VIRT. Diuretica; alterans; resolvens.
USUS *decocti* : Arthrodynia; morbi cutis; amenorrhœa; icterus; syphilis; dislochia; contusura.
DOSIS *stipitum recent. contusorum* : Unc. semis-ij ad libram iij aquæ coctæ ad libras ij. Quotidie sumatur libr. j-ij cum vel sine lacte.

SOLANUM NIGRUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua.*
OF. *Solanum vulgare.* G. *Morelle à fruit noir.* GE. *Nachtschatten.* A. *Common nightshade.* H. *Solano nigro; yerba mora.*
QUAL. Venenata : in principio narcotico residens; Odor teter, virosus.
VIRT. Narcotica; diuretica; resolvens.

USUS. Idem ac papaveris somniferi. *Extern.* Proctalgia; phlegmone; paronychia; scirrhus; ulcus.
DOS. *pulveris :* Gran j-vj.

SOLDANELLA ALPINA. Folia.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*
A. *Alpine soldanelle.*

SOLIDAGO VIRGA AUREA. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina in montibus nemorosis.*
OF. *Virga aurea; consolida Saracenica.* G. *Verge d'or.* GE. *Heidnisch wund-kraut.* A. *Common golden rod.*
QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Diuretica.
USUS. Ulcus; calculus.

SONCHUS OLERACEUS. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*
OF. *Sonchus.* G. *Laitron doux.* A. *Common sow-thistle.*

SOPHORA HEPTAPHYLLA. Radix; semen.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*
OF. *Anticholerica.*
QUAL. *utriusque :* Sapor intense amarus.
VIRT.
USUS. Cholera; colica; dysuria.

SORBUS AUCUPARIA. Baccæ.
CL. *Icosand.* O. *Trigyn.* *Arborea.*
A. *Mountain ash, or service tree.*

QUAL. *succi* : Sapor acido-amarus.
VIRT.
USUS *forma Roob* : Hydrops; calculus renalis; stranguria rebellis?

SORBUS DOMESTICA. Fructus seu baccæ.
CL. & O. *præced.* *Arborea.*
OF. *Sorbus.* G. *Sorbier.*
QUAL. Sapor acido-acerbus.
VIRT. Adstringens.
USUS.

SPARTIUM SCOPARIUM. Herba; summitates; semen.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Fruticosa; in arenosis, umbrosis.*
N. B. A quibusdam Genista tinctoria huic plantæ substituitur.
OF. *Genista.* G. *Génêt à palais.* GE. *Gins; pfriemkraut.* A. *Common broom.* H. *Esparto.*
QUAL. Sapor amarus, nauseosus.
VIRT. Diuretica; cathartica.
USUS. Hydrops.
DOSIS *summitatum recentium* : Unc. semis ad unc. xvj aquæ coctæ ad unc. viij. Sumatur unc. semis omni bihorio, donec alvum et urinam moveat, et repetatur quotidie seu alternis diebus. (CULLEN).
PRÆP. Extractum; infusum, et decoctum.

SPIGELIA ANTHELMIA. Herba et radix.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; Ind. occident.*

A. *Annual worm-grass.*
QUAL. Tetra; fœtida.
VIRT. Narcotica; anthelminthica.
USUS. Lumbrici.

SPIGELIA MARILANDICA. Herba.
CL. & O. *præced.* *Perennis; Amer. septentr.*
OF. *Spigelia* A. *Indian pink; pinkroot or perennial worm-grass.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.
USUS *pulveris, vel infusi aut decocti:* Lumbrici.
DOS. *pulveris:* Gran x. -- *In infuso:* Drach. ij ad libram j aquæ. -- *In decocto:* Unc. semis ad libram j aquæ.

SPILANHUS ACMELLA. Herba; semen.
CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*
OF. *Acmella.* A. *Balm-leaved spilanthus.*
QUAL. Amara; sapore odoreque Sigesbeckiæ.
VIRT. Diuretica; menagoga.
USUS. Hydrops; ischuria; calculus; leucorrhœa.

SPINACIA OLERACEA. Folia.
CL. *Diœc.* O. *Pentand.* *Annua.*
G. *Epinard.* GE. *Spinat.* A. *Spinage.*
QUAL. Aquosa; oleracea.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.

SPIRÆA FILIPENDULA. Radix, herba.
CL. *Icosand* O. *Pentag.* *Perennis; in locis humidis, paludosis.*

OF. *Filipendula; saxifraga rubra.* A. *Single flowered dropwort, or filipendula.*
QUAL.
VIRT. Adstringens.
USUS. Leucorrhœa; hernia.

SPIRÆA ULMARIA. Radix; folia.
CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis.*
OF. *Ulmaria; barba caprina.* G. *Reine des prés.* GE. *Bocksbart.* A. *Meadow-sweet.*
QUAL. Odor fragrans; sapor stypticus.
VIRT. Adstringens; sudorifica.
USUS Dysenteria; hernia?

STACHIS ANNUA.
——— RECTA. } Herba.
CL. *Didyn.* O. *Gymnops.* *In collibus petrosis, siccis.*
OF. *Herba sideritidis.*
QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS.

STACHIS SYLVATICA. Herba.
OF. *Galiopsis.*
QUAL. Tetra; fœtida.
VIRT. Narcotica.
USUS.

STATICE LIMONIUM. Radix.
CL. *Pentand.* O. *Pentag.* *Ad littora maris.*
OF. *Behen rubrum.* A. *Common sea thrift, or lavender.*

QUAL. Styptica.
VIRT. Adstringens.
USUS. Asthenia; hæmorrhagiæ.

STILLINGIA SYLVATICA.

CL. *Monœc.* O. *Monadelph.*
VIRT.
USUS. Syphilis?

STRYCHNOS COLUBRINA. Radix; lignum radicis.

N. B. An eadem arbor ac strychnos nux vomica?
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Lignum colubrini vulgaris.*
QUAL. Suspecta: Sapor intense amarus, acris.
VIRT. Emetica; sudorifica; anthelminthica; fatuans.
USUS. Intermittentes; vermes. — Morsura serpentum?

STRYCHNOS NUX VOMICA. Fructus seu nuces; lignum.

CL. & O. *præcad.* *Arborea; Ind. orient.*
OF. *Nux vomica.* G. *Noix vomique.* GE. *Kræhenaugen.* A. *Poison-nut.* H. *Matta perros.*
QUAL. Venenata: Sapor intense amarus; odor virosus.
VIRT. Emetica; menagoga; anthelminthica.
USUS. Intermittentes; dysenteria; cardialgia; amenorrhœa; tænia.
DOSIS *pulveris*: Gran V-XV. In tænia scrup. j.

STRYCHNOS VOLUBILIS. (PALLAS). Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*

Ignatia amara (LINN. JUN.)

OF. *Faba Ignatii.* G. *Vomiquier; fève S. Ignace.* GE. *Ignatius-bohne.* A. *Jesuits-bean.*

QUAL. Venenata: Sapor intense amarus.

VIRT. Narcotica; diuretica; sudorifica; anthelminthica.

USUS *pulveris, vel infusi:* Intermittentes rebelles; amenorrhœa; vermes; asthma; ecclampsia.

DOSIS: Gran. v—xx.

N. B. Ejus antidotum est acetum.

STYRAX BENZOIN. (DRIANDER.) Balsamum concretum.

CL. *Decand.* O. *Monog. Arborea; Javæ, Sumatræ.*

OF. *Gummi benzoes; assa dulcis.* G. *Benjoin.* GE. *Benzoe.* A. *Benjamin; benzoine.*

N. B. Purior albicans incisione exsudans mollis; vilior colorata durior est.

QUAL. In acido peculiari et principio resinoso residens: Sapor acris, pungens; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; expectorans.

USUS *acidi:* Morbi pectoris pituitosi. *Externus:* Rubedo faciei. Item ad suffimigia et ad parandum acidum Benzoicum.

DOSIS *salis acidi:* Gran. xv ad drach. semis.

PRÆP. Acidum Benzoicum vulgo *flores Benzoes;* tinctura.

*

STYRAX OFFICINALIS. Balsamum concretum.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea; Syriæ.*

OF. *Storax; gummi storacis; styrax calamita.* G. *Storax.* GE. *Storax.* A. *Officinal storax.*

QUAL. Sapor acris; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina.

USUS Idem ac præced. *Externus:* Ad suffimigia; et emplastra.

SWIETENIA FEBRIFUGA (ROXBURGH). Cortex ligni.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

QUAL. Sapor amaro-adstringens.

VIRT. Roborans, cinchonæ æmula.

USUS. Febres intermittentes, atonicæ; ulcera.

SWIETENIA MAHOGANI. Cortex ligni. *Arbor. Ind. occident.*

VIRT. et USUS præcedent.

SYMPHYTUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis et cimeteriis.*

OF. *Symphytum; consolida major.* G. *Grande consoude.* GE. *Schwalbenwurzel; schwarzwurzel.* A. *Common comfrey.* H. *Symphyto officinal.*

QUAL. Principio mucilaginoso scatens.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti:* Stranguria; dysenteria; nephritis; hæmoptysis; hæmaturia.

T.

TAMARINDUS INDICA. Fructus; pulpa fructus.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Fructus tamarindi.* G. *Tamarins.* GE. *Tamarinden.* A. *Tamarind tree.*

QUAL. In acido et extractivo saccharino-mucilaginoso residens; sapor acidus.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *decocti vel seri lactis* : Febres inflammatoriæ et biliosæ; icterus; dysenteria.

DOSIS *in decocto* : Unc. ij ad libram j aquæ vel seri lactis.

PRÆP. Pulpa unc. j ij pro dosi. Serum lactis tamarindinatum.

TAMARIX GALLICA. Cortex radicis; folia.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

A. *French tamarisk.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

TANACETUM BALSAMITA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Europ. austr.*

OF. *Balsamita; costus hortorum; mentha Romana seu Saracenica; tanacetum hortense.* A. *Frauenmünze; Rœmische münze.* A. *Cost-mary.*

QUAL. Præstans : Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS.

TANACETUM VULGARE. Herba; flores; semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Tanacetum.* G. *Tanaisie.* GE. *Reinfahrenkraut; wurmkraut.* A. *Common tansey.*

QUAL. Præstans : In oleo volatili cum principio amaro juncto residens : Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus. Luteo-tinctoria.

VIRT. Stimulans; carminativa. *Extracti :* Pure amara, stomachica. --- *Seminum :* Anthelmintica? sudorifica.

USUS *infusi vinosi vel aquosi, aut extracti :* Dyspepsia; intermittentes; chlorosis; leucophlegmatia; hydrops; hysteria. --- *Infusi florum vel seminum* forma enematis : Lumbrici.

DOSIS *herbæ :* Unc. j ad libram aquæ vel vini. --- *Seminum pulv.* Gran. XX. Pro infuso drach. ij-iij ad libram semis aquæ vel lactis.

PRÆP. Extractum.

TEUCRIUM CHAMÆDRYS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in montanis siccis.*

OF. *Chamædrys.* G. *Germandrée officinale, petit chêne.* GE. *Aechter gamander; germanderlein.* A. *Creeping or Common germander.*

QUAL. Præstans : Odor aromaticus, fragrans ; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; sudorifica ; menagoga.

USUS *infusi* : Intermittentes ; arthritis ; chlorosis.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua ; hortensis.*

OF. *Chamæpitys ; Jua arthritica.* G. *Petite ivette.* GE. *Feldzypresse.* A. *Ground-pine germander.* H. *Pinillo.*

QUAL. Præstans : Odor resinosus ; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans ; stomachica ; menagoga ; discutiens.

USUS *infusi* : Arthrodynia ; arthritis.

DOS. Drach. ij-iij ad libram j aquæ.

TEUCRIUM CRETICUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Polium creticum.*

QUAL. Sapor amaricans, aromaticus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Icterus.

TEUCRIUM MARUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa ; hortensis.*

OF. *Marum verum seu Syriacum.* G. *Maron.* GE. *Katzenkraut ; amberkraut.* A. *Marum germander ; syrian herb-masthiche or cat-thyme.*

QUAL. Heroica : In oleo volatili camphorino residens ; odor fragrans, camphoratus ; sapor acris, amarus.

VIRT. Nervina ; antispasmodica ; cardiaca ; errhina ; discutiens.

USUS *pulv. vel infusi :* Spasmi ; hysteria ; cachexiæ ; oblivio ; morbi soporosi ; anosmia ; asthma.

DOSIS *pulveris :* Gran. XX-XXX. In infuso aquoso vel vinoso drach. ij-iij ad libram j.

TEUCRIUM POLIUM. Herba ; summitates.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa ; Europ. austr.*

OF. *Polium montanum.* G. *Thim blanc des montagnes.* A. *Poley or white mountain germander.*

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

TEUCRIUM SCORDIUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis ; in pratis humidis ; hortensis.*

OF. *Scordium.* G. *Germandrée aquatique.* GE. *Lachenknoblanch.* A. *Water-germander.*

QUAL. Præstans : Odor alliaceus ; sapor aromatico-amarus, acris.

VIRT. Antiseptica ; stomachica ; sudorifica ; anthelminthica ; discutiens.

USUS *externus infusi vinosi vel acetosi :* Ecchymoma ; gangræna ; ulcus.

THALICTRUM FLAVUM. Radix.
CL. *Polyand.O.Polyg. Perennis; in pratis humidis.*
OF. *Thalictrum.* G. *Rue des prés.* A. *Common meadow rue.*
QUAL. Sapor dulco-amarus.
VIRT. Eccoprotica.

THAPSIA ASCLEPIUM. Radix.
G. *Thapsie ou turbith bâtard.* A. *Deadly carrots.*
QUAL. Acris.
VIRT. Cathartica. *N. B.* Veteribus in usu.

THEA BOHEA. Folia.
CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Chinensis.*
OF. *Thea.* G. *Thé.* GE. *Thee.* A. *Broad et narrow leaved bohea-tea.* H. *The boheo.*
QUAL. Odor gratus; sapor substypticus.
VIRT. Adstringens. *Foliorum recent.* : Narcotica.
USUS. Physconia abdom.; uriasis *Japonensibus.*
N. B. Plures usum infusi hujus speciei quotidianum ferunt, dum sequentem ferre nequeunt.

THEA VIRIDIS. Folia.
G. *Thé vert.* GE. *Grüner thee.* A. *Green tea.*
QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor substypticus.
VIRT. Excitans; adstringens.
USUS.

THEOBROMA CACAO. Nucleus seu fructus, et oleum concretum *vulgo* Butyrum dictum.
CL. *Polyadelph.O. Pentand. Arbor. Amer. merid.*
OF. *Fructus cacao: butyrum cacao.* G. *Cacao.* GE. *Kakaobohnen.* A. *Choccolate nut-tree.*

*

QUAL. Oleosa; ægre rancescens.
VIRT. Demulcens; involvens; nutriens.
USUS. Tabes; asthenia; varix ani.
PRÆP. Oleum fixum concretum butyraceum. Ex fructu tosto Choccolada.

THLASPI ARVENSE. Semen.
CL. *Tetradyn.* O. *Silicul.* *Annua; in campis sub tritico æstivo.*
OF. *Thlaspi.* G. *Monnoyère.* GE. *Bauren-senf.*
QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor dulco-subacris.
USUS. Arthrodynia rheumatica.

THUYA ARTICULATA. Succus resinosus ex trunco et ramis arboris exsudans, *Sandaraca* dictus (WAHL).
NATIVIS. *Elgrassa.* *Arbor.; Afric. merid.*
OF. *Gummi s. resina sandaraca. N. B.* False ut videtur, hactenus ex juniperi specie derivata.

THUYA OCCIDENTALIS. Folia; lignum.
CL. *Monœc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Europ. et Asiæ septentr.*
OF. *Arbor vitæ.* A. *American arbor vitæ tree.*
QUAL. Resinosa.
VIRT. Expectorans; sudorifica.
USUS *decocti:* Hydrops; rheumatismus; tussis; intermittentes.

THYMUS SERPYLLUM. Herba.
CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in collibus siccis.*

OF. *Serpyllum* G. *Serpolet.* GE. *Quendel; feldkümmel; wilder poley.* A. *Common mother of thyme, or wild thyme.* H. *Tomillo serpol.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor substypticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; resolvens.

USUS. Cephalalgia crapulæ. Præcipuus ad balnea uterina.

PRÆP. Oleum volatile.

THYMUS VULGARIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; annua; hortensis, Europ. austr.*

OF. *Thymus vulgaris.* G. *Thym.* GE. *Thymian.* A. *Garden-thyme.* H. *Tomillo vulgar.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga; carminativa; resolvens.

USUS. Leucoplegmatia; coryza; epiphora.

TILIA EUROPÆA. Flores.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Tilia.* G. *Tilleul.* GE. *Lindenbaum.* A. *Common lime-tree.* H. *Tilo.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Antispasmodica.

USUS *infusi, aquæ:* Spasmi.

PRÆP. Aqua.

TOLUIFERA BALSAMUM. Balsamum incisione arboris obtentum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Amer. merid.*

OF. *Balsamum tolutanum* s. *de tolu* s. *de carthagena.*

G. *Baume de tolu.* GE. *Tolutanischer balsam.* A. *Balsam of tolu..*

QUAL. In principio resinoso, acido benzoico juncto, residens; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes pituitosa; ulcera; vulnera.

PRÆP. Tinctura; syrupus balsamicus.

TORDYLIUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Europ. austr.*

OF. *Seseli creticum.* G. *Bergkümmel.* A. *Officinal hartwort.*

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica.

USUS.

TORMENTILLA ERECTA. Radix.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Perennis; in nemorosis.*

OF. *Tormentilla.* G. *Tormentille.* GE. *Tormentilwurzel; birkwurzel; Ruhrwurzel; Blutwurzel.* A. *Common tormentil; or upright septfoil.*

QUAL. Præstans: Styptica; rubra.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS. Menorrhœa; diarrhœa. *Cum gentiana:* Intermittentes.

TRAGOPOGON PRATENSE. Radix.
CL. *Syngen.* O. *Polyg. æqual.*
OF. *Tragopogum; barba hirci.* GE. *Bocksbart-wurzel.*
A. *Yellow goat's beard.*
QUAL. Lactescens; amaricans.
VIRT. ?
USUS. Tussis; stranguria.

TRAPA NATANS. Fructus.
CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In aquis stagnantibus.*
OF. *Nuces aquaticæ; tribuli aquatici.* GE. *Wassernüsse; stachelnüsse.* A. *Floating water cultrops.*
QUAL. Farinosa; dulcis.
VIRT. Nutriens; obstipans.
USUS.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. Flores; herba.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Biennis; hortensis, in Campis.*
OF. *Melilotus albus & citrinus.* G. *Melilot.* GE. *Steinklee.* A. *Common melilot-trefoil.*
QUAL. In oleo volatili residens; odor gravis, fragrans; sapor acris, amaricans, mucilaginosus.
VIRT. Emolliens; resolvens.
USUS *forma cataplasmatis:* Tumores.
PRÆP. Emplastrum.

TRIFOLIUM REPENS. Flores.
CL. & O. *præced.* *Perennis.*
OF. *Trifolium album.*

QUAL. Odor suaveolens.
VIRT. ?
USUS. Arthritis?

TRIGONELLA FŒNUM GRÆCUM.
———— MONSPELLIENSIS. Semen, ejusque farina.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua; hortensis.*
OF. *Fœnum græcum.* G. *Fénugrec.* GE. *Bockshornsaamen.* A. *Common & Monspellian fenu greek.*
QUAL. Farinacea; mucilaginosa; odor fragrans; sapor amaricans.
VIRT. Emolliens; lubricans.
USUS. Dysenteria; diarrhœa; ophthalmia. *Externus* farinæ: ad cataplasmata.

TRITICUM ÆSTIVUM. ———— HYBERNUM. } Semen; farina; amylum; furfures.

CL. *Triand.* O. *Trigyn.* *Annua.*
OF. *Triticum.* G. *Farine du froment: amidon: son.* GE. *Weitzenmehl: kraftmehl, staerke: Kleyen.* A. *Winterwheat: Wheat flour: Startch: Bran.*
QUAL. Farinacea; mucilaginosa; insipida.
VIRT. Emolliens; nutriens; acescens.
USUS *farinæ:* Ad cataplasmata. *Amyli* in enemate: Dysenteria; tenesmus; stranguria. *Decocti furfurum:* Tussis ab acri; *externus* in balneis.
DOSIS *Amyli:* Drach. j ß ad unc xij aquæ coctæ ad unc. vj pro enemate.
PRÆP. Amylum; farina; furfures.

TRITICUM REPENS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Radix graminis.* G. *Chiendent des boutiques.* GE. *Quecken; grasswurzel.* A. *Quickgrass; dogsgrass; couchgrass.* H. *Trigo rastrero.*

QUAL. Dulcescens; inodora.

VIRT. Diuretica; desobstruens.

USUS *Decocti vel extracti :* Physconia abdomin.; intermittentes; icterus.

DOSIS ; Unc. ij-iij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. Extractum.

TROPÆOLUM MAJUS. Herba.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Annua; hortensis.*

OF. *Herba nasturtii Indici.* A. *Indian cress or tropæolum.*

QUAL. Acris.

VIRT. Diuretica.

USUS. Scorbutus.

TUSSILAGO FARFARA. Radix; herba; flores; folia; succus foliorum.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in argillosis & Campis humidis.*

OF. *Tussilago.* G. *Tussilage; pas d'âne.* GE. *Huflattich.* A. *Common coltsfoot.* H. *Tussilago.*

QUAL. *totius plantæ :* Sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Expectorans.

USUS *succi foliorum tempore veris expressi :* Scrophula. (CULLEN). *Decocti vel succi :* Morbi pectoris; tussis catarrhalis; tabes.

DOSIS : Unc. j ad libram j aquæ.--- *Succi* unc. ij-iij de die.

TUSSILAGO PETASITES. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Radix petasitidis.* G. *Pétasite.* GE. *Schweiswurzel; pestilenzwurzel.* A. *Great coltsfoot or butter-bur.* H. *Sombrera.*

QUAL. Sapor amarus, subacris.

VIRT. Expectorans; diaphoretica.

USUS *decocti :* Morbi pectoris.

U.

ULMUS CAMPESTRIS. Cortex interior ramulorum et arboris junioris.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Arborea.*

NF. *Ulmus.* G. *Orme.* GE. *Ülmenbaum; küstenrinde.* A. *Elm-tree bark.* H. *Alamo.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; diuretica; alterans.

USUS *decocti* : Lepra aliique cutis morbi; ulcera phagedænica; arthritis; hydrops.

DOSIS. Unc. j-ij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

URTICA DIOICA. Radix; herba; succus expressus.

CL. *Monœc.* O. *Tetrand.* *Perennis.*

OF. *Urtica major.* G. *Grande ortie.* GE. *Brenn-nesseln.* A. *Common nettle.* H. *Ortiga mayor.*
QUAL. Urens *tactu ;* insipida.
VIRT. *Succi :* Alterans ?
USUS *urticationis externus :* Paralysis ; asthenia. *Internus succi :* Hæmoptysis ; hæmorrhois ; phthysis ? Icterus.
DOSIS *succi :* Unc. j - ij.

URTICA PILULIFERA. Semen.
CL. & O. *præced.* *Annua ; Europ. austr.*
OF. *Urtica Romana.* A. *Roman nettle.*
QUAL. *herbæ :* Urens *tactu ;* insipida. — *Seminum :* Oleosa.
VIRT. Diuretica.
USUS. Rubeola ? nephritis ? hæmorrhagia ?

URTICA URENS. Semen.
CL. & O. *præced.* *Annua.*
G. *Ortie grièche.* A. *Lesser, or stinging nettle.*
VIRT. *Decocti :* Anthelminthica ?

UVARIA ZEYLANICA. Lignum.
CL. *Polyand.* O. *Polygyn.*
G. *Bois d'ébène.* GE. *Ebenholz.*
QUAL.
VIRT.
USUS.

V.

VACCINIUM MYRTILLUS. Baccæ recentes.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ myrtillorum.* G. *Airelle anguleuse; myrtilles.* GE. *Heidelbeeren.* A. *Common bill-berries, or whorthle-berries.* H. *Arandano.*

QUAL. Sapor acido-stypticus.

VIRT. Subadstringens; antiseptica.

USUS. Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa; scorbutus.

PRÆP. Syrupus; Roob.

VACCINIUM OXYCOCCOS. Baccæ recentes; succus expressus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Perennis.*

OF. *Baccæ oxycoccos.* G. *Airelle canneberge.* GE. *Moosbeeren.* A. *Common cranberry, or moorberry.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Syrupus.

VACCINIUM VITIS IDÆA. Baccæ recentes.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ vitis idææ.* G. *Airelle ponctuée.* GE. *Preusselbeeren; kronsbeeren.* A. *Red billberry or whortle berry.*

QUAL. Acida.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres acutæ.
PRÆP. Roob.

VALERIANA CELTICA. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina, in montibus altioribus Europ. austr.*
OF. *Nardus celtica : spica celtica; spica Indica.* GE. *Speikwurzel.*
QUAL. Odor fragrans, aromaticus; sapor acris, salino-amaricans, aromaticus.
VIRT. Antispasmodica; diuretica; anthelminthica.
USUS præcipuus in Turcia ad Balnea.

VALERIANA OFFICINALIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis & Sylvis.*
OF. *Valeriana sylvestris seu minor.* G. *Valeriane.* GE. *Wilde Baldrianwurzel; katzenwurzel.* A. *Wild or officinal valerian.* H. *Valerian officinal.*
QUAL. Præstans : In oleo volatili residens; odor hircinus; sapor amaricans, aromaticus : Felibus grata.
VIRT. Eximie antispasmodica; narcotica; anthelminthica; menagoga; diuretica.
USUS *pulv. vel infusi :* Epilepsia; hysteria; convulsio; hypochondriasis; hemicrania; amaurosis incipiens; amenorrhœa; vermes; hæmoptysis; ulcus.
DOSIS *pulveris cum pauxillo macis :* Gran XX-XXX ter quaterve de die. In infuso aquoso unc. semis-ij ad libram j aquæ.

PRÆP. Tinctura; dosi unc. semis-j.

N. B. Primo vere antequam folia explicata sunt colligenda, cavendum ne ex locis nimis humidis aut tempore anni improprio colligatur et ne cum radice valerianæ dioicæ inerti confundatur.

VALERIANA PHU. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ. austr.*

CF. *Phu; valeriana major seu hortensis.* GE. *Grosse baldrianwurzel.* A. *Garden valerian.*

QUAL. et VIRT. præcedent. sed debilior.

VERATRUM ALBUM. Radix.

CL. *Polyg.* O. *Monœc.* *Perennis; alpina.*

N. B. Tempore verno colligenda.

OF. *Helleborus albus.* G. *Hellébore blanc; veratre.* GE. *Weisse niesswurzel.* A. *White veratrum or hellebore.* H. *Veratro blanco; vede gambre blanco.*

QUAL. Venenata: Odor nauseosus, ingratus; sapor salino-acris, amaricans.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; menagoga; errhina; phthiriaca.

USUS *internus pulveris ablato cortice externo:* Hydrops; epilepsia; morbi cutis rebelles; mania; melancholia; dyspepsia; quartana. *Externus forma pulveris, decocti vel unguenti:* Psora; tinea. Scopo errhino: Apoplexia; cophosis.

DOSIS *pulveris:* Gran iij-xx. In infuso aquoso vel vinoso, aut alcohole diluto Gr. xx-drach. iij ad libram j. -- *Extracti:* Gr. ij. -- Radicis drach. j in unc. xx aceti infusa, initio dosi cochlearis unius

omni secunda aut tertia hora; dein bis, tandem semel de die, maniam violentam sustulit intra tres septimanas.

N. B. Antidotum veratri est infusum coffeæ.

VERATRUM NIGRUM. Radix.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præcedent.

VERATRUM SABADILLA? (RETZIUS). Semen cum capsulis.

CL. & O. *præced.* *Mexicana.*

OF. *Semen sabadillæ; Cevadilla* G. *Cévadille.*

QUAL. Venenata: sapor amarus, acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS. Vermes.

DOSIS Infanti duorum ad quatuor annos gr. ij.---A quatuor ad octo annos gr. v. Ab octo ad duodecim annos gr. x.—Et ultra pro constitutione et ætate gr. xij-xv cum melle, subjungendo catharticum omni quinto die (SCHMUCKER).

VERBASCUM NIGRUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Verbascum.* GE. *Schwarze wollkrautwurzel.* A. *Black mullein.*

QUAL. Mucilaginosa; insipida.

VIRT. Emolliens.

USUS. Paronychia.

VERBASCUM THAPSUS. Folia; flores.

CL. & O. *præced.* *Biennis; in locis desertis, petrosis.*

OF. *Verbascum.* G. *Molene; bouillon blanc.* GE. *Weisses wollkraut; himmelbrand; kœnigskerze.* A. *Great broad leaved müllein.* H. *Gordolobo.*

QUAL. Mucilaginosa; fatuo-amaricans.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS. Tussis; proctalgia; varix ani.

DOSIS *infusi:* Unc. j ad libram j aquæ.

VERBENA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Verbena.* G. *Verveine.* GE. *Eisenkraut.* A. *Officinal vervain.*

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS. Ophthalmia infantum?

VERONICA BECCABUNGA. Herba recens.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Beccabunga.* G. *Véronique cressonée.* GE. *Bachbungen.* A. *Brooklime speedwell.*

QUAL. Subinsipida, inodora.

VIRT. ?

USUS. Scorbutus?

VERONICA OFFICINALIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis siccis, nemorosis.*

OF. *Veronica.* G. *Véronique.* GE. *Ehrenpreis; grundheil.* A. *Officinal speedwell.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Subadstringens; expectorans.

USUS *infusi:* Tussis; tabes; morbi pectoris pituitosi; cachexiæ.

VICIA FABA. Flores; semen.
CL. *Diadelph. O. Decand.* *Hortensis.*
OF. *Faba.* GE. *Sauebohnen; welsche bohnen.* A. *Common garden bean.*
QUAL. *florum recent.* Odor fragrans. — *Seminis:* Farinacea.
VIRT. *florum:* Cosmetica.
USUS *farinæ seminum:* Pro cataplasmatibus emollientibus.

VINCA MINOR. Herba; folia.
CL. *Pentand. O. Monog.* *Perennis.*
OF. *Vinca pervinca.* GE. *Immergrün; wintergrün.* A. *Small periwinkle.*
QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Scrotum corrugans. Eundem effectum peculiarem præstant *alchemilla vulgaris*, *anthemis pyrethrum*, *hedera helix*, fotu externe adplicata.
USUS *infusi:* Morbi pectoris. Forma gargarismatis: Cynanche.

VIOLA CANINA. Radix.
CL. *Syng. O. Monog.* *Perennis.*
ANG. *Dogs violet.*
VIRT. Emetica; cathartica.
DOSIS. Scrup. j - drach. semis.

VIOLA IPECACUANHA? Radix.
CL. & O. *præced.* *Brasiliensis.*
OF. *Ipecacuanha alba.*
QUAL. et VIRT. Eadem ac psycothriæ emeticæ, sed minus certa.

VIOLA ODORATA. Flores recentes; radix; semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Viola; violaria.* G. *Violette odorante.* GE. *Violen.* A. *Sweet-scented violet; sweet violet.*

QUAL. *Florum :* Fragrans.

VIRT. *Radicis & seminis :* Emetica; diuretica.

USUS *florum :* Pro syrupo cœruleo parando.

DOS. *Radicis & seminis :* In pulvere drach. semis-j. In decocto drach. ij-iij ad libr. j aquæ.

PRÆP. Syrupus.

VIOLA TRICOLOR. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; in campis et hortis.*

VAR. A. Viol. tricolor arvensis. B. Viol. tricolor hortensis repens.

OF. *Herba Trinitatis; Jacea.* G. *Pensée* GE. *Freysamkraut.* A. *Three-coloured violet; pansies or heart's-ease; three coloured garden violet.* H. *Trinitaria; pensamientos.*

QUAL.

VIRT. Diuretica; cathartica.

USUS *pulv. vel decocti :* Crusta lactea; achores infantum; tinea.

DOSIS *pulveris :* Gr. viij-xxx. In decocto drach. j-ij herbæ recentis, vel drach. semis-j herbæ siccatæ ad libr. j lactis.

VISCUM ALBUM. Rami lignosi cum foliis.

CL. *Diœc.* O. *Tetrand.* *Fruticosa; parasiticæ*

OF. *Viscus quercinus; viscum quernum.* G. *Guy de chêne.* GE. *Mistelholz; vogel-leim.* A. *White or common misletoe.* H. *Visco blanco.*

QUAL. *recentis:* Odor nauseosus. *Siccatæ:* Mucilaginosa.

VIRT. Inviscans; lubricans.

USUS. Epilepsia; chorea; convulsio? Dysenteria?

DOSIS *pulveris:* Drach. semis-j.

VITEX AGNUS CASTUS. Semen.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Agnus castus.* A. *Chaste-tree.*

QUAL. Odor nidorosus; sapor acris, calidus.

VIRT.?

VITIS APYRENA. Baccæ siccatæ.

N. B. *Varietas* vitis viniferæ.

OF. *Uvæ Corinthiacæ; passulæ minores.* G. *Raisins de Corinthe.* GE. *Korinthen; kleine rosinen.* A. *Currants.*

QUAL. Sapor grate dulcis, saccharinus.

VITIS VINIFERA. Baccæ recentes et siccatæ; folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Uvæ; uvæ passæ; passulæ majores; zibebæ.* G. *Vigne: raisins; raisins de Damas.* GE. *Weintrauben: zibeben; grosse rosinen.* A. *Common vine: raisins.*

QUAL. Sapor grate dulcis, acidulus. *Foliorum:* Substypticus.

VIRT. *fructus* : Nutriens ; antiseptica ; eccoprotica ; deobstruens : *Foliorum* : Subadstringens.

USUS. Tussis ; stranguria ; icterus ; physconia abdominalis ; tabes.

PRÆP. Succus è baccis immaturis expressus, vulgo *Omphacium* (G. *verjus*).

Liquor ex uvis maturis expressione et fermentatione paratus, variæ qualitatis, vulgo *Vinum*.

Vinum Rhenanum : Acidulum.

Vinum campaniæ : Acido carbonico scatens.

Vinum album regionum australium : Alcohole fœtum.

Vinum rubrum : Alcohole et principio adstringente abundans.

Liquor ex vino, fermentatione obtentus, acidus, vulgo *Acetum*.

Liquor ex vino, destillatione obtentus, *Alcohol* ; vulgo *spiritus vini*.

Alcohol dilutum, *vulgo* spiritus vini tenuis. G. *eau-de-vie*. GE. *Brandwein*. A. *Brandy*.

Alcohol, *vulgo* spiritus vini rectificatus.

Alcohol concentratum, *vulgo* spiritus vini rectificatissimus.

W.

WINTERA AROMATICA. Cortex.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea ; terræ Magellanicæ.*

OF. *Cortex winteranus ; cortex winteri ; cortex magellanicus ; Winterania aromatica ; drymus granadensis ; drymus winteri.*

QUAL. In oleo volatili cum principio resinoso juncto residens; odor fragrans; sapor intense acris, pungens, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dysenteria; asthenia.

DOSIS *pulveris* : Gran. v-xv. In infuso vinoso drach. j-j ß ad libram j. vini.

WINTERA CANELLA. (PALLAS).

N. B. CANELLA ALBA. (LINN.) Cortex interior.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Canella alba; winterania canella.*

QUAL. Sapor acris, subamarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS *pulver. vel infusi vinosi:* Dyspepsia; asthenia.

DOSIS *pulv.* : Gran. x. In infuso drach. j - ij ad libr. j vini.

X.

XANTHIUM STRUMARIUM. Folia recentia; semina.

CL. *Monœc.* O. *Pentand.* *Annua; in humidis arenosis.*

OF. *Xanthium.* GE. *Spitzkletten.* A. *Lesser xanthium or burdock.*

QUALr Luteo-tinctoria; sapor amarus, subacris.

VIRT.

USUS *seminum & succi foliorum* : Scrophula; bronchocele; herpes; erysipelas.

DOSIS. Unc. semis.

Z.

ZOSTERA MARINA. Fibræ radicis.

CL. *Gynand.* O. *Polyand.*

OF. *Pila marina.*

QUAL.

VIRT.

USUS *cinerum radicis ustæ* : Scrophula; bronchocele.

MATERIA MEDICA.

II. ANIMALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

ACCIPENSER STURIO, aliæque accipenserum SPECIES. Gelatina seu gluten ex vesica aërea præcipue, nec non ex intestinis depromptum, in varias figuras contortum, exsiccatum.

CL. *Pisces.* O. *Chondropterygii.*

OF. *Colla piscium; ichthyocolla.* G. *Colle de poissons.* GE. *Hausenblase.* A. *Isinglas.*

QUAL. Gelatinosa.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens; agglutinans.

USUS *decocti internus :* Dysenteria; diarrhœa ab acri; tenesmus. *Externus* forma *enematis.*

N. B. Hoc gluten est præcipuum ingrediens emplastri adhæsivi anglici.

APIS MELLIFERA. Mel; Cera flava et alba.

CL. *Insecta* O. *Hymenoptera.*

OF. *Mel virgineum & despumatum : Cera flava & alba.* G. *Miel : Cire.* GE. *Honig : Wachs.* A. *Honey : Wax.*

QUAL. *Mellis :* Saccharino-mucilaginosa, acescens. *Ceræ :* Oleosa.

VIRT. *Mellis* : Deobstruens; diuretica; demulcens; antiseptica. *Ceræ :* Emolliens; involvens.

USUS Ceræ flavæ solutæ *externus forma enematis :* Diarrhœa ab acri; tenesmus; hæmorrhagia recti ab acri. — *Mellis* : Nephralgia; morbi pulmonum pituitosi; physconia abdominalis.

DOSIS *mellis intern.* Unc. iij-libr. semis ad libr. j de die.

PRÆP. *è melle :* Hydromel; mel virgineum et depumatum; oxymel simplex; oxymel scilliticum. — Mel cupratum (*vulgo* mel æruginis, s. unguentum Ægyptiacum). — Mel hydrargyratum, pro usu interno et externo. — Mel farina subactum, forma emplastri vel cataplasmatis : Phlegmone; furunculus.

BOS TAURUS DOMESTICUS. Caro; bilis; lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

G. *Lait de vache; petit-lait; beurre; fiel.* GE. *Milch; molken; butter; buttermilch; ochsengalle.* A. *Milk.: Whey : Butter : gall.*

VIRT. *Lactis, sacchari lactis, butyri :* Nutriens; involvens; relaxans. *Seri lactis & lactis ebutyrati :* Attenuans; antiseptica. *Bilis :* Stomachica.

USUS *præcipuus lactis, seri et sacchari lactis :* Tabes; hæmoptysis.

DOSIS *Sacchari lactis* in pulvere cum vel sine

nitrate potassæ drach. j ter quaterve de die; vel unc. semis in libr. ij aquæ fervidæ soluta de die.

PRÆP. Jus carnium; gelatina; butyrum; saccharum lactis; serum lactis; lac ebutyratum; bilis inspissata.

CANCER ASTACUS.
——— GAMMARUS.
——— MACRURUS.
——— PAGURUS.
} Lapides; chelæ; caro pro jure.

CL. *insecta*. O. *Aptera*.

OF. *Oculi & Chelæ cancrorum*. G. *Yeux d'écrevisses*.

A. *Crab's eyes; crabs claws*.

QUAL. *Lapidum & chelarum* : Calcarea.

VIRT. *Chelarum & lapidum* : Antacida. *Carnis* : Nutriens.

USUS. Pyrosis; diarrhœa; convulsio infantum ab acido.

CAPRA DOMESTICA. (Fœmina). Lac.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*.

OF. *Lac caprinum*.

QUAL. Nutriens.

CARABUS CHRYSOCEPHALUS.
——— FERRUGINEUS. (FABRICIUS).

USUS. Odontalgia.

N. B. Insectum inter digitos teratur, dein iisdem digitis dens et gingiva dolens tangatur; idque pro re nata ter quaterve repetatur.

CASTOR FIBER. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, *vulgo* CASTOREUM dictum.

CL. *Mammalia.* O. *Glires.*

OF. *Castoreum Rossicum.* G. *Du Castor.* GE. *Bibergeil.* A. *Castoreum; russian castor.*

QUAL. Odor virosus, ingratus, penetrans; sapor acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; aphrodisiaca.

USUS *internus:* Spasmi; hysteria; convulsio; epilepsia; colica flatulenta; typhus; anaphrodisia. *Externus* forma enematis.

DOSIS *pulveris:* Gran. X-XXX bis terve de die. In *enemate* drach. j.

PRÆP. Tinctura; unguentum.

CERVUS ALCES.
——— DAMA.
——— ELAPHUS.
——— TARANDA.
} Cornua; gelatina cornu cervi; sevum.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

OF. *Cornu cervi.* G. *Corne de cerf.* A. *Hartshorn.*

QUAL. *gelatinæ:* Nutriens. *Cornu* est substantia ex phosphate calcis composita.

PRÆP. Rasura et gelatina cornu cervi; cornu cervi ustum seu calcinatum; oleum cornu cervi volatile *vulgo* spiritus cornu cervi. — Ammoniaca *vulgo* alcali volatile causticum. — Carbonas ammoniacæ *vulgo* sal cornu cervi volatile.

CHRYSIS IGNITA. (FABRICIUS).
Sphex ignita. LINN.
CL. *Insecta.* O. *Hymenoptera.*
USUS pulveris vel tincturæ internus ut cantharidum: Paralysis (BEIREIS).

CHRYSOMELA POPULI et SANGUINOLENTA.

COCCINELLA BISPUNCTATA et SEPTEMPUNCTATA.
VIRT. et USUS idem ac Carabi.

COCCUS CACTI (COCCINELLIFERI). Insectum siccatum.
CL. *Insecta.* O. *Hemiptera.*
OF. *Coccionella; cochinella.* G. *Cochenille.* GE. *Koschenille.* A. *Cochineal.*
QUAL. Rubro-tinctoria; acris; urens.
VIRT. Stimulans; diuretica.
USUS potissimum tinctorius.

COCCUS LACCA (C. FICUS INDICÆ et RELIGIOSÆ). Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans, Nidumque insecti constituens.
OF. *Gummi lacca.* Lacca in granis: *Nidus cum vel sine insecto ramulis arboris adhærens.* Lacca in tabulis: *Nidus insecti igne liquatus et in tabulas effusus.*
QUAL. Rubro-tinctoria; styptica.
VIRT. Adstringens.

*

USUS pulveris vel tincturæ : Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

COCCUS (QUERCUS) ILICIS. Nidus cum insecto siccatus.

OF. *Kermes; grana chermes.* G. *Kermès.* GE. *Scharlach-körner.*

QUAL. Rubro-tinctoria; odor et sapor gratus, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; adstringens.

USUS. Anaphrodisia; asthenia nervosa : Hodie potissimum tinctorius.

PRÆP. Succus chermes, id est, succus ex insectis vivis in cellula inclusis linteo expressus cum anatica portione sacchari mixtus aut conditus.

COLUBER VIPERA. } Caro pro jure; axungia.
——————— BLERUS. }

CL. *Amphibia.* O. *Serpentes. Ægypt.; Europ. austr.*

OF. *Vipera.*

USUS *decocti seu juris viperarum :* Morbi cutis; scrophula. *Axungiæ :* Maculæ corneæ.

CORALLINA OFFICINALIS. Nidus polypi maris Atlantici et Mediterranei.

CL. *Vermes.* O. *Zoophytæ.*

OF. *Muscus corallinus; conferva s. fucus helminthochorton.* G. *Coralline officinale; mousse de Corse.*

QUAL. Sapor salinus nauseosus; magnam quantitatem mucilaginis decoctione largiens.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS *pulveris :* Gran. x ad drach. j : in infuso drach. j — unc. j ad libr. j aquæ.

CURCULIO ANTIODONTALGICUS.

———————— BACCHI.

———————— JACEÆ.

VIRT. et USUS. Carabi.

CYNIPS (QUERCUS) CERRIS. Nidus insecti siccatus, id est, substantia vegetabilis punctura insecti ex foliis, petiolis aut pedunculis arboris exsudans, in nidum efformata, *vulgo* Galla.

OF. *Gallæ; Gallæ turcicæ.* G. *Noix de Galles.* GE. *Gallaepfel; Gallnüsse.* A. *Galls.*

QUAL. In principio adstringente residens; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *internus & externus*: Blennorrhœa; hæmorrhœa; prolapsus; hernia.

PRÆP. Acidum gallicum. (G. *Acide gallique*).

EQUUS ASINUS. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia.* O. *Bellnæ.*

OF. *Lac Asininum.*

QUAL.

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes.

ESOX LUCIUS. Oleum ex hepate sponte destillans.

CL. *Pisces.* O. *Abdominales.*

OF. *Oleum lucii piscis.*

USUS. Maculæ corneæ.

FORMICA RUFA. Acidum.
CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.
OF. *Formicæ cum acervo*.
QUAL. *Acidi* : Pungens.
VIRT. Irritans; stimulans.
USUS. Paralysis; anaphrodisia.
PRÆP. Acidum. (G. *Acide formique*).

HELIX POMATIA. Caro.
CL. *Vermes*. O. *Testacea*.
G. *Le grand colimaçon des vignes*. GE. *Snecke*. A. *Snail*.
VIRT. Nutriens.
USUS. Tabes.

HIRUDO MEDICINALIS.
———— SANGUISUGA.
CL. *Vermes*. O. *Intestina*.
OF. *Hirudo sanguisuga*. G. *Sangsue*. GE. *Blutigel*. A. *Leeches*.
USUS. Phlegmone; apoplexia; ophthalmia; varix ani, aliique morbi in quibus sanguinis evacuatio localis indicatur.

ISIS NOBILIS. Nidus calcareus.
CL. *Vermes*. O. *Zoophytæ*.
OF. *Corallia rubra*. G. *Corail rouge*. A. *Red coral*.
QUAL. Calcarea.
VIRT. Antacida; dentifrica.
USUS ad dentes mundandos.

LACERTA AGILIS, aliæque SPECIES. Caro.
CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*
USUS. Caro cruda, dempto capite, cauda et pedibus N°. j-iij quotidie deglutita. Morbi cutis; ulcera syphilitica; cancer nasi, oris?

LACERTA IGUANA. Caro; ova.
G. *Iguane.* *Ind. occident.*
VIRT. An comesta virus syphiliticum in corpore latens activum redduut?

LACERTA SCINCUS. Caro.
G. *Scinque.* *Afric.*
VIRT. Aphrodisiaca?

LIMAX MAXIMUS CINEREUS. Gluten in superficie corporis exsudans.
CL. *Vermes.* O. *Mollusca.*
G. *Limaçon brune.*
USUS glutinis seu muci viscidi ad tumores glandularum duros resolvendos.

LUMBRICUS TERRESTRIS. Succus expressus; oleum.
CL. *Vermes.* O. *Intestina.*
QUAL. Alcalina.
VIRT. Stimulans.
USUS. Paralysis.

LYTTA VESICATORIA. (FABRICIUS). Insectum siccatum.
Meloë vesicatorius LINN. *Europ. austr.*
CL. *Insecta.* O. *Coleoptera.* *Mense julio colligenda.*

OF. *Cantharides.* G. *Cantharides.* GE. *Spanische fliegen.* A. *Cantharids; spanish flies.*

QUAL. Acris; corrodens; vesicans.

VIRT. Irritans; stimulans; diuretica; derivans; lympham evacuans.

USUS *externus* forma emplastri præmissa evacuatione sanguinis: Phlegmasiæ; odontalgia et aurium dolor rheumaticus; enuresis; paralysis vesicæ; arthrodynia rheumatica; herpes. Pulvis denti carioso applicatus, vitando ne gingiva eodem tangatur, dolorem sæpe aufert. *Internus* forma pulveris vel tincturæ: Blennorrhœa; anaphrodisia; paralysis.

DOSIS *pulv.* gr. ij–iv. *Tinctaræ* gr. x–xxx.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; unguentum.

MADREPORA OCULATA. Nidus calcareus.

CL. *Vermes.* O. *Lithophyta.*

OF. *Corallia alba.*

VIRT. Antacida.

MELOE MAJALIS.

——— PROSCARABÆUS.

} Vescens præcipue ranunculo et veratro; vere colligendus.

CL. *Insecta.* O. *Coleoptera.*

QUAL. Acris.

VIRT. Irritans; stimulans.

USUS. Hydrophobia?

MOSCHUS MOSCHIFERUS. (Mas). Substantia unguinosa folliculi excretorii umbilicalis, vulgo MOSCHUS dicta.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.* *Asiæ septentrionalis.*

OF. *Moschus.* G. *Musc.* GE. *Bisam.* A. *Musk.*

QUAL. Eximia : Odor ambrosiacus, intense fragrans.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; sudorifica; aphrodisiaca?

USUS. Convulsio; subsultus tendinum; delirium; singultus; hysteria; epilepsia; typhus; febres et exanthemata atonica; podagra atonica, retropulsa.

DOSIS gran. V-X-XL.

PRÆP. Tinctura; julapium.

ONISCUS ASELLUS. Insectum; succus expressus.

CL. *Insecta.* O. *Aptera.*

OF. *Millepedes; millepedæ; aselli.* G. *Millepieds; cloportes.* GE. *Kelleresel; kellerwürmer; asseln.* A. *Woodlouse.*

QUAL. Alcalina; sapor nauseosus, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Morbi pectoris pituitosi; amaurosis; hydrops; physconia hepatis?

DOSIS. N° L-C vapore alcoholis necatorum et pulverisatorum.

PRÆP. Infusum vinosum expressum, *dosi* scrup. j-drach. j ad unc. j.

OSTREA EDULIS. } Caro; Concha
———— MAXIMA. } calcarea.

CL. *Vermes* O. *Testacea.*

OF. *Conchæ seu testæ ostreatum.* A. *Oyster-shells.*

VIRT. *Vermis :* Nutriens; aphrodisiaca. *Conchæ :* Antacida.

USUS. Diæta ex ostreis edulibus in morbis cutis rebellibus aliisque ex humorum acrimonia oriundis.

OVIS ARIES. Sevum.

CL. *Mammalia* O. *Pecora.*

OF. *Sevum ovillum.* G. *Graisse de mouton.* GE. *Schœpsen-talg.* A. *Sheep's suet.*

PHASIANUS GALLUS. (*Gallina domestica*). Ova : Ovorum albumen et vitellus; testæ.

CL. *Aves* O. *Gallinæ.*

OF. *Ova : testæ ovorum.* A. *Eggs; egg's shells.*

QUAL. *Albuminis & vitelli :* Oleosa; mucilaginosa, gelatinosa. *Testæ* : Antacida.

VIRT. *Ovorum :* Nutriens; involvens; demulcens; aphrodisiaca.

USUS *Vitelli* per se aut cum saccharo, vel forma linctus aut emulsionis : Morbi ventriculi ex acido. *N. B.* Vitellus unus aut duo omni mane deglutiti : Icterus (WHITE).

PHYSETER MACROCEPHALUS; aliæque SPECIES. Adipocera, id est, sevum seu oleum concretum, in cavo peculiari supra cranium collectum, *vulgo* Spermaceti dictum; ambra grisea.

CL. *Mammalia.* O. *Ceti.*

OF. *Spermaceti : Ambra grisea.* G. *Adipocire de baleine : Ambre gris.* A. *Spermaceti : Amber gris.*

QUAL. et VIRT. *Adipocera* eadem ac sevi aut olei fixi, sed difficulter rancescens. *Ambra grisea :* Stimulans; nervina; aphrodisiaca?

USUS.

FRÆP. Tinctura ambræ griseæ.

RANA BUFO.

CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*

USUS. Bufo vivens, linteo tectus capite excepto, mammæ adplicatus suctione cancrum sanasse perhibetur.

RANA ESCULENTA. Caro.

CL. & O. *præced.*

G. *La grenouille commune.*

VIRT. Nutriens.

USUS.

SEPIA OFFICINALIS. Concha.

CL. *Vermes* O. *Mollusca.*

OF. *Os sepiæ.* G. *Os de seche.*

QUAL. Calcarea.

SPONGIA OFFICINALIS. Nidus mollis.

CL. *Vermes* O. *Zoophytæ.* *Incola maris mediterranei & rubri.*

OF. *Spongia.* G. *Eponge.* GE. *Schwam; Badeschwam.* A. *Sponge.*

USUS *externus* pro deligandis ulceribus et abscessibus. *Spongiæ ustæ :* Bronchocele.

PRÆP. Spongia usta, dosi Drach. semis.

SUS SCROFA. Axungia; adeps.

CL. *Mammalia.* O. *Belluæ.*

OF. *Axungia porcina; adeps suillus.* G. *Graisse de porc; axonge; saindoux.* A. *Hog's lard.*

USUS. Ad unguenta varia et ad cataplasmata emollientia.

TRICHECUS MANATUS. Dens.

CL. *Mammalia.* O. *Bruta.*

USUS. Præstans pro dentibus artificialibus.

VIVERRA ZIBETHA. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, vulgo ZIBETHUM dicta.

CL. *Mammalia.* O. *Feræ.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica.

USUS.

609375(1